В 475121

Гомеопатический

Домашний Лѣчебникъ.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ.

Спб. Благотворительное
О-во Врачей Гомеопатовъ.



THE GIFT OF

The publishers.

H C 14.2
S 2 3
1912

Sankt-peterburgskoe obshchestvo vrachej-gomeopatov

Gomeopaticheskii
Domashnii
Lechebnik

Homoeopathic
Domestic
Manual

Second Edition

of the St. Petersburg Society
of Homoeopathic Physicians

ІЙ

1КЪ.

ОБЩЕСТВА

Ъ,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
1912.

S-Peterburgskoe blagotvoritel'noe obshchestvo vrachei homeopatov (entry)

Homeopaticheskii domashnii liechebnik . Vtoroe izdanie ispravlennoe i dopolnennoe. (See over for translation) 2d ed.rev.enl. S.Peterburg

WZ 442
S23
1912

Sankt-peterburgskoe blagotvoritel'noe obshchestvo vrachej gomeopatov

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ

ДОМАШНІЙ

ЛѢЧЕБНИКЪ.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

исправленное и дополненное

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

ВРАЧЕЙ ГОМЕОПАТОВЪ,

основаннаго въ 1868 г.

Невскій пр., 82.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

1912.

Типографія «Родникъ», Невскій просп., д. № 88.



Самуилъ Ганеманъ.

Родился 10 Апрѣля 1755 г. въ Мейссенѣ.
Скончался 2 Іюля 1843 г. въ Парижѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стр.
I.	**Отъ издателей. Предисловіе ко второму изданію**	VII
	Отъ издателей. Предисловіе къ первому изданію	IX
II.	**Уходъ за больными**	1
	Нѣкоторыя гигіеническія наставленія	3
	Вскармливаніе маленькихъ дѣтей	6
III.	**Полезныя вспомогательныя мѣры для сохраненія здоровья**	10
	Холодныя купанья и ванны	10
	Теплыя ванны	10
	Сидячая холодная ванна	11
	Сидячая теплая ванна	11
	Головная ванна	11
	Глазныя ванны	12
	Паровыя ванны	12
	Души	14
	Примочки	14
	Мокрыя обертыванія	15
	Согрѣвающіе компрессы	15
	Массажъ	16
	Лѣчебная гимнастика	16
	Дыхательная гимнастика	17
	Лѣченіе сухарями	18
	Лѣченіе діэтой	18
	Лѣченіе молокомъ и яблочнымъ виномъ (сидръ)	19
	Лѣченіе виноградомъ	19
	Лѣченіе молокомъ	20
	Желѣзистый лимонадъ	20

249482

стр.
Діэта при лѣченіи гомеопатическими средствами 21
Сохраненіе лѣкарствъ 22
Повтореніе пріемовъ 23
Дозы 23
IV. **Болѣзни и ихъ лѣченіе (алфавитъ см. стр. 455—463)** . . . 25
V. **Приложеніе. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ** . . . 258
Задушеніе парами, испареніями, зловредными газами, чадомъ и т. п. 258
Кровотеченіе изъ ранъ 258
Мнимая смерть замерзшихъ 259
Мнимая смерть новорожденныхъ 259
Мнимая смерть утопленниковъ 260
Мнимая смерть повѣшенныхъ 261
Постороннее тѣло, попавшее въ дыхательное горло, носъ, ухо и т. п. 261
Яды и лѣченіе отравленій 263
VI. **Перечень главнѣйшихъ лѣкарственныхъ средствъ съ характеристикою ихъ физіологическаго дѣйствія** 279
Аконитъ 281
Аписъ 284
Арника 287
Арсеникъ 289
Аурумъ 294
Баптизія 297
Белладонна 298
Бріонія 302
Вератрумъ 305
Гамамелисъ 307
Геллеборусъ 308
Гельземіумъ 310
Гепаръ-Сульфурисъ 313
Гіосціамусъ 316
Графитъ 320
Дрозера 323
Дулькамара 324
Евфразія 326
Игнація 327
Ипекакуана 330

стр.
Кали карбоникумъ 333
Калькареа карбоника 336
Календула 341
Камомилла 342
Кантарисъ 344
Карбо 347
Каустикумъ 351
Коккулюсъ 354
Коніумъ 357
Коффеа 360
Кроталюсъ 361
Купрумъ 363
Ликоподіумъ 365
Ляхезисъ 368
Меркуріусъ солюбилисъ 372
Меркуріусъ коррозивусъ 377
Нуксъ-вомика 378
Пульсатилла 382
Русъ 384
Силицеа 386
Спигелія 390
Спонгія 392
Стафизагрія 393
Сульфуръ 395
Тартарусъ эметикусъ 399
Туйя 401
Феррумъ 403
Фитолякка 406
Фосфоръ 408
Фосфори ацидумъ 412
Хина 413
VII. Списокъ всѣхъ лѣкарствъ и дѣленій, указанныхъ въ лѣчебникѣ 417
VIII. Цѣны отдѣльнымъ гомеопатическимъ лѣкарствамъ 422
Цѣны аптечкамъ по „Гомеопатическому Домашнему Лѣчебнику“ 423
Цѣны аптечкамъ по Руководству д-ра Р. Юза 424
Цѣны аптечкамъ къ „Ветеринарному Лѣчебнику“ 426

стр.
Цѣны разнымъ средствамъ для внутренняго употребленія. 428
Цѣны наиболѣе употребительнымъ наружнымъ средствамъ. 430
IX. Способъ употребленія наружныхъ средствъ 433
X. Перевязочные матеріалы и предметы для ухода за больными 441
XI. Цѣны разнымъ принадлежностямъ, служащимъ для приготовленія гомеопатическихъ лѣкарствъ и ихъ отпуска . . . 446
XII. Изданія СПБ. Благотворительнаго Общества Врачей Гомеопатовъ 453
XIII. Алфавитъ болѣзней 455

Отъ издателей.

Предисловіе ко второму изданію.

Необходимость въ популярномъ „Домашнемъ Лѣчебникѣ“ для публики, указанная издателями въ Предисловіи къ его первому изданію, подтвердилась фактомъ, что 5000 экземпляровъ его разошлось въ сравнительно короткое время. Выпускаемое теперь второе изданіе вновь пересмотрѣно, передѣлано и дополнено совершенно новыми статьями, а именно: „Базедова болѣзнь“, „Сифилисъ“, „Трипперъ“, „Ударъ мозговой“, „Чума“; кромѣ того прибавленъ цѣлый большой отдѣлъ въ 9 печатныхъ листовъ: „Перечень главнѣйшихъ лѣкарственныхъ средствъ съ характеристикою ихъ физіологическаго дѣйствія“. Несмотря на увеличеніе объема книги съ 258 страницъ текста перваго изданія до 416 второго и на значительное обогащеніе его содержанія, цѣна книги увеличена лишь на 25 коп., т.-е., 1 р. 25 к., а въ переплетѣ 1 р. 75 к. Такимъ образомъ, настоящій „Домашній Лѣчебникъ“ является на

книжномъ рынкѣ самымъ дешевымъ и общедоступнымъ руководствомъ къ гомеопатическому лѣченію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самымъ богатымъ по содержанію въ немъ новѣйшихъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, не встрѣчаемыхъ ни въ одномъ изъ другихъ лѣчебниковъ.

Отъ издателей.

Предисловіе къ первому изданію.

Съ каждымъ годомъ гомеопатія получаетъ все большее и большее распространеніе; и, соразмѣрно увеличенію числа послѣдователей этого способа лѣченія, увеличивается и спросъ на простое и общедоступное руководство, которое давало бы возможность лицамъ, совершенно незнакомымъ съ медициною, оказывать помощь себѣ и своимъ ближнимъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ по тѣмъ или инымъ причинамъ какая бы то ни была другая медицинская помощь является для нихъ недоступною. Для удовлетворенія этого несомнѣнно существующаго и вполнѣ законнаго требованія предлагается „Домашній Лѣчебникъ", составленный по образцу подобнаго же нѣмецкаго изданія „der kleine Hausfreund". Онъ даетъ въ очень сжатомъ видѣ и въ совершенно понятномъ изложеніи, безъ всякихъ техническихъ терминовъ, описаніе признаковъ болѣзней и указаніе наиболѣе подходящихъ для нихъ гомеопатическихъ лѣкарствъ съ наставленіемъ, въ какихъ разведеніяхъ и въ какихъ пріемахъ ихъ давать, какъ

часто ихъ повторять, и, въ случаѣ необходимости, съ какими другими лѣкарствами ихъ чередовать. Одновременно съ этою книгою выпускаются „домашнія аптечки", для которыхъ „Домашній Лѣчебникъ" служитъ руководствомъ, какъ ими пользоваться. Мы далеки отъ мысли, будто для успѣшнаго гомеопатическаго лѣченія можно обойтись безъ врача, и что лѣчить можетъ всякій, имѣющій въ рукахъ лѣчебникъ и аптечку. Мы желаемъ лишь дать руководство самопомощи для извѣстныхъ случаевъ и, какъ выше сказано, именно для такихъ, гдѣ больные, за невозможностью имѣть правильно организованную медицинскую помощь, волею-неволею вынуждены обращаться къ разнымъ домашнимъ и патентованнымъ средствамъ или къ знахарямъ и шарлатанамъ и, такимъ образомъ, вмѣсто ожидаемой пользы, наносятъ своему здоровью нерѣдко тяжкій и непоправимый вредъ. Гомеопатическія лѣкарства, входящія въ составъ „домашней аптечки", имѣютъ, во всякомъ случаѣ, то преимущество передъ обыкновенными домашними средствами, что не могутъ оказать прямого вреда, въ смыслѣ отравленія организма или опаснаго побочнаго дѣйствія. А между тѣмъ, при точномъ пользованіи указаніями предлагаемаго лѣчебника, вѣрно избранное гомеопатическое средство можетъ оказать исцѣленіе или почти несомнѣнное улучшеніе въ большинствѣ случаевъ, гдѣ болѣзнь вообще излѣчима или поддается улучшенію. Въ особенности неоцѣнима домашняя гомеопатическая аптечка въ дѣтскихъ болѣзняхъ, гдѣ своевременно на-

значенное лѣкарство часто въ корнѣ прерываетъ развитіе тяжелой болѣзни или приводить ее къ скорѣйшему выздоровленію.

Какъ краткое и популярное руководство, „Домашній Лѣчебникъ“ долженъ заслужить одобреніе лицъ, занимающихся самоврачеваніемъ. Для желающихъ же имѣть болѣе пространныя свѣдѣнія обращаемъ вниманіе на „Руководство къ лѣченію по способу Ганемана“ д-ра мед. Р. Юза. Эти два руководства дополняютъ одно другое и изданы по очень умѣренной цѣнѣ, въ разсчетѣ на ихъ широкое распространеніе.

Уходъ за больными.

Комната, въ которую помѣщаютъ больного, должна быть свѣтлая и сухая, и окна не должны по возможности выходить на улицу, въ особенности, если послѣдняя—очень шумная и оживленная.

Больному необходимъ полный покой; поэтому, если въ семьѣ есть дѣти, которыя своими забавами и играми нарушаютъ этотъ покой, то ихъ нужно отдалять.

При заразительныхъ болѣзняхъ, какъ-то: при чахоткѣ, тифѣ, родильной лихорадкѣ, дизентеріи, холерѣ, оспѣ, кори, скарлатинѣ, дифтеритѣ, коклюшѣ и т. п., больного слѣдуетъ изолировать отъ здоровыхъ и при немъ оставлять только тѣхъ, коимъ порученъ уходъ за нимъ. Въ такихъ случаяхъ необходимо принять и надлежащія мѣры предосторожности. Соблюденіе самой строгой чистоты и провѣтриваніе комнатъ большею частью предохраняютъ отъ зараженія. Въ комнатѣ больного запрещается здоровымъ пить и ѣсть, а равно нужно избѣгать всякаго соприкосновенія съ бѣльемъ и испражненіями, которыя необходимо дезинфектировать насыщеннымъ растворомъ марганцово-кислаго кали или желѣзнаго купороса, а равно обмывать руки сулемовымъ мыломъ или сулемовымъ растворомъ (1 часть сулемы на 3,000 ч. воды).

Чистый, свѣжій воздухъ необходимъ для каждаго больного. Поэтому варить пищу, а равно мыть и сушить бѣлье въ комнатѣ больного безусловно запрещается; а также вредны всякія сильно-пахучія лѣкарства, дымъ, копоть и т. п. Лѣтомъ одно окно должно быть открыто днемъ и ночью, но такъ, чтобы не было сквозняка. Зимою же комнату больного провѣтривать какъ можно чаще. При глазныхъ страданіяхъ или болѣзняхъ, сопровождаемыхъ таковыми, окна можно завѣшивать. Ночью не жечь въ комнатѣ больного керосиновыхъ

лампъ или сальныхъ свѣчей, а лучше всего стеариновыя свѣчи.

Спальня больного не должна быть слишкомъ жарко протапливаема. Температура ея не должна быть выше 13 град. Реом., въ особенности при лихорадкахъ. Зимою полезно ставить на печку или каминъ открытый сосудъ съ водою, къ которой прибавить чайную ложку сосновой тинктуры.

Полы ежедневно обтирать мокрой тряпкой.

Кровать больного не должна стоять близъ печки или у дверей, а также не заставляться ширмами или занавѣсями, такъ какъ это мѣшаетъ свободному доступу воздуха. Лучше всего пружинныя кровати и мягкія шерстяныя одѣяла. Подушки должны быть волосяныя или набиты морской травой, бѣлье всегда чистое и покрывала самыя легкія, даже при такихъ болѣзняхъ, какъ скарлатина, корь и оспа. Дѣти не должны лежать въ мокрой постели; но бѣлье нужно перемѣнять съ надлежащими предосторожностями: оно не должно быть сырое, и въ холодное время его не мѣшаетъ немного согрѣть у печки передъ надѣваніемъ.

Теплыя ванны въ большинствѣ случаевъ очень полезны, въ особенности при лихорадкахъ, такъ какъ онѣ умѣряютъ жаръ тѣла. Вмѣсто ванны, можно дѣлать и обтиранія, но для этого берется не слишкомъ холодная комнатная вода.

Какъ питье, лучше всего чистая, свѣжая вода, не слишкомъ холодная и въ умѣренномъ количествѣ. Минеральныя воды можно пить только по назначенію врача, такъ какъ онѣ не при всѣхъ болѣзняхъ примѣнимы. Сахарная вода, морсы, фруктовые соки, варенье и лимонады тоже могутъ быть употребляемы только съ разрѣшенія врача.

Діэта должна быть самая строгая. Больнымъ даютъ только легко переваримую пищу и небольшими порціями. Полезны: молоко, цѣльное или разбавленное водою, лучше кипяченое; слабый нежирный мясной бульонъ или отваръ изъ телячьихъ костей; яйца въ смятку, фрукты, въ особенности въ видѣ компота или киселя, а также всякіе овощи; бѣлый хлѣбъ, нѣжная нежирная говядина и сырая скобленая ветчина. Вино и пиво употреблять съ большою осторожностью, только съ дозволенія врача, а водка, ликеры, коньякъ и т. п.

ни подъ какимъ видомъ не разрѣшаются. Не заставлять больного насильно ѣсть или пить, а равно не слѣдуетъ удовлетворять его каприза въ случаѣ, если онъ пожелаетъ какое-либо запрещенное кушанье или питье.

Не слѣдуетъ утомлять и безпокоить больного продолжительными и громкими разговорами и отнюдь не нарушать его сна. Маленькихъ дѣтей не носить долго передъ сномъ, а равно не укачивать въ люлькахъ.

Слѣдить за правильнымъ, ежедневнымъ отправленіемъ на низъ и въ случаѣ отсутствія такового не употреблять сильныхъ слабительныхъ, а лучше ставить клистиры. Также безвредны свѣчки изъ мыла или масла какао, а равно тамариндовая лепешка или ложка касторового масла.

Не позволять больному плевать на полъ, а ставить для этого сосудъ съ водою или пескомъ.

Изверженія и испражненія нужно тотчасъ уносить изъ комнаты больного и дезинфектировать насыщеннымъ растворомъ марганцово-кислаго кали или сулемовымъ растворомъ (1 : 2000), а также держать ночные горшки въ строгой чистотѣ.

Если трудно-больного переносятъ на другую постель или сажаютъ его на стулъ, то полезно передъ этимъ дать ему столовую ложку хорошаго вина.

Въ періодѣ выздоровленія, въ діэтѣ нужно быть очень разборчивымъ и осторожнымъ. Малѣйшая погрѣшность въ пищѣ или питьѣ можетъ повести къ возврату болѣзни. Въ особенности трудно бываетъ это время съ дѣтьми, которыя безсознательно требуютъ того, чего нельзя, и капризничаютъ, когда желаніе ихъ не удовлетворяется; тѣмъ не менѣе, не слѣдуетъ потакать капризамъ, но нужно дѣйствовать въ этихъ случаяхъ обдуманно.

Нѣкоторыя гигіеническія наставленія.

1. Ежедневно, вставши съ постели, обмывать голову, грудь, спину и животъ холодною или комнатною водою съ мыломъ или еще лучше принять душъ изъ комнатной воды.

Лѣтомъ очень полезны рѣчныя купанія. Если тѣло находится въ разгоряченномъ состояніи, то не слѣдуетъ пред-

варительно остывать на берегу, а, наоборотъ, быстро раздѣться, вытереть потъ и затѣмъ тотчасъ же окунуться въ воду.

Послѣ путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и вообще послѣ дороги очень полезно и освѣжающе дѣйствуетъ теплая ванна.

2. Спальня должна быть большая, свѣтлая, сухая и чистая. Окна должны быть открыты цѣлый день, а на ночь оставлять открытыми форточки, если это позволяетъ погода, при чемъ надо устранять всякую возможность сквозняка. Одѣяла, подушки, простыни и вообще постель нужно какъ можно чаще провѣтривать. Въ другихъ жилыхъ комнатахъ также необходимо соблюдать чистоту и свѣжесть воздуха и стараться, чтобы не было пыли, копоти, чаду и т. п. Температура должна быть 14—16 градусовъ по Реомюру.

Ежедневныя прогулки на свѣжемъ воздухѣ въ продолженіе часа, съ глубокими вдыханіями, очень полезны, при чемъ не слѣдуетъ ходить скоро или бѣгать.

Передъ отъѣздомъ въ далекое путешествіе нужно своевременно все обдумать и приготовить, чтобы больному не волноваться въ послѣднія минуты. Вспотѣвши, не подвергать себя сквозняку и не охлаждаться въ холодномъ мѣстѣ (напр., въ погребѣ, ледникѣ и т. п.). Во время ѣзды на желѣзной дорогѣ не высовывать головы изъ вагона, такъ какъ сильная тяга очень вредно дѣйствуетъ на глаза.

Избѣгать многолюдныхъ сборищъ и собраній въ такихъ помѣщеніяхъ, гдѣ вентиляція плохая и не открываются двери и окна, такъ какъ удушливый спертый воздухъ очень вредно дѣйствуетъ на здоровье.

3. Здоровый человѣкъ долженъ имѣть не менѣе 7 часовъ ночного отдыха. Слабые и больные субъекты и дѣти должны спать больше. Ложиться въ постель своевременно, не позже 12 час. ночи, и, проснувшись утромъ, вставать тотчасъ же.

Послѣ обѣда всякое движеніе, какъ тѣлесное, такъ и умственное, вредно; полезно же, въ особенности лицамъ старшаго возраста, отдохнуть лежа съ $^1/_2$ часа.

Не подвергать организмъ свой переутомленію, а давать ему послѣ работы надлежащій отдыхъ и спокойствіе. Поэтому

воскресный день долженъ служить непремѣнно днемъ безусловнаго отдыха.

4. Голову нужно содержать прохладно, а ноги въ теплѣ. Мокрыя ноги легко предрасполагаютъ къ заболѣваніямъ, а равно мокрая одежда, поэтому остерегаться того и другого. Зимою полезно носить шерстяные чулки, а лѣтомъ бумажные, при чемъ часто мѣнять ихъ.

Одежда не должна быть узкой и тяжелой: зимою теплая, а лѣтомъ легкая и свободная. Подверженнымъ простудѣ рекомендуется носить всегда бумажное бѣлье д-ра Ламана.

Шею не слѣдуетъ укутывать; въ комнатѣ снимать кашнэ и шали. Обувь носить свободную и на низкихъ каблукахъ.

Корсеты, въ особенности сильно стягиваемые, служатъ часто причиною всевозможныхъ женскихъ болѣзней.

5. Для достиженія глубокой старости необходимо прежде всего соблюдать строгую діэту въ пищѣ и питьѣ. Кофе, а равно всякіе спиртные напитки, вредны, а наиболѣе губительно на организмъ дѣйствуетъ водка, которой нужно остерегаться.

Пища должна быть простая и принимать ее нужно спокойно и не торопясь; скоро пить и ѣсть вредно. Слѣдуетъ всегда хорошенько пережевывать ее и смѣшивать со слюною, въ противномъ случаѣ она трудно переваривается и производитъ различныя разстройства въ пищеваренiи. Питье и кушанья вредно употреблять горячими и пища должна быть разнообразная; ѣсть много мяса нездорово, въ особенности дѣтямъ. Лѣтомъ лучше всего овощи и всякая растительная пища. Послѣ ѣды плоды и ягоды очень полезны.

Куреніе табаку вообще очень вредно, но въ особенности передъ ѣдою.

Пить за ѣдой вообще нехорошо. Кофе послѣ ѣды полезно только лицамъ, страдающимъ разстройствомъ пищеваренія.

Послѣ ѣды полоскать ротъ свѣжею водою и тщательно удалять частички пищи, застрявшія въ зубахъ. Ежедневно чистить зубы порошкомъ зубнымъ съ примѣсью небольшого количества мыла.

На ночь не употреблять тяжелой, трудно-варимой пищи, не пить много вина и пива и не курить крѣпкихъ сигаръ, а

равно не совѣтуютъ заниматься умственною работою послѣ ужина и не ложиться спать съ полнымъ желудкомъ.

Въ разгоряченномъ состояніи не слѣдуетъ пить ничего холоднаго, и это можно себѣ позволить очень осторожно, только находясь въ движеніи.

По утрамъ, натощакъ, выпивать глотками стаканъ холодной воды и прополаскивать горло очень полезно.

6. Пріучать желудокъ къ правильному ежедневному отправленію, лучше всего по утрамъ, и никогда не задерживать выдѣленій, а строго слѣдовать требованіямъ природы.

Вскармливаніе маленькихъ дѣтей.

Самымъ лучшимъ, ничѣмъ незамѣнимымъ средствомъ для этого служитъ, конечно, материнское молоко, вслѣдствіе лишенія котораго многія дѣти умираютъ.

Материнское молоко можно замѣнить только коровьимъ; но послѣднее содержитъ больше жировыхъ веществъ и меньше сахара, вслѣдствіе чего оно легко створаживается и киснетъ. Поэтому его нужно разводить водою и подслащать.

Неразведенное молоко давать новорожденнымъ младенцамъ безусловно воспрещается. Разводить же его слѣдуетъ только кипяченою водою и подслащать молочнымъ сахаромъ или самымъ лучшимъ рафинаднымъ сахаромъ. Затѣмъ, молоко должно быть отъ здоровыхъ коровъ и не очень жирное. Коровъ нужно содержать въ чистыхъ, хорошо вентилируемыхъ хлѣвахъ и не кормить солодомъ, отрубями и т. п., такъ какъ такое молоко вредно для младенцевъ.

Для здоровыхъ и сильныхъ новорожденныхъ дѣтей 1 часть молока разбавляютъ 3 частями воды, а для слабыхъ, больныхъ и недоносковъ—не менѣе, какъ 4 частями. Если ребенокъ хорошо переноситъ такое молоко, то по истеченіи 6—8 недѣль ему даютъ сперва одинъ разъ въ день, по утрамъ, молоко въ пропорціи 1 части на 2 части воды, а въ теченіе дня 1 ч. на 3; черезъ 4—5 дней и вечеромъ. Съ 10-й недѣли уже при каждомъ кормленіи дается молоко въ пропорціи 1 ч. на 1 ч. воды.

На каждую бутылку разведеннаго молока прибавляютъ чайную ложку молочнаго сахара. Въ общемъ, ребенка слѣдуетъ кормить черезъ каждые 3 часа; слабыхъ же дѣтей чаще, но маленькими порціями. Первый разъ слѣдуетъ кормить ребенка въ 5—6 час. утра, а послѣдній—въ 10—11 час. вечера. Ночью кормить не болѣе 1—2 разъ, и если ребенокъ въ промежуткахъ этого безпокоится и плачетъ, то все-таки не давать молока, а въ крайнемъ случаѣ немного чистой или подслащенной воды. Укропный или ромашковый чай вреденъ.

Какъ только начинаютъ прорѣзываться зубы, т.-е., на 7—8 мѣсяцѣ, то кромѣ жидкой пищи, можно прикармливать еще и кашицей. Дольше 9 мѣсяцевъ не слѣдуетъ кормить ребенка грудью, такъ какъ отъ этого страдаетъ и мать, а въ особенности младенецъ.

Для прикармливанія лучше всего мука Нестле, а затѣмъ легкій нежирный бульонъ съ сухарями или съ размѣшаннымъ въ немъ яйцомъ.

На дессертную ложку муки Нестле берутъ 2 чашки воды, кипятятъ и затѣмъ прибавляютъ $^2/_3$ молока и немного соли.

Такую кашку даютъ въ первую недѣлю 1 разъ въ день, затѣмъ 2 раза и спустя еще недѣлю 3 раза.

Годовой ребенокъ, котораго можно кормить съ ложечки, получаетъ кашку въ 7 час. утра, въ 12 час. дня и въ 7 ч. вечера; а молоко—въ 10 ч. утра и въ 3 часа дня. На такой діэтѣ воспитывать ребенка до второго года, и только, когда онъ совершенно здоровъ, можно давать иногда понемногу плодовъ, рубленыя куриныя котлетки и т. п.

Нѣкоторыя дѣти совсѣмъ не переносятъ ни коровьяго, ни козьяго молока, и кромѣ того не вездѣ можно достать хорошее, свѣжее, нефальсифицированное молоко. Поэтому приходится искусственное кормленіе молокомъ замѣнять другими средствами.

Къ такимъ средствамъ слѣдуетъ прибѣгать только въ крайней необходимости и съ большою осторожностью, и рекомендовать предпочтительно одно предъ другимъ невозможно. Иногда приходится испытывать, которое изъ нихъ наиболѣе подходящее, т.-е., которое наилучше переносится ребенкомъ. Если желудокъ его исправенъ, испражненія не жид-

кія и желтаго цвѣта, то это указываетъ, что пищевое вещество переносится ребенкомъ; если же являются запоры или поносы, зеленоватаго цвѣта, или наступаетъ частая рвота, то это прямо указываетъ на непригодность пищевого продукта.

Изъ искусственныхъ пищевыхъ веществъ, могущихъ съ успѣхомъ замѣнить молоко, можно рекомендовать слѣдующія:

Растительное молоко Ламана, Лефлунда—дѣтское молоко, Англійское сгущенное молоко Свиса и Швейцарское сгущенное молоко. Лучшимъ препаратомъ считается растительное молоко д-ра Ламана.

При кормленіи разведеннымъ коровьимъ молокомъ дѣти иногда страдаютъ поносами. Въ этихъ случаяхъ нужно тот часъ же обратить вниманіе на качество молока и лѣчить желудокъ подходящими лѣкарствами.

Для кипяченія молока рекомендуется аппаратъ проф. Сокслета, достоинства котораго заключаются въ томъ, что онъ кипятитъ молоко, разбавленное и неразбавленное, въ герметически закупоренныхъ бутылочкахъ. При этомъ всякія органическія примѣси, находящіяся въ молокѣ, совершенно уничтожаются и становятся безвредными; кромѣ того, такое молоко не содержитъ и бродильныхъ веществъ. Каждая бутылочка такимъ образомъ приготовленнаго молока служитъ одновременно и тою порціею, какую слѣдуетъ давать младенцу на разъ: остальныя служатъ для запаса и расходуются по мѣрѣ надобности. Передъ тѣмъ какъ давать ребенку молоко, бутылочку предварительно ставятъ въ теплую воду на нѣсколько минутъ. Такимъ образомъ приготовленное молоко сохраняется очень хорошо въ теченіе 2—3 дней при обыкновенной комнатной температурѣ. Аппаратъ проф. Сокслета приноситъ большую пользу въ большихъ городахъ и мѣстностяхъ, гдѣ очень трудно имѣть хорошее, свѣжее молоко.

Есть, однако, дѣти, которыя совсѣмъ не переносятъ ни коровьяго молока, ни другого искусственнаго кормленія, и въ такихъ случаяхъ необходимо взять кормилицу. Кормилица должна быть не моложе 18 и не старше 25 лѣтъ. При выборѣ кормилицы необходимо обратиться къ врачу, который можетъ опредѣлить качество ея молока, состоянія ея здоровья и то количество молока, которое она способна дать

ребенку. Кромѣ того, необходимо, чтобы кормилица была чиста, опрятна, хорошаго поведенія и не употребляла спиртныхъ напитковъ,—водки, пива и т. п. Кормилица не должна ѣсть кислой, трудно-варимой и раздражающей пищи, а пить можетъ молоко, слабый чай и чистую воду.

Ребенку должно давать молоко теплымъ, 27-28° по Реомюру. Эту температуру можно приблизительно опредѣлить, если приложить стклянночку съ молокомъ къ щекѣ: такая теплота для лица пріятна.

Приготовленіемъ пищи для ребенка должна завѣдывать мать или вообще лицо надежное, такъ какъ малѣйшая ошибка или отклоненіе отъ данныхъ предписаній влечетъ за собою серьезныя послѣдствія. Въ этомъ случаѣ необходимо соблюдать самую строгую чистоту и аккуратность.

Самое строгое вниманіе должно быть обращено также и на посуду, изъ которой кормятъ младенца. Скляночки для молока, изъ которыхъ сосутъ дѣти, должно тотчасъ послѣ употребленія вымыть съ содой или съ солью и, хорошенько прополоскавъ, высушить въ печкѣ. Для этой цѣли лучше всего скляночки проф. Сокслета или простыя аптечныя стклянки. Стклянки съ длинными резиновыми трубками непригодны, такъ какъ ихъ очень трудно промывать; въ особенности лѣтомъ онѣ оказываются вредными, потому что молоко, остающееся въ трубкѣ и въ соскѣ, быстро скисаетъ. Соски резиновые, надѣваемые на бутылочки, тотчасъ послѣ употребленія выворачивать, промывать и держать въ чистой водѣ.

Послѣ кормленія не оставлять сосокъ во рту ребенка, а равно не давать сосать пустую стклянку: отъ этого часто являются желудочныя разстройства и другія болѣзни.

Въ жаркое лѣтнее время не слѣдуетъ отнимать ребенка отъ груди, а равно не слѣдуетъ въ такое время переходить отъ кормленія грудью къ искусственному питанію, въ особенности, если существуютъ эпидеміи желудочныхъ болѣзней.

Полезныя вспомогательныя средства мѣры для сохраненія здоровья.

Холодныя купанья и ванны.

Наиболѣе дѣйствительными и полезными для здоровья считаются рѣчныя и морскія купанья.

Купанья можно замѣнить ваннами, для чего пользоваться рѣчною или колодезною водою. Если назначены соленыя ванны, то на каждую ванну берутъ 1—4 фунтовъ (смотря по возрасту больного) надлежащей соли. Въ ваннѣ сидѣть отъ 1—5 минутъ.

Больнымъ рѣдко назначаютъ холодныя ванны, и обыкновенно 10—20 градусовъ по Реомюру.

Послѣ холодной ванны полезны сухія обтиранія тѣла шершавыми полотенцами и послѣ этого прогулка на свѣжемъ воздухѣ.

Теплыя ванны.

Температура воды опредѣляется особеннымъ термометромъ, который погружаютъ на нѣсколько минутъ въ ванну, помѣшивая имъ воду. Постепеннымъ прибавленіемъ горячей воды поддерживается равномѣрная температура 23—28 градусовъ по Реомюру. Ванна продолжается 15—25 минутъ. Если у больного заболитъ голова, то положить на голову губку, смоченную въ холодной водѣ. Если же является слабость, то его необходимо взять изъ ванны. Послѣ ванны больного завертываютъ сперва въ нагрѣтую полотняную простыню и затѣмъ въ теплыя шерстяныя одѣяла. Если требуется вызвать потъ, то въ такомъ завернутомъ видѣ его оставляютъ на $^1/_2$ часа и болѣе.

Ванны назначаются:

1. Отрубяныя: 3—6 фунтовъ пшеничныхъ отрубей варятъ въ холщевомъ мѣшкѣ и затѣмъ вливаютъ въ ванну какъ отваръ, такъ и выжимки изъ мѣшка.

2. Соленыя: 1—4 фунтовъ поваренной или морской соли растворяютъ въ теплой водѣ и вливаютъ въ ванну.

3. Сѣрныя: 2—4 лота сѣрной печени растворяютъ въ водѣ и примѣшиваютъ.

Сидячая холодная ванна.

Въ спеціально для этой цѣли приспособленную ванну или обыкновенную низкую кадку наливаютъ приблизительно до 1/4 ея объема холодной воды и, раздѣвшись или полураздѣвшись, садятся въ нее. Половина нижней части живота, до почекъ, и верхняя часть бедеръ должна быть подъ водою. Нижняя часть бедеръ, колѣни и ноги должны быть внѣ воды. Продожительность такой ванны 1/2—3 минутъ.

Такія ванны очень полезны при болѣзняхъ брюшныхъ органовъ; онѣ регулируютъ отправленія желудка и кровообращенія.

При безсонницѣ такая ванна оказываетъ огромную услугу и, если ее дѣлать, какъ указано выше, никогда не можетъ повредить.

Сидячая теплая ванна.

Для этого берутъ воду въ 24-26 градусовъ Реомюра и сидѣть въ такой ваннѣ можно до 15 минутъ.

Сидячія ванны можно дѣлать 2-3 раза въ недѣлю; попеременно же съ холодными и чаще.

Онѣ назначаются при хроническомъ страданіи почекъ, мочевого пузыря, геморроѣ, запорѣ, каменной болѣзни съ судорожными проявленіями и коликами.

Головная ванна.

Головныя ванны назначаютъ холодныя и теплыя.

Наливаютъ сосудъ водою, ставятъ на стулъ и погружаютъ въ воду верхнюю часть головы, покрытую волосами: для холодной ванны на 1 минуту, а для теплой на 5-6 минутъ. Въ случаѣ, если не вся волосистая часть головы будетъ смо-

чена водою, то можно это сдѣлать поливаніемъ съ рукъ. Затѣмъ волосы вытереть и дать имъ высохнуть. Можно также, во избѣжаніе простуды головы, надѣвать шапку, пока волосы не высохнутъ.

Головныя ванны назначаются при нарывахъ, сухихъ сыпяхъ, перхоти и вообще при нечистотѣ головной кожи.

Глазныя ванны.

Лучше всего дѣлать глазныя ванны такъ: лобъ и глаза погружаютъ въ холодную ванну приблизительно на 1/2 минуты, затѣмъ отдохнуть 1-2 минуты и опять окунуть лобъ и глаза въ воду. Такое погруженіе можно повторять 3-4 раза и болѣе.

Теплыя ванны, въ 24—26°, дѣлаются такъ же, какъ холодныя, но закончить ихъ необходимо холодною ванною или, по крайней мѣрѣ, промыть глаза холодною водою. Можно прибавлять на каждую ванну нѣсколько капель *тинктуры Евфразіи.*

Холодныя ванны назначаются для укрѣпленія слабыхъ глазъ; а теплыя—для размягченія опухолей и затвердѣній и для промыванія нагноеній и засореній наружныхъ частей глаза.

Паровыя ванны.

1. Паровыя ванны верхней части туловища. Сосудъ съ кипящею водою, герметически закрытый крышкою, ставятъ на низкій стулъ или скамейку. Больной снимаетъ верхнюю одежду, рубашку и пр. до половины туловища и обвязываетъ себя вокругъ пояса сухимъ полотенцемъ, для того, чтобы стекающій потъ не замачивалъ нижней одежды. Онъ садится на высокій стулъ или ящикъ или становится передъ сосудомъ съ горячею водою, нагибается и руками упирается въ края сосуда. Затѣмъ его закрываютъ шерстяными одѣялами такъ, чтобы какъ верхняя часть туловища, такъ голова и сосудъ съ горячею водою были со всѣхъ сторонъ прикрыты и чтобы пары не могли улетучи-

ваться наружу. Тогда крышку съ сосуда снимаютъ и паръ обдаетъ равномѣрно голову, грудь, спину и остальныя части верхняго туловища. Глаза, носъ и ротъ держатъ при этомъ открытыми, чтобы водяные пары могли и туда проникнуть. По истеченіи 15—20 минутъ покрывало снимаютъ и быстро обмываютъ туловище свѣжею комнатною водою. Послѣ этого быстрое движеніе, зимою въ комнатѣ, а лѣтомъ на воздухѣ, пока тѣло не обсохнетъ и не согрѣется опять. Вмѣсто обтиранія холодною водою, можно принять холодную ванну, но оставаться въ ней не долѣе 1 минуты.

Паровыя ванны полезны отъ простуды, головныхъ страданій, шума въ ушахъ, ревматическихъ болей, насморка, гриппа, воспаленія глазъ, опухоли железъ и другихъ болѣзней, которыя являются слѣдствіемъ простуды. Такія ванны можно дѣлать 2—3 раза въ недѣлю.

2. Ножная паровая ванна. Больной раздѣваетъ совершенно ноги и садится на стулъ, передъ которымъ ставятъ сосудъ, до половины наполненный кипяткомъ. По краямъ сосуда кладутъ деревянныя дощечки такъ, чтобы можно было свободно помѣстить на нихъ ноги, и закрываютъ, какъ сосудъ, такъ и ноги теплыми одѣялами такъ плотно, чтобы пары не выходили наружу.

Къ кипятку можно прибавить ромашку или другую какую-либо лѣчебную траву. Для поддержанія высокой температуры воды, отъ времени до времени погружаютъ въ нее раскаленный кирпичъ и т. п.

Такая ванна можетъ продолжаться 15—30 минутъ. Послѣ этого обмываютъ нижнія конечности холодною водою или берутъ прохладную полуванну, въ теченіе 1—1½ минуты.

Онѣ очень полезны при ножныхъ потахъ, при опухоли ногъ, холодныхъ ногахъ, ногтоѣдѣ, вросшихъ ногтяхъ и зараженіи крови, а также при приливахъ крови къ головѣ, судорогахъ желудка и т. п. Ихъ можно повторять 1—2 раза въ недѣлю.

3. Паровая ванна нижней части живота. Горячую воду наливаютъ въ горшокъ, который помѣщается подъ особо для этой цѣли приспособленный стульчакъ.

Пацiента сажаютъ такъ, чтобы пары не выходили наружу; черезъ нѣсколько времени они оказываютъ свое дѣйствiе сильнымъ отдѣленiемъ пота. Продолжительность такой ванны 15—20 минутъ. Если больному необходимо еще пропотѣть нѣкоторое время, то положить его въ постель и хорошенько закрыть. Затѣмъ дѣлаютъ общую теплую ванну.

Въ ванну можно примѣшивать овсяную солому, свѣжее сѣно, хвощъ.

Такiя ванны полезны при болѣзняхъ почекъ, каменной болѣзни, болѣзни мочевого пузыря, въ началѣ водянки, при ревматическомъ или судорожномъ состоянiи брюшныхъ органовъ.

Души.

Для здоровыхъ холодный душъ послѣ теплой ванны очень полезенъ. Ревматическiя, зубныя и лицевыя боли излѣчиваются очень скоро при правильномъ примѣненiи душа.

Больнымъ можно дѣлать мѣстные души съ помощью обыкновенной спринцовки или поливанiемъ изъ обыкновенной лейки больныхъ частей, напр., спины, груди, колѣнъ, нижней части живота и т. п.

Для душа употребляется обыкновенно холодная вода, при чемъ больной долженъ помѣщаться въ ваннѣ.

Примочки.

Примочки бываютъ охлаждающiя и возбуждающiя.

Охлаждающiя примочки дѣлаютъ такъ: Берутъ кусокъ бѣленаго полотна, складываютъ вчетверо, смачиваютъ въ холодной водѣ и, почти не выжимая, прикладываютъ къ больному мѣсту. Такiя примочки возобновлять по мѣрѣ согрѣванiя воспаленнаго мѣста.

Возбуждающiя примочки дѣлаютъ такъ: Намоченное водою полотно крѣпко выжимаютъ и туго накладываютъ на больное мѣсто; сверхъ этого накладываютъ такого же размѣра кусокъ сухой фланели, завязываютъ и оставляютъ такъ, пока компрессъ не высохнетъ. Черезъ 2, 3, 4 часа его возобновляютъ.

Мокрыя обертыванія.

Намачиваютъ простыню въ холодной водѣ, хорошенько выжимаютъ и разстилаютъ на сухомъ шерстяномъ одѣялѣ, а въ крайнемъ случаѣ на какомъ-либо другомъ одѣялѣ или на перинѣ. Затѣмъ кладутъ совершенно раздѣтаго больного на мокрую простыню, въ которую быстро его заворачиваютъ, оставляя голову и шею свободными, а затѣмъ плотно укутываютъ въ одѣяло и покрываютъ еще периной или шубой.

Если послѣ обертыванія тѣла повышается лихорадочный жаръ или появляются безпокойныя явленія, то нужно прекратить обертыванія и посадить больного въ полуванну. Если выступилъ потъ, то оставить хорошенько пропотѣть и затѣмъ обмыть тепловатой водою или сдѣлать теплую ванну. Обертыванія можно продолжать 1—1½ часа. Если больной послѣ обертыванія не ложится въ постель, то его необходимо очень тепло одѣть.

Иногда примѣняются и полуобертыванія, и въ этомъ случаѣ завертываются только туловище и ноги, а руки остаются наружу. Полуобертыванія можно дѣлать впродолженіе нѣсколькихъ часовъ и даже оставлять больного въ такомъ видѣ всю ночь, при чемъ онъ можетъ надѣть на себя сверху ночную рубашку, чтобы руки и плечи не оставались открытыми.

Согрѣвающіе компрессы.

Сложенный въ нѣсколько разъ платокъ или кусокъ холста смачиваютъ въ водѣ, выжимаютъ, прикладываютъ къ больному мѣсту и тотчасъ же покрываютъ плотно клеенкой или резиновымъ полотномъ; поверхъ этого накладываютъ фланель или фланелевый бинтъ и хорошо и плотно завязываютъ. Днемъ согрѣвающій компрессъ можно перемѣнять 3—4 раза, а къ ночи положенный компрессъ оставляется обыкновенно до слѣдующаго утра. Согрѣвающіе компрессы очень полезны при вывихахъ, растяженіяхъ, при хрипотѣ, крупѣ, горловой жабѣ, катаррѣ бронховъ, при слабости пищеваренія, желудочно-кишечныхъ страданіяхъ и пр.

Массажъ.

Подлежащую массированію часть тѣла смазываютъ арнпковымъ или прованскимъ масломъ. Если нужно массировать мѣсто, покрытое волосами, то волосы необходимо гладко выбрить. Затѣмъ начинаютъ поглаживать обѣими руками сперва въ окружности больного мѣста, затѣмъ постепенно приближаясь къ больному центру. Поглаживаніе должно производить сперва тихо и нѣжно, мало-по-малу усиливая его, и переходить затѣмъ къ кругообразному растиранію, послѣ чего, въ упорныхъ случаяхъ, приступаютъ къ разминанію, съ цѣлью какъ бы раздавить воспалительные выпоты и припуханія и заставить ихъ быстрѣе разсасываться. Если такое разминаніе и причинитъ сначала боль въ массируемомъ мѣстѣ, то не слѣдуетъ этимъ смущаться, такъ какъ эта боль временная и скоро проходящая.

При тугоподвижности суставовъ, больному члену производятъ легкія движенія, которыя паціентъ затѣмъ долженъ стараться исполнять самъ. Такія движенія нужно производить утромъ и вечеромъ по 10—15 минутъ.

Массажъ очень полезенъ при воспаленіи въ суставахъ, суставномъ ревматизмѣ, растяженіи мускуловъ, опухоли колѣнъ, пострѣлѣ и т. п. При ушибахъ и механическихъ поврежденіяхъ массажъ очень рекомендуется, иногда вмѣстѣ съ примѣненіемъ согрѣвающихъ компрессовъ.

При хроническихъ запорахъ массажъ имѣетъ отличное дѣйствіе. Его примѣняютъ въ формѣ поглаживанія, растиранія, разминанія, подавливанія, пошлепыванія и поколачиванія живота.

Лѣчебная гимнастика.

Всѣ болѣзни, являющіяся слѣдствіемъ ослабленія какихъ бы то ни было мышечныхъ группъ, улучшаются или излѣчиваются при правильномъ и продолжительномъ примѣненіи лѣчебной гимнастики.

Посредствомъ систематическихъ и легко исполнимыхъ упражненій мускуловъ рукъ, груди, нижней части живота

и ногъ, таковые постепенно укрѣпляются и возвращаются къ прежней нормальной дѣятельности.

Существуютъ общедоступныя руководства къ производству гимнастики, напр., д-ра Шребера или Ангерштейна и др., которыми и слѣдуетъ пользоваться при лѣченіи гимнастикой.

Кромѣ того, нужно имѣть такъ называемый „реставраторъ", представляющій изъ себя жгутъ изъ толстой резины, при ежедневномъ и правильномъ употребленіи котораго можно значительно развить мускулы, усилить кровообращеніе и укрѣпить легкія.

Для слабогрудыхъ, въ особенности у которыхъ подозрѣваютъ наслѣдственную склонность къ заболѣванію чахоткою, лѣчебная гимнастика очень полезна.

Лѣчебная гимнастика укрѣпляетъ мускулы рукъ, шеи, грудной клѣтки и спинного хребта; поэтому развиваетъ грудь, усиливаетъ дыханіе и вообще способствуетъ возстановленію ослабѣвшихъ членовъ человѣческаго организма и дѣйствуетъ возбуждающе и освѣжающе.

Дыхательная гимнастика.

Беруть обѣими руками обыкновенную палку и захватываютъ ее при спущенныхъ вдоль туловища верхнихъ конечностяхъ такъ, чтобы четыре пальца каждой руки лежали кнаружи, а большіе пальцы кнутри. Затѣмъ, не измѣняя разстоянія между руками и не сгибая ихъ, палку сильно поднимаютъ кверху, чтобы она приняла горизонтальное положеніе надъ головою. Послѣ этого, такимъ же сильнымъ и быстрымъ движеніемъ сгибаютъ локти такъ, что палка ложится на затылокъ, а руки наивозможно ближе приходятся надъ плечами. Послѣ 10—12 такихъ движеній, способствующихъ растяженію грудной клѣтки и увеличенію ея объема въ продольномъ поперечникѣ, нужно остановиться и, держа палку на затылкѣ, нѣсколько разъ вдыхать воздухъ носомъ и выдыхать ртомъ, сдѣлать опять глубокое вдыханіе, задержать его нѣсколько времени и сдѣлать такое же сильное выдыханіе ртомъ. Такія вдыханія

и выдыханія нужно повторять продолжительное время на свѣжемъ воздухѣ или при открытыхъ окнахъ, и хотя эти упражненія сначала трудны для слабогрудыхъ, но они приносятъ имъ большую пользу. Достаточно производить три раза въ день по 20 такихъ глубокихъ вдыханій подъ рядъ.

Такими упражненіями легкихъ можно остановить и даже излѣчить чахотку въ ея начальномъ періодѣ.

Лѣченіе сухарями.

Этотъ методъ лѣченія практикуется въ такихъ случаяхъ, когда необходимо привести болѣзненныя образованія къ распаденію натуральнымъ путемъ и возбудить организмъ къ самодѣятельности. Онъ состоитъ въ томъ, что больному даютъ продолжительное время только сухари и теплое вино. Въ промежуткахъ, въ такъ называемые дни отдыха, назначается другая діэта. Такимъ способомъ достигались отличные результаты при болѣзняхъ желудка и брюшныхъ органовъ.

Лѣченіе діэтой.

Особенно полезно весною.

Вставать въ 5½ час. утра, тотчасъ же облить тѣло холодной водой или взять душъ, быстро обтереть тѣло толстыми шершавыми полотенцами и тотчасъ же одѣваться. Выпить 1—2 стакана холодной воды и часъ гулять въ лѣсу или саду, дѣлая глубокія вдыханія.

Завтракъ, въ 9 час., долженъ состоять изъ молока съ сухарями и яблокъ. Приступить къ обычной работѣ.

Обѣдъ: Картофель, овощи, зелень, салатъ, мучное (рисъ со сливками), компотъ, яблоки печеныя съ молокомъ; затѣмъ часъ отдохнуть; вмѣсто кофе, выпить стаканъ холодной воды и опять за работу.

Вечеромъ: въ 6—7 часовъ молоко съ сухарями и фрукты; ½ часа отдыха и затѣмъ 1—2 часа гулять; въ 10 часовъ ложиться спать. Передъ сномъ стаканъ холодной воды. Спать при открытыхъ окнахъ, но чтобы не было тяги

воздуха или сквозняка. Въ дурную погоду часы гулянія замѣнять гимнастикой, игрою въ кегли, распиливаніемъ дровъ и т. п.

Въ свободные дни (праздники) дѣлать дальнія прогулки, по возможности по горамъ.

При этомъ лѣченіи, которое можно начать, какъ только деревья покроются зеленью, и которое продолжается 4 недѣли, безусловно воспрещается не только всякая животная пища (какъ мясо, дичь и т. п.), но и всякіе возбуждающіе напитки: кофе, чай, вино, пиво, водки и т. п.

Лѣченіе молокомъ и яблочнымъ виномъ (сидръ).

Яблочная сыворотка приготовляется такъ: берутъ въ равныхъ частяхъ яблочное вино, молоко и воду, смѣшиваютъ и нагрѣваютъ, но не до кипѣнія. Жидкость процѣживаютъ, и она представляетъ уже яблочную сыворотку, которую употреблять лучше всего теплою, прибавляя къ ней, въ случаѣ желанія, немного сахара для исправленія вкуса.

Слабымъ субъектамъ даютъ ее раза три въ день по 1—2 столовыхъ ложки и никакъ не болѣе одной чашки. Если появятся боли подъ ложечкой или поносъ, то уменьшить дозу или вовсе прекратить сыворотку.

Болѣе крѣпкимъ давать столько же, но не процѣженную сыворотку, вмѣстѣ съ образовавшимся при нагрѣваніи творогомъ.

Это лѣченіе очень полезно при золотухѣ, англійской болѣзни, кашлѣ, вслѣдствіе катарральнаго раздраженія гортани, дыхательнаго горла и легкихъ; при неправильномъ пищевареніи, страданіи кишекъ, печени, малокровіи, тифѣ и выздоравливающимъ больнымъ послѣ изнурительныхъ болѣзней.

Лѣченіе виноградомъ.

Оно состоитъ въ употребленіи винограда въ большихъ количествахъ и назначается при страданіяхъ брюшныхъ органовъ.

При этомъ воспрещается жирная, мучная пища и овощи. Курорты: Меранъ и Дюркгеймъ.

Лѣченіе молокомъ.

Пить свѣжее коровье, козье или ослиное молоко столько, сколько можетъ воспринять организмъ. Большими количествами сразу не слѣдуетъ его выпивать, а съ маленькими и равномѣрными промежутками. Въ первую недѣлю молочнаго лѣченія не слѣдуетъ употреблять никакой другой пищи; со второй или третьей недѣли немного разрѣшается мясного бульона и сухари.

Молоко должно быть свѣжее, и при малѣйшемъ сомнѣніи въ свѣжести не употреблять его сырымъ, а только кипяченымъ. Посуда должна быть всегда чистая.

Молочное лѣченіе полезно при болѣзняхъ легкихъ, сердца и почекъ.

Желѣзистый лимонадъ.

Однимъ изъ лучшихъ препаратовъ желѣза считаются *Гензелевскія капли* (Hensel's tonicum), которыя заготовляются только въ гомеопатическихъ аптекахъ. Другіе желѣзистые препараты вызываютъ большею частью различныя побочныя дѣйствія, чего не замѣчается при употребленіи Гензелевскихъ капель. Даже дѣти переносятъ ихъ очень легко.

Малокровныя дѣвушки и женщины очень скоро поправляются, а равно слабые послѣ 10—14 дневнаго употребленія этихъ капель оживаютъ, аппетитъ у нихъ возстанавливается, они пьютъ и ѣдятъ нормально и очень быстро крѣпнутъ и увеличиваются въ вѣсѣ. Выздоравливающіе больные скоро входятъ въ силы, старики становятся бодрыми. На нервныхъ субъектовъ средство это дѣйствуетъ успокоивающимъ образомъ. При вялости, въ особенности лѣтомъ, оно дѣйствуетъ оживляюще и освѣжающе.

Лимонадъ этотъ приготовляется слѣдующимъ образомъ: на стаканъ сахарной воды прибавляютъ чайную ложку Гензе-

левскихъ капель и выпиваютъ это количество въ теченіе дня глотками. При этомъ нельзя ѣсть свѣжіе фрукты.

Какъ и всѣ желѣзистые препараты, Гензелевское желѣзо нужно также принимать продолжительное время, чтобы достигнуть вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ.

Діэта при лѣченіи гомеопатическими средствами.

А. Запрещается: 1. Крѣпкое пиво и вино, водки, ликеры, кофе, цикорій, чай и лимонады.

2. Пряности: перецъ, корица, тминъ, ваниль, гвоздика, лавровый листъ, мускатный орѣхъ, горькій миндаль, горчица, можжевельникъ, маслины, капорцы и т. п.

3. Кислые фрукты, смородина, крыжовникъ, уксусъ и слишкомъ кислая пища.

4. Супы съ петрушкой, лукомъ и др. ароматическими кореньями.

5. Кушанья, въ которыя положено *много*: селлерея, кресс-салата, тмина, чесноку, луку, трюфелей, хрѣну, огурцовъ, грибовъ.

6. Жирная свинина, соленое мясо, колбасы, сало, угорь, семга, паштеты, пироги, горячій хлѣбъ, кислая капуста, острый сыръ.

7. Куреніе табаку и сигаръ, въ особенности при горловыхъ и грудныхъ болѣзняхъ.

Б. Разрѣшается: 1. Свѣжая вода, сахарная или съ вареньемъ, молоко, миндальное молоко, легкое пиво. Для слабыхъ паціентовъ: токайское вино, шампанское, а также легуминозный шоколадъ, какао, желудовый кофе, гомеопатическій питательный кофе.

2. Яблоки, груши, сливы, какъ сырыя, такъ и вареныя, въ видѣ компота, сладкія вишни, виноградъ, земляника, абрикосы, персики, апельсины, винныя ягоды.

3. Рѣпа, брюква, морковь, цвѣтная капуста, шпинатъ. Легкія мучнистыя блюда, яйца въ смятку, картофель во всѣхъ видахъ.

4. Нежирный бульонъ или супъ съ рисомъ, саго, перловой крупой. Бѣлый хлѣбъ, овсянка. Куриный бульонъ.

5. Нежирное мясо вареное и жареное, молодая баранина, цыплята, голуби, сырая копченая ветчина, судаки, сиги, форель, лососина и т. п.

Сохраненіе лѣкарствъ.

Домашнія аптечки и вообще гомеопатическія лѣкарства слѣдуетъ сохранять въ сухомъ, чистомъ, не жаркомъ мѣстѣ. Они должны быть изолированы отъ дѣйствія солнечнаго свѣта и такъ, чтобы ни чадъ, ни дымъ, ни какіе-либо сильные запахи не могли проникнуть въ лѣкарства. Крѣпко пахнущія и летучія лѣкарства, какъ, напр., *Креозотъ*, *Камфора*, *Мускусъ*, должно сохранять отдѣльно, чтобы они не сообщали своихъ испареній другимъ лѣкарствамъ.

Гомеопатическія лѣкарства должно сохранять въ новыхъ стклянкахъ, хорошо закупоренными новыми бархатистыми пробками. Стклянка и пробка отъ одного лѣкарства не годится для другого, а потому нужно внимательно слѣдить за тѣмъ, чтобы не перемѣшать пробки. Во избѣжаніе такихъ случайностей, при отпускѣ гомеопатическихъ лѣкарствъ названіе ихъ и дѣленіе ставятся на стклянкѣ и на пробкѣ.

Лѣкарства, приготовленныя изъ минеральныхъ веществъ, какъ, напр., *Арсеникъ*, большею частью не теряютъ отъ времени своего лѣкарственнаго дѣйствія. Растительныя же— должно возобновлять чаще.

Когда лѣкарство мутнѣетъ, то его надо признать испорченнымъ.

Лѣкарства въ капляхъ, пилюляхъ, крупинкахъ и порошкахъ имѣютъ совершенно одинаковую дѣйствующую силу. Пилюли и крупинки удобнѣе по своей формѣ, такъ какъ ихъ можно вездѣ и всегда принимать, но онѣ сохраняются не такъ долго, какъ капли и порошки.

Повтореніе пріемовъ.

Въ острыхъ и опасныхъ болѣзняхъ лѣкарства даютъ въ частыхъ пріемахъ, черезъ 1—2 часа, а иногда даже черезъ 1/4 и 1/2 часа.

Въ хроническихъ, длительныхъ случаяхъ даютъ обыкновенно утромъ и вечеромъ по 1 пріему.

Лучшее время для дачи лѣкарства утромъ натощакъ, за часъ до ѣды и вечеромъ черезъ часъ послѣ ѣды или передъ сномъ. Этого правила нужно держаться вообще, т.-е., не давать лѣкарства позже, чѣмъ за часъ до ѣды, и не раньше, какъ черезъ часъ посѣ нея.

Въ хроническихъ случаяхъ лѣкарство принимаютъ 4—5 дней подъ рядъ, затѣмъ на нѣсколько дней останавливаются, выжидая его дѣйствія, и въ случаѣ необходимости опять его повторяютъ, мѣняя дѣленіе, или переходятъ къ другому лѣкарству.

При улучшеніи повтореніе пріемовъ уменьшать. Иногда, при правильномъ выборѣ лѣкарства, улучшеніе слѣдуетъ послѣ перваго же пріема. Частое повтореніе пріемовъ и перемѣна лѣкарства, въ особенности въ хроническихъ формахъ болѣзни, не рекомендуется. Если не получается улучшенія отъ даннаго лѣкарства, то это означаетъ, что оно невѣрно выбрано.

Если для одной болѣзни показано нѣсколько лѣкарствъ, то нужно начинать съ перваго и переходить къ слѣдующему только послѣ того, какъ вы убѣдитесь, что первое не оказываетъ никакого дѣйствія.

Дозы.

Взрослые получаютъ на пріемъ 2—3 капли, 2 пилюли, 5—6 крупинокъ или 1 костяную ложечку порошка.

Дѣти—1—2 капли, 1 пилюлю, 3—5 крупинокъ, смотря по возрасту, или 1/2 костяной ложечки порошка.

Можно также приготовить лѣкарство въ растворѣ: 10—15—20 капель лѣкарства на 1 стаканъ чистой воды и давать черезъ извѣстные промежутки по чайной ложечкѣ или по глотку. Если лѣкарство въ крупинкахъ, то беруть 20—30 крупинокъ на стаканъ воды.

Стаканъ съ лѣкарствомъ нужно тщательно закрывать стеклянною пластинкою или чистою бумагою и не оставлять никогда ложки въ стаканѣ.

Крупинки и пилюли принимаютъ сухими: положить на языкъ и разсасывать.

Капли: 2—3 капли на чайную ложечку воды или на $^1/_2$ рюмочки.

Порошокъ: 1 костяную ложечку высыпать на языкъ и запить водою.

Англійская болѣзнь.

Сущность и происхожденіе. Эта болѣзнь, иначе называемая *рахитомъ*, наблюдается у дѣтей въ первые годы жизни, но иногда встрѣчается и въ первые мѣсяцы, развиваясь, главнымъ образомъ, послѣ 6-го мѣсяца жизни, по преимуществу въ періодъ прорѣзыванія зубовъ. Болѣзненное разстройство касается костной системы ребенка: въ костяхъ уменьшается количество известковыхъ солей, вслѣдствіе чего онѣ становятся гибкими и мягкими и измѣняются анатомически. Это уклоненіе костной системы объясняется недостаточнымъ содержаніемъ извести въ пищѣ и вообще недостаточнымъ питаніемъ. Вызываютъ у дѣтей развитіе рахита всѣ дурныя санитарныя условія: недостатокъ свѣжаго воздуха, нездоровыя жилища, грязный образъ жизни и нездоровое мѣстоположеніе.

Признаки: Роднички черепа остаются открытыми до 2—3 года жизни, нормально закрываясь къ $1^1/_2$ годамъ. На затылкѣ при ощупываніи можно найти мѣста, которыя вдавливаются. Голова постоянно потѣетъ. Рѣзцы выходятъ поздно, неравномѣрно, черные и легко крошатся. Грудь *заостренная* (такъ называемая куриная грудь); на границѣ между реберными костями и хрящами прощупываются утолщенія, такъ называемыя—*рахитическія четки*. Спинной хребетъ искривленъ. Ноги кривыя и концы костей припухши. Дѣти страдаютъ часто золотушными высыпями, долго не ходятъ, а бѣгать совсѣмъ не могутъ. Если при этомъ еще появляются желудочныя разстройства и отсутствіе аппетита, то состояніе ребенка быстро ухудшается и онъ умираетъ.

Болѣзнь течетъ хронически, проходятъ мѣсяцы и годы, пока она не прекратится.

Лѣченіе: Какъ только замѣчается искривленіе костей, тотчасъ нужно запретить ребенку ходить и бѣгать и дѣлать ему черезъ день теплыя ванны (27° Р) съ прибавленіемъ на 3 ведра воды 1 столовой ложки сосноваго экстракта, въ которой держать ребенка 10 минутъ, а затѣмъ вынуть изъ ванны

завернуть въ теплую простыню и оставлять сидѣть завернутымъ съ 1/2 часа; также очень полезны ванны изъ морской или крейцнахской соли (1—2 фунта на ванну). Необходимо выносить дѣтей нѣсколько разъ въ день на свѣжій воздухъ. Малокровныхъ дѣтей необходимо поить рыбьимъ жиромъ въ теченіе 1 1/2—2 лѣтъ. Хорошая питательная пища, какъ яйца всмятку, бѣлое мясо безъ жира, яблочные мусы, овощи всякіе, овсянка, рисъ, очень полезны. Воспрещается трудноваримая пища, картофель, черный хлѣбъ и т. п. При соленыхъ ваннахъ полезно еще намочить губку въ холодной водѣ и водить ею по спинному хребту сверху внизъ, разъ 10—12: это очень хорошо укрѣпляетъ позвоночникъ. Втиранія въ конечности муравьинаго спирта или водки съ солью—весьма полезное вспомогательное средство.

Давать внутрь 2 раза въ день *Калькареа карбоника* 6 по 5 крупинокъ или по 2 капли,—недѣли 4 подъ рядъ; затѣмъ 4 недѣли не давать ничего, а потомъ *Калькареа фосфорика* 6. Въ промежуткахъ давать по 1—2 пріема въ недѣлю *Сульфуръ* 30. Послѣ 6-ти мѣсячнаго употребленія Калькареа карбоника и Калькареа фосфорика перейти на *Фосфоръ* 6 и *Іодіумъ* 6, которые давать въ такомъ же порядкѣ и столько же времени. Потомъ опять Калькареа и т. д. до полнаго излѣченія болѣзни и укрѣпленія организма ребенка. Противъ поносовъ, обычныхъ у рахитическихъ дѣтей, слѣдуетъ примѣнять *Арсеникъ* 6.

Аппетита недостатокъ.

При недостаткѣ аппетита совѣтуютъ выпивать утромъ и вечеромъ, а также и среди дня, по 1—2 стакана свѣжей холодной воды. При отвращеніи къ мясу принимать передъ обѣдомъ и послѣ обѣда по 2 костяныхъ ложечки *пепсина* или по 1/2 рюмочки *пепсиннаго вина*. При малокровіи же, соединенномъ съ отсутствіемъ аппетита, прекрасно дѣйствуетъ *Гензелевское желѣзо*, 2 раза въ день, передъ ѣдою, по 10 капель въ рюмочкѣ сахарной воды. Передъ ѣдой не слѣдуетъ употреблять спиртныхъ напитковъ и курить табакъ, а дѣ-

лать небольшія прогулки на свѣжемъ воздухѣ. По утрамъ дѣлать обтиранія верхней части тѣла, преимущественно области желудка, живота и спины, холодною водою и тотчасъ же послѣ обтиранія или обливанія досуха вытирать шершавыми полотенцами.

Лѣченіе: 1) При недостаткѣ аппетита вслѣдствіе атоніи желудка при неврастеніи—*Нуксъ вомика* 3; 2) вслѣдствіе засоренія желудка послѣ пріема жирной тяжелой пищи—*Пульсатилла* 3; 3) вслѣдствіе малокровія (у анемичныхъ)—*Арсеникъ* 6; 4) при отсутствіи аппетита, соединенномъ съ чувствомъ голода: *Хина* 3, *Арсеникъ* 3; 5) съ отвращеніемъ къ пищѣ и тошнотою: *Ипекакуана* 3, *Нуксъ вомика* 3; 6) при сопровождающемъ этотъ недугъ отвратительномъ соленомъ вкусѣ: *Спиритусъ нитри дульцисъ* 1, черезъ $^1/_2$ часа по 3 капли; 7) съ кислымъ вкусомъ во рту: *Нуксъ-вомика* 3, *Калькареа карбоника* 6, *Натрумъ муріатикумъ* 6; 8) съ горькимъ вкусомъ во рту (послѣ гнѣва, раздраженія): *Камомилла* 3, *Бріонія* 3; 9) съ приторнымъ вкусомъ: *Хина* 3, *Фосфоръ* 3, *Арсеникъ* 3. Въ каждомъ указанномъ случаѣ давать лѣкарства поперемѣнно по 2 раза въ день по 2 капли или по 5 крупинокъ на пріемъ.

Базедова болѣзнь.

Она характеризуется сердцебіеніями, опуханіемъ щитовидной железы, выпячиваніемъ глазныхъ яблокъ, дрожаніемъ и уменьшеніемъ электрическаго сопротивленія кожи. Развивается въ возрастѣ отъ 15 до 40 лѣтъ; мужчины ей подвергаются рѣже, чѣмъ женщины, чаще всего нервные, малокровные. Наслѣдственность играетъ не малую роль.

Къ числу причинъ, непосредственно вызывающихъ базедову болѣзнь, относятся: поврежденія головы, различныя ослабляющія организмъ вліянія, какъ, напримѣръ, тяжкія болѣзни, потери крови, частые роды, кормленіе грудью, онанизмъ, излишества, сильныя душевныя волненія и пр.

Самымъ раннимъ симптомомъ болѣзни является сердцебіеніе.

Второй симптомъ—зобъ, появляется чрезъ неопредѣленный срокъ послѣ начала сердцебіенія и представляетъ собою опухоль, помѣщающуюся въ нижней части шеи, впереди дыхательнаго горла.

Третій признакъ—пучеглазіе—въ рѣдкихъ случаяхъ составляетъ единственный симптомъ болѣзни. Оно состоитъ въ томъ, что глаза выпячиваются вонъ изъ орбитъ. Выпячиваніе можетъ быть различной степени и доходить до того, что становится виднымъ не только весь бѣлокъ, но даже прикрѣпленіе глазныхъ мышцъ. При этомъ или оба глаза выпячиваются равномѣрно или одинъ, и чаще правый больше, чѣмъ другой.

Четвертый признакъ—дрожаніе—заключается въ томъ, что у больныхъ извѣстныя части тѣла (руки, ноги), или даже все тѣло начинаютъ трястись.

Больные худѣютъ, теряютъ аппетитъ, нерѣдко развивается общая водянка, нервныя боли, опуханія суставовъ и пр.

Теченіе болѣзни хроническое, она можетъ длиться 10 и болѣе лѣтъ.

Морской воздухъ, водолѣченіе, массажъ очень помогаютъ въ этой болѣзни.

Лѣченіе гомеопатическими средствами дастъ весьма хорошіе результаты.

Въ виду припадковъ малокровія прежде всего назначается желѣзо—*Феррумъ сульфурикумъ* 2 и одновременно съ нимъ *Белладонна* 3, поперемѣнно. Специфически дѣйствуютъ препараты *іодистые:* Арсеникумъ іодатумъ 6, калькареа іодата 6, натрумъ іодатумъ 3, іодъ 3.

Въ виду истощенія и отсутствія аппетита, умѣстно примѣненіе *Арсеникъ* 6.

Въ виду разстройства сердечной дѣятельности, требуется примѣненіе *Кактусъ 2.* Также испытанъ съ большимъ успѣхомъ *Аурумъ* 6.

Безпокойство, страхъ.

См. нервное разстройство.

Безсонница.

Спальная должна быть прохладная, просторная и сухая. Полезно держать окно открытымъ ночью, но такъ чтобы не было сквозняка. Лежать на правомъ боку. Полезно принять на ночь теплую ванну, затѣмъ холодный душъ и обтираніе. Полезно выпить на ночь чашку густого теплаго молока или принять нѣсколько капель *Авена сатива* въ теплой водѣ. Кофе, чай, вино и водка воспрещаются.

Лѣченіе: 1) Если причина безсонницы не извѣстна, то давать *Аконитъ* 3, *Коффеа* 2 или *Камомилла* 3—два пріема по 5 капель на ночь.—2) При раздраженіи тѣла и мыслей и общемъ возбужденіи, вслѣдствіе нервнаго разстройства—*Гельземинумъ* 3, отъ 3—5 капель на ночь.—3) При испугѣ—*Опіумъ* 3 или *Игнація* 3, по 3 капли 2 пріема на ночь.—4) Послѣ спиртныхъ напитковъ или долгихъ ночныхъ занятій—*Нуксъ вомика* 3.—5) Переполненіе желудка—*Пульсатилла* 3 и *Коффеа* 2, поперемѣнно черезъ 3 часа по 3 капли, и выпивать на ночь стаканъ холодной сахарной или чистой воды.—6) Малокровіе, сопряженное съ безпокойствомъ и боязнью—*Арсеникъ* 3, по 3 капли 3 раза въ день.—7) Переутомленіе—*Гельземинъ* 1—1 пріемъ на ночь.

У маленькихъ дѣтей. Намочить платокъ или салфетку въ холодной водѣ, выжать хорошенько, обложить этимъ грудь и животъ и завернуть ребенка въ теплое одѣяло: малютка тотчасъ засыпаетъ. Дѣтей нельзя класть головой на высокія подушки, а равно не слѣдуетъ давать имъ чаю и кофе, въ особенности на ночь.

Лѣченіе: 1) *Коффеа* 3, на ночь 1-2 капли.—2) Если лицо красное—*Опіумъ* 3.—3) Вздутіе и боли живота—*Камомилла* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 6, по 2 капли черезъ 1 часъ.—4) Послѣ отнятія отъ груди—*Белладонна* 3, на ночь 2 пріема по 2 капли.—5) Крапивная сыпь—*Сульфуръ* 6 и *Аписъ* 3, по 2 капли по 3 раза въ день каждаго.—6) Глисты—*Цина* 1 и *Игнація* 3, по 2 раза въ день по 2 капли, и клистиръ изъ 1 ложки уксуса на стаканъ тепловатой воды.

Беременность.

При беременности полезно быть въ движеніи, на свѣжемъ воздухѣ и избѣгать душныхъ помѣщеній, въ особенности, гдѣ скопляется много народа.

Запрещается беременнымъ: носить или поднимать тяжести, танцовать, быстрыя движенія, ѣзда по неровной трясской дорогѣ и всякія занятія, сопровождаемыя давленіемъ на нижнюю часть живота. Одежда должна быть теплая и удобная. Носить корсетъ не слѣдуетъ. Остерегаться раздраженія, гнѣва, ссоры, испуга, внезапной радости и т. п. волненій. Ванны и купанія очень полезны. Груди и соски держать въ чистотѣ, т.-е., какъ можно чаще обмывать водою съ мыломъ. Тяжелой и прѣсной пищи нужно избѣгать, а также пива, крѣпкаго вина, водки и очень крѣпкаго кофе и чая. Всякое мясо, въ особенности бѣлое, а также фрукты и овощи особенно полезны.

1. Для облегченія предстоящихъ родовъ беременнымъ женщинамъ должно давать *Цимицифуга* 3, на 7 мѣсяцѣ одну недѣлю по 3 капли или 5 крупинокъ на ночь и на 9 мѣсяцѣ такъ же.

2. При тошнотѣ, рвотѣ: *Нуксъ вом.* 3, *Ипекакуана* 3 или *Пульсатилла* 3, по 1 пріему утромъ и вечеромъ (3 капли).

3. Запоры и слюнотеченіе: *Натрумъ муріатикумъ* 6, одинъ пріемъ въ 2 капли на ½ рюмки воды.

4. Кислая отрыжка: *Магнезія карбоника* 6, 3 раза въ день по 3 капли.

5. Спазмы желудочные: *Белладонна* 3 и *Сепія* 6, поперемѣнно черезъ 1—2 часа по 3 капли.

6. Жженіе въ желудкѣ и тошнота: *Арсеникъ* 3, по 3 капли каждые 2 часа.

7. Засореніе желудка отъ жирныхъ пироговъ и пирожныхъ: *Пульсатилла* 3 и *Ипекакуана* 3, черезъ 2—3 часа по 3 капли.

8. Запоръ: Полезны клистиры изъ чистой тепловатой воды; фрукты, въ особенности яблоки и черносливъ; умѣренное движеніе. Изъ слабительныхъ средствъ—*Нуксъ вомика* 6

и *Ликоподіумъ* 6—одно утромъ, другое вечеромъ по 5 капель. Если названныя средства мало дѣйствуютъ, то принять 1 пріемъ въ 10 крупинокъ *Purgatif végétal* на ночь, а затѣмъ для урегулированія желудка принимать одну недѣлю *Нуксъ вомика* 6, какъ сказано.

9. Поносъ: желудокъ обвязать шерстянымъ или фланелевымъ бинтомъ и давать *Нуксъ вомика* 1, по 5 капель черезъ 1—2 часа, или *Реумъ* 1; если не помогаетъ, то *Арсеникъ* 6 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, поперемѣнно черезъ 1—2 часа по 5 капель въ отварной водѣ. При коликахъ въ желудкѣ—*Колоцинтисъ* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 6, поперемѣнно черезъ ½—1 часъ по 5 капель.

10. Неправильныя отправленія мочи: теплую повязку на нижнюю часть живота и теплую ванну. Избѣгать острой и раздражающей пищи и питья. Давать внутрь: при задержаніи мочи—*Пульсатилла* 3 и *Сульфуръ* 3, каждые 2 часа по 5 капель поперемѣнно; при непроизвольномъ мочеиспусканіи—*Ацидумъ-фосфорикумъ* 3, по 5 капель и *Карбо вегетабилисъ*×2, по костяной ложечкѣ черезъ 2 часа поперемѣнно.

11. Опуханіе ногъ: ноги необходимо держать теплыми и озаботиться о правильномъ опорожненіи желудка. На животѣ носить повязку. Внутрь давать *Цепа* 2, по 10 капель 3 раза въ день.

12. Опухоли отъ расширенія венъ — большею частію бываютъ на берцовой части ноги (икры), на подъемѣ и рѣдко на промежности.

Носить фланелевую повязку на животѣ, не спать по возможности на спинѣ, не носить узкой одежды и подвязокъ и держать ноги въ горизонтальномъ положеніи. Если одинъ изъ венозныхъ узелковъ лопнетъ, то наложить смоченную въ арниковой водѣ (столовую ложку арники на стаканъ холодной воды) тряпочку и туго забинтовать полотнянымъ бинтомъ. Если образуются нарывы, то дѣлать согрѣвающіе компрессы, которые мѣнять 4—5 разъ въ день. При образованіи грануляцій съ твердыми краями, дѣлать теплыя ванны или примочки изъ 1 ч. *Гландесъ Кверкусъ* на 3 части воды и смазывать мазью, приготовленной изъ 1 ч. масла какао и 2 ч. миндальнаго

масла. По заживленіи слѣдуетъ носить резиновый бинтъ. Внутрь давать: *Арника* 2 и *Гамамелисъ* 3, по 2 раза въ день по 3 капли.—Если узелки твердые, напряженные и чешутся, то давать *Калькареа карбоника* 6 и *Цинкумъ* 6. Если они воспалены, боль жгучая и ухудшается къ ночи, то давать внутрь *Арсеникъ* 3, три раза въ день по 3 капли, и снаружи примачивать однопроцентнымъ растворомъ карболовой кислоты. При нагноснiи—*Гепаръ сульфурисъ* 3; при образованiи дикаго мяса—*Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ; если вскрывшіеся нарывы зловонны—давать *Ацидумъ нитрикумъ* 3 и *Арсеникъ* 3, по 3 капли каждые 2 часа. Когда венозные узлы появляются на половыхъ частяхъ и образуются также геморроидальныя опухоли, то лучше всего давать *Коллинзонія* 2, каждые 2 часа по 3 капли.

13. Зубная боль: *Сепія* 6, *Нуксъ-вомика* 3 или *капли синей ромашки*, черезъ 1/4 часа по 5 капель въ 1/2 рюмкѣ воды.

14. Судорожное состоянiе (судороги). Когда лицо красное—*Белладонна* 3, черезъ 1/4 часа по 3 капли попеременно съ *Игнація* 3. Блѣдное лицо, усталость и желаніе уснуть — *Арсеникъ* 3 и *Ацидумъ бензоикумъ* 2, черезъ 15—20 минутъ попеременно по 3 капли. Если судороги являются слѣдствіемъ испуга или внезапной радости—*Опіумъ* 6, по 3 капли черезъ 1/2 часа.

15. Кровотеченія изъ матки: Лечь на спину, дать больной полный покой и не давать раздражающей пищи. Холодныя примочки или ледъ на нижнюю часть живота. Внутрь *Белладонна* 3 и *Сабина* 3, попеременно черезъ 1/2—1 часъ. Если является слабость, то давать еще и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3. Если кровотеченіе отъ усиленной работы, напряженія, поднятія тяжелыхъ предметовъ, то *Арника* 3 и *Гамамелисъ* 2, попеременно черезъ 1—2 часа.

16. Ложныя родовыя боли: *Каулофиллумъ* 3 и *Камомилла* 3, черезъ 1/2 1 часъ по 3 капли.

17. Астма (припадки одышки и удушья): *Арсеникумъ* 3 и *Лобелія* 1, черезъ 1 часъ по 5 капель попеременно.

Блѣдная немочь,

дѣвичья немочь, хлорозъ.

Болѣзнь эта поражаетъ дѣвушекъ въ періодъ полового развитія, т.-е., лѣтъ въ 15—18, и является одною изъ самыхъ частыхъ и распространенныхъ формъ малокровія (анеміи).

Причины: Сидячая жизнь, недостаточная и несоотвѣтствующая пища, чрезмѣрное употребленіе чая и кофе, дурной воздухъ въ квартирѣ и спальнѣ и вообще пребываніе въ тѣсныхъ и дурно провѣтриваемыхъ помѣщеніямъ; печаль, горе, заботы, тоска, разстройства половыхъ отправленій (разстройства въ мѣсячныхъ очищеніяхъ); длительныя, ослабляющія болѣзни, кровотеченія, гноетеченіе.

Признаки: Блѣдное лицо; блѣдный цвѣтъ слизистыхъ оболочекъ, наблюдаемый преимущественно на внутренней сторонѣ вѣкъ, а также и на деснахъ; скорое утомленіе, сердцебіеніе, разстройства пищеваренія, кислоты, схватки въ желудкѣ, запоры, мрачное, угрюмое, сварливое, капризное или печальное настроеніе духа; полное отсутствіе мѣсячныхъ очищеній или регулы очень скудны и водянисты или же замѣнены бѣлями, иногда же чрезмѣрно обильны, такъ что крови выдѣляются 8—14 дней и затѣмъ слишкомъ часто повторяются.

Лѣченіе: Легкая работа; ежедневныя, не доводящія до усталости прогулки на свѣжемъ воздухѣ съ глубокими вдыханіями его; чистый, свѣжій воздухъ въ жиломъ помѣщеніи и спальнѣ; достаточный сонъ; избѣгать всякихъ возбужденій; ежедневныя обмыванія тѣла (холодныя обтиранія); купанія преимущественно въ рѣкѣ по нѣсколько разъ въ недѣлю, продолжающіяся, однако, не болѣе трехъ минутъ; пища должна быть удобоваримая, но питательная, какъ-то: бульонъ, хорошее нѣжное мясо, яйца всмятку, молоко; ежедневное питье небольшого количества яблочной сыворотки. Прекрасное дѣйствіе оказываютъ также *Гензелевскія желѣзныя капли*, 30—40 капель котораго растворяютъ въ стаканѣ подслащенной сахаромъ воды и пьютъ ежедневно за ѣдой между кушаньями по нѣсколько глотковъ.

Кромѣ того: 1) *Феррумъ гэматиникумъ*×1 или *Феррумъ карбоникумъ*×1 или *нитрикумъ* 2 растираніе, принимать по три раза въ день (въ теченіе продолжительнаго времени) по костяной ложечкѣ, послѣ чего дѣлать паузы въ 8—14 дней (т.-е. не принимаютъ лѣкарства). Если оно не поможетъ, то *Купрумъ ацетикумъ* 3, черезъ каждые два дня по 3 ложечки костяныхъ; при сильномъ исхуданіи и отсутствіи аппетита, атоніи желудка и кишекъ, *Арсеникъ* 6.—2) При разстройствѣ мѣсячныхъ очищеній и плаксивости: *Пульсатилла* 3.—3) При отсутствіи регулъ, при бѣляхъ или же при слишкомъ обильномъ выдѣленіи мѣсячныхъ: *Калькареа фосфорика* 6 или *Калькареа карбоника* 6.—4) При чувствѣ разбитости, усталости, вялости, сонливости, скоропроходящихъ приступахъ жара въ головѣ, ревматическихъ боляхъ: *Арника* 3 и *Белладонна* 3.—5) Если болѣзнь возникла всѣдствіе потери крови и вообще жизненныхъ соковъ: *Хина* 3 поперемѣнно съ *Калькареа фосфорика* 6.—5) При упорныхъ запорахъ и исхуданіи: *Плюмбумъ* 6.—7) При сильномъ возбужденіи половыхъ органовъ: *Платина* 6.—8) При желудочныхъ судорогахъ, боляхъ въ спинѣ и безсонницѣ: *Игнація* 3, три раза въ день по 3 капли.—9) Если болѣзнь эта развилась вслѣдствіе злоупотребленія слишкомъ большими или слишкомъ частыми пріемами желѣза, *Арсеникъ* 6.—10) При головной боли, появляющейся рано утромъ, судорожномъ кашлѣ, сильной жаждѣ, тошнотѣ, но хорошемъ самочувствіи по вечерамъ: *Натрумъ муріатикумъ* 6.—11) При желтомъ цвѣтѣ лица, бѣляхъ, смѣщеніяхъ матки, зябкости, ознобѣ, ухудшеніи во время покоя:—*Сепія* 6.

Бородавки.

Затвердѣвшую бородавку нужно по возможности совсѣмъ соскоблить очень мелкимъ плоскимъ напильникомъ (но не до крови) и смазывать *Туей* или *Туйолиномъ*. Внутрь: *Туя* 3 и *Ацидумъ пикриникумъ*×3, по 2 раза въ день по 5 капель. Также совѣтуютъ и *Каустикумъ* 5 или *Калькареа карбо-*

ника 6, принимать продолжительное время по пріему (5 капель или 5 крупинокъ) въ день.

Брайтова болѣзнь. Альбуминурія.

Острое воспаленіе почекъ.

Признаки: Опуханіе лица и малое отдѣленіе мутной грязновато-красной мочи; при кипяченіи мочи она даетъ муть и затѣмъ клочковидный осадокъ, не исчезающій отъ прибавленія нѣсколькихъ капель уксусной кислоты,—что указываетъ на содержаніе бѣлка; лихорадка, иногда сопровождаемая рвотою; чувство давленія въ поясницѣ и позывы къ мочеиспусканію. Затѣмъ уже развивается подкожная водянка и водянка живота.

Эта болѣзнь встрѣчается у дѣтей, въ особенности послѣ скарлатины и дифтерита, а у взрослыхъ послѣ тифа, холеры, при легочной чахоткѣ, оспѣ и воспаленіи суставовъ, отравленіи ядами, какъ фосфоръ, мышьякъ, сѣрная кислота, свинецъ и др., у женщинъ въ періодѣ беременности.

Лѣченіе: Горячія ванны 27—30° Реом., потѣніе и молочное питаніе. Затѣмъ: 1) *Аконитъ* 3 и *Аписъ* 3 попеременно черезъ 2 часа по 2—3 капли, а затѣмъ *Аписъ* 3 и *Апоцинумъ* ×2, давать такъ же.—2) Если водяночныя опухоли быстро распространяются—*Аписъ* 3 и *Арсеникъ* 6, попеременно. 3) Когда болѣзнь затягивается надолго—*Гепаръ сульфурисъ* 3, 3 раза въ день по костяной ложечкѣ, и *Сквилла* 3, 3 раза по 3 капли.—4) Когда бѣлокъ послѣ 4-хъ-недѣльнаго употребленія лѣкарствъ не исчезаетъ—*Ацидумъ нитрикумъ* 3, четыре пріема въ день по 3 капли. 5) При легочной чахоткѣ—*Бріонія* 3 и *Фосфоръ* 6, по 3 раза въ день по 5 капель или по 5 крупинокъ. Водянку, появляющуюся послѣ скарлатины, можно предотвратить, если при уменьшеніи мочеотдѣленія тотчасъ начать давать *Гепаръ сульфурисъ* 3. Больной долженъ лежать въ постели и остерегаться простуды. Пища должна быть свѣжая, легкая. Запрещаются всякія соленія, копченія и др. раздражающія и пикантныя вещи, а

равно воспрещается пить очень холодную воду. Послѣ болѣзни давать, какъ средства возстанавливающія: *Гензелевскія капли*, по 20 капель на стаканъ воды—выпивать въ теченіе дня, и *Хина*×3, три раза въ день по 3 капли.

Бронхитъ.

Острый и хроническій.

Бронхитъ состоитъ въ томъ, что слизистая оболочка дыхательнаго горла и бронховъ (дыхательныхъ трубокъ) подвергается процессу воспаленія.

Причины: Простуда, вдыханіе пыли или вредныхъ испареній и раздражающаго воздуха, т.-е., сырого и холоднаго или слишкомъ жаркаго и т. п.; кромѣ того, болѣзнь эта наблюдается при инфлуенцѣ, кори, тифѣ и оспѣ.

Признаки: Сухой кашель или съ отдѣленіемъ незначительнаго количества вязкой, клейкой, трудноотхаркиваемой мокроты; чувство садненія въ бронхахъ, при чемъ при выслушиваніи груди слышны свисты и хрипы; незначительная лихорадка; черезъ нѣсколько дней появляется рыхлый кашель, отхаркивается слизь, а отдѣляемая моча оставляетъ осадокъ на днѣ сосуда. У дѣтей бронхитъ выражается прерывистымъ сномъ и большимъ безпокойствомъ, за которыми слѣдуетъ короткое, быстрое, неравномѣрное дыханіе (ребенокъ торопится дышать), кожа становится горячею и сухою, частое покашливаніе, потребность часто пить, хрипы въ груди, блѣдность лица, малый пульсъ, судороги.

Лѣченіе: Лихорадящаго больного необходимо уложить въ постель; пища должна быть легкая, удобоваримая. Въ длительныхъ случаяхъ пить теплый *яблочный отваръ* или *Эмсъ-Кренхенъ* пополамъ съ горячимъ молокомъ. Равнымъ образомъ доставляетъ облегченіе вдыханіе черезъ воронку паровъ раствора двухъ ложекъ *тинктуры сосновыхъ отростковъ* или *скипидара въ стаканѣ горячей воды.* При боляхъ въ груди кладутъ на эту область согрѣвающій компрессъ.

1) При тянущихъ, дергающихъ болякъ въ груди, лихорадкѣ, кашлѣ, сопровождаемомъ колотьемъ, и запорѣ—*Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Бріоніей* 3, черезъ 1½—2 часа по 5 капель; при крупозномъ бронхитѣ—*Спонгія* 3 или *Кали іодатумъ*×2, черезъ каждые ½ часа.—2) При разстройствѣ пищеваренія, отсутствіи аппетита, большомъ упадкѣ силъ, ночныхъ потахъ, сухомъ кашлѣ—*Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, черезъ два часа по 3 капли. 3) При колотіи въ груди, мучительномъ кашлѣ (мокрота совсѣмъ не откашливается) и влажныхъ хрипахъ — *Тартарусъ эметикусъ* 3 и *Аралія рацемоза* 3.—4) Въ старческомъ возрастѣ, когда нужно опасаться воспаленія легкихъ, при чемъ замѣчается упадокъ силъ,—*Фосфоръ* 6; а если эти явленія усиливаются ночью, то *Коніумъ* 6 и *Фосфоръ* 6 поперемѣнно черезъ 1—2 часа по 3 капли.—5) Послѣ исчезновенія воспалительныхъ явленій и когда замѣчается большое скопленіе мокроты—*Гепаръ* 3, *Сульфуръ аурати* 3 или *Карбо вегетабилисъ* 3, черезъ 2 часа по ложечкѣ.—6) При сильно раздражающемъ кашлѣ—*Гіосціамусъ* 1 или *Ипекакуана* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—7) Въ хроническихъ случаяхъ—*Фосфоръ* 6, *Гепаръ* 6, *Сульфуръ ауратъ* 6, по 3 раза въ день по 5 капель.

Бронхитъ у маленькихъ дѣтей. Если ребенокъ слабый, малокровный, то давать три раза въ день по ложечкѣ токайскаго вина. Затѣмъ: 1) *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Бріоніей* 3 или съ *Меркур. солюбилисъ* 3, черезъ 2 часа по 2 капли или ложечку порошка.—2) При скопленіи значительнаго количества мокроты и позывахъ на рвоту—*Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Тартарусъ эметикусъ* 3, черезъ 1—2 часа.—3) При сухомъ ночномъ кашлѣ—*Гіосціамусъ* 3 по 2 капли черезъ ¼—½ часа 2—3 раза.—4) При осложненіи бронхита воспаленіемъ кишекъ—*Меркур. солюбилисъ* 6 и *Камомилла* 6, черезъ 2 часа по 2—3 капли.—5) Въ опасныхъ случаяхъ—*Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Фосфоромъ* 6.—6) Если скопленіе мокроты столь велико, что можно опасаться задушенія ребенка, то давать ему на кончикѣ ножика *Тартарусъ эметикусъ* 1, черезъ каждыя 10 минутъ, пока не вырветъ, а затѣмъ давать *Ацидумъ фосфорикумъ* 3

и *Ипекакуана* 3, черезъ 2 часа по 3 капли. Рвотное давать только по указанію врача.

Брюшины воспаленіе.

Эту весьма опасную болѣзнь, которая часто бываетъ соединена съ воспаленіемъ кишекъ, называютъ иногда воспаленіемъ нижней части живота, и для лѣченія необходимо пригласить врача.

Она наблюдается при различныхъ язвенныхъ процессахъ въ кишечномъ каналѣ, при воспаленіи слѣпой кишки, при заболѣваніяхъ матки, при воспаленіи почекъ и мочеточниковъ, при внѣматочной беременности, при печеночныхъ нарывахъ и т. д.

Причины: Простуда, сильные ушибы, поврежденія или пораненія живота, болѣзни кишечника, у женщинъ—половыхъ органовъ, а также вслѣдствіе родовъ.

Признаки: При остромъ (быстромъ) теченіи болѣзни больной ощущаетъ на опредѣленномъ мѣстѣ живота сильныя, колющія боли и не переноситъ ни малѣйшаго прикосновенія къ животу; ознобъ, сильная лихорадка, кожа горяча и суха, мучительная жажда, сильная рвота желчью, вздутіе живота вслѣдствіе скопленія газовъ, упорный запоръ; если же воспаленіе брюшины соединено съ воспаленіемъ кишекъ, то при этомъ бываетъ поносъ. Больные лежатъ неподвижно, такъ какъ малѣйшее движеніе вызываетъ страшнѣйшія боли. Вскорѣ появляется затрудненное дыханіе и значительный упадокъ сердечной дѣятельности.

Тяжелые случаи заканчиваются смертью въ нѣсколько дней.

Діэта: Необходимо дать полный покой кишечнику. Поэтому больному давать лишь слизистое питье въ чрезвычайно маломъ количествѣ заразъ; свѣжая вода, вода со взбитымъ яичнымъ бѣлкомъ, все холодное, по глотку заразъ.

Лѣченіе: Сначала даютъ *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3 и, какъ питье, *Бріонія* 3, по 30 кап. на стаканъ, глотками. Если отъ этого выпотъ (эксудатъ) не всосется обратно, то—

Меркур. коррозивусъ 3. Кромѣ того могутъ быть полезны, какъ промежуточныя средства: *Арсеникъ* 3, при блѣдномъ, осунувшемся лицѣ, сильныхъ жгучихъ боляхъ и рвотѣ, и *Опіумъ* 1, черезъ каждые 1/2 часа, если, несмотря на пріемы упомянутыхъ раньше средствъ, боли все-таки не уменьшаются. По достиженіи улучшенія начать снова принимать указанныя выше средства, которыя чередовать черезъ 2 часа по 5 капель или по 5 крупинокъ.

Запоръ не слѣдуетъ устранять посредствомъ слабительныхъ, либо клистировъ; рвотныя чрезвычайно вредны. Равно нельзя давать шипучихъ напитковъ (газовыхъ водъ). Благотворно дѣйствуютъ теплыя припарки, если онѣ переносятся, а еще лучше тотчасъ же наложить согрѣвающій компрессъ и мѣнять его 2 раза въ сутки.

Брюшной тифъ.

Брюшной тифъ въ высшей степени серьезная и довольно распространенная *заразная* болѣзнь.

Причины: Зараженіе тифозными бациллами при употребленіи загрязненной ими воды, молока. Уходъ за тифозными больными, испражненія которыхъ особенно опасны, предрасполагаетъ къ зараженію брюшнымъ тифомъ, а также ослабляющія вліянія: простуда, погрѣшности въ діэтѣ, душевныя волненія, нездоровая и неудобоваримая пища, дурное жилое помѣщеніе и въ особенности темныя, малыя и худо провѣтриваемыя спальни.

Признаки: Общее недомоганіе, чувство усталости и разбитости, отсутствіе аппетита, головная боль и боль въ членахъ, безпокойный сонъ. Послѣ періода недомоганія, такъ называемаго инкубаціоннаго, болѣзнь начинается потрясающимъ ознобомъ; кожа становится сухой, горячей; температура повышается постепенно до 40° и болѣе; появляется головокруженіе, безсознательное состояніе, апатія, бредъ; больной перебираетъ пальцами, какъ бы собираетъ хлопья; языкъ обложенъ, сухой, потрескавшійся; темныя, грязныя корки на губахъ и на языкѣ; правая сторона живота вздута

и при этомъ часто бываетъ поносъ; испражненіи жидкія или густыя, зеленоватыя, вонючія и при отстаиваніи раздѣляются на два слоя; моча отдѣляется въ маломъ количествѣ и мутная; появляются пятна на кожѣ живота, похожія на укусы блохъ. Крайне опасны осложненія, очень часто наблюдающіяся при тифѣ,—кишечныя кровотеченія, вызывающія малокровіе и упадокъ дѣятельности сердца, прободеніе кишечной язвы, вызывающее обычно смертельный исходъ, бронхитъ и воспаленіе легкихъ. Дурными признаками считаются: сползаніе больного съ подушекъ и непроизвольныя или кровянистыя испражненія, подергиванія мышцъ; хорошими признаками являются: поты, влажный языкъ, спокойный сравнительно сонъ. Болѣзнь продолжается 3—4 недѣли и болѣе.

Больной долженъ лежать въ постели. Полное спокойствіе. Лѣтомъ или весною, въ хорошую теплую погоду, слѣдуетъ открывать окна днемъ и ночью или держать ихъ открытыми; зимою же провѣтривать нѣсколько разъ въ день. Вообще воздухъ въ комнатѣ долженъ быть чистый и прохладный (не болѣе 15° Р.). Избѣгать слишкомъ яркаго свѣта и освѣщенія. Больного должно прикрывать легкимъ одѣяломъ. Постель должна быть тщательно разглажена. Мѣнять черезъ каждый часъ положеніе тѣла, особенно при потерѣ сознанія. Соблюдать возможно большую чистоту. Дезинфецировать ночные горшки и подкладныя судна желѣзнымъ купоросомъ или марганцово-кислымъ кали и ставить на окнахъ и въ углахъ комнаты тарелки съ растворомъ марганцово-кислаго кали.

Діэта: Для питья больной получаетъ хорошую, свѣжепрокипяченую воду, къ которой на 1 стаканъ прибавляется 1 чайная ложечка коньяку, либо 2—3 ложки хорошаго бѣлаго или краснаго вина. До тѣхъ поръ, пока существуетъ лихорадка, дозволяется лишь жидкая пища: молоко, отвары ячменной или иной крупы, куриный супъ, нежирный бульонъ, яйца всмятку, яблочный мусъ. По прекращеніи лихорадки начинать съ нѣсколькихъ ложекъ какой-нибудь жидкой кашки, затѣмъ перейти къ употребленію голубинаго мяса, совершенно развареннаго, и далѣе къ скобленой говядинѣ, къ

мелко порѣзанному вареному цыпленку и т. д. Вообще пища должна быть питательная и удобоваримая. Нужно ѣсть часто, но мало. Діэта должна соблюдаться въ теченіе долгаго времени по выздоровленіи. Во избѣжаніе образованія пролежней цѣлесообразно утромъ и вечеромъ обтирать все тѣло водою комнатной температуры, разбавленной уксусомъ или же некрѣпкимъ спиртомъ.

Лѣченіе: 1) Для предохраненія отъ заразы, въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится прикасаться къ больному, страдающему тифомъ, или посѣщать его—*Белладонна* 3 или *Кокколюсъ* 3, 3 раза въ день по 5 капель.—2) При появленіи лихорадочнаго приступа—*Аконитъ* 3, въ частыхъ пріемахъ, черезъ 1/2 часа по 5 капель. При приливѣ къ головѣ и головной боли—*Аконитъ* 3 попеременно съ *Белладонною* 3 или *Бріоніей* 3, черезъ 1-2 часа по 5 капель.—3) При сползаніи съ подушекъ, притягиваніи колѣнъ къ животу или сползаніи ногъ съ постели, въ связи съ слабымъ дыханіемъ, осложненнымъ хрипами—*Ацидумъ муріатикумъ* 3.—4) При большой слабости, помраченіи сознанія, страхѣ, вонючихъ испражненіяхъ, черныхъ губахъ—*Арсеникъ* 6, по 5 капель или 5 крупинокъ на пріемъ.—5) При сильно вздутомъ животѣ, безболѣзненномъ поносѣ, спячкѣ, перебираніи пальцами по одѣялу, какъ будто выдираніи изъ одѣяла шерсти или собираніи хлопьевъ—*Русъ* 3 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, черезъ 1-2 часа по 3 капли.—6) При кровотеченіяхъ: *Ипекакуана* 1 и *Гамамелисъ* 1, попеременно черезъ 1/2 часа по 5 капель.—7) Въ настоящее время наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ считается *Баптизія* 1, которая дается во всѣхъ видахъ тифа, какъ питье, 30 капель на стаканъ отварной воды, и выпивать глотками въ теченіе дня. Тифъ необходимо лѣчить непремѣнно подъ руководствомъ врача.

Бѣли.

Характернымъ признакомъ катарральнаго воспаленія слизистой оболочки шейки матки или полости тѣла матки

являются бѣли или истеченія изъ маточнаго рукава или изъ самой матки слизистой или водянисто-слизистой, клейкой, нерѣдко молочнаго цвѣта жидкости, которая сначала не имѣетъ запаха, не жжетъ, не ѣстъ, но мало-по-малу становится острою, разъѣдающею и принимаетъ отвратительный запахъ; иногда бѣли бываютъ желтоватаго или зеленоватаго цвѣта. Бѣли бываютъ обыкновенныя катаррaльныя и заразныя, вслѣдствіе зараженія трипернымъ ядомъ. Для опредѣленія качества бѣлей требуется врачебный осмотръ.

Причины: Маточныя кольца, раздражающія впрыскиванія, глисты (нерѣдко вызывающіе эту болѣзнь въ дѣтскомъ возрастѣ), щекотаніе и потираніе половыхъ органовъ, половыя возбужденія и излишества, онанизмъ, всякаго рода опухоли и затвердѣнія во влагалищѣ и въ маткѣ, малокровіе, простуда и, наконецъ, зараженіе.

Предохранительныя мѣры: Чтобы предупредить заболѣваніе, нужно прежде всего избѣгать условій, могущихъ вызвать его. Для молодыхъ дѣвушекъ весьма важное значеніе имѣетъ разумное нравственное и физическое воспитаніе, а равно при наступленіи періода появленія регулъ необходимо растолковать имъ ихъ важное значеніе, указать на причины и вредныя послѣдствія ихъ разстройства и задержанія и дать нужныя въ этомъ смыслѣ наставленія объ образѣ жизни, одеждѣ и т. п.

Лѣченіе: Посредствомъ спринцовки или кружки Эсмарха съ маточнымъ наконечникомъ нужно ежедневно дѣлать влагалищныя спринцованія и обмыванія половыхъ органовъ растворомъ *Календулы*, 1 чайной ложки тинктуры на кружку воды. Избѣгать волненій и раздраженій и не пить чернаго кофе, крѣпкаго чая, пива и крѣпкаго вина. Пища должна быть легкая, нераздражающая, т.-е, безъ примѣси перца, горчицы и другихъ пряностей. Движеніе (прогулки) на свѣжемъ воздухѣ, купанье или холодныя обмыванія и обтиранія очень полезны. Малокровнымъ давать раза 2 въ день *Гензелевскія капли*, по 10 капель на пріемъ въ сахарной водѣ. 1) При остромъ катаррѣ—*Белладонна* 3, *Пульсатилла* 3, при хроническомъ,—*Сепія* 3 и *Сульфуръ*×3, черезъ день попере-

мѣнно, утромъ и вечеромъ 5 капель. 2) При сильно пахнущихъ бѣляхъ *Арсеникъ* 6 и *Креозотъ* 3, черезъ день поперемѣнно, 3 раза въ день по 5 капель. 3) Когда бѣли жгучія, образуются язвочки и при этомъ припухаютъ даже наружныя части половыхъ органовъ, то давать *Сульфуръ* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ день поперемѣнно, 3 раза въ день по 3 капли и по костяной ложечкѣ. 4) Разъѣдающія, продолжительныя бѣли между регулами съ болью въ спинѣ—*Бораксъ* 3; если послѣ регулъ—*Бовиста* 3.—5) Если истеченія желтыя, слизистыя—*Кали карбоникумъ* 3, *Ликоподіумъ* 6 и *Сепія* 6.—6) У слабыхъ субъектовъ при отсутствіи регулъ—*Хина* 3 (водянистыя бѣли), *Феррумъ карбоникумъ* 2 (молочныя на видъ), *Арсеникъ* 3 (худосочіе).—7) Обильныя, ослабляющія бѣли, жгучія, вызывающія зудъ, при разстройствѣ мѣсячныхъ, слабости пищеваренія, блѣдной немочи—*Натрумъ муріатикумъ* 6.—8) При бѣловатыхъ, безболѣзненныхъ бѣляхъ отъ простуды, разстройствѣ регулъ, блѣдной немочи, чувствѣ усталости—*Пульсатилла* 3.—9) Если вышепоименованныя средства не помогаютъ, то давать *Сульфуръ* 3, черезъ день поперемѣнно съ *Креозотомъ* 3 или *Ацидумъ нитрикумъ* 3. Съ успѣхомъ примѣняются также *Потентилла-анз.* ×1 и *Сенеціо* 1 поперемѣнно, по 2 раза въ день по 5 капель. 10) При заразныхъ бѣляхъ (отъ зараженія триппернымъ ядомъ) *Туя* 3 и *Кантарисъ* 3, поперемѣнно, каждые 2 часа по 2 капли.

Водобоязнь или собачье бѣшенство.

Причины: Укушеніе бѣшеною собакою.

Признаки: Болѣзнь эта въ большинствѣ случаевъ появляется не тотчасъ послѣ укушенія, а черезъ нѣкоторое время. Зажившая рана становится снова болѣзненною, принимаетъ дурной видъ (темнѣетъ или краснѣетъ) или вновь вскрывается. При этомъ появляются: страхъ, безпокойство, свѣтобоязнь, вздрагиваніе, пугливость, одышка; при каждой попыткѣ сдѣлать глотокъ воды происходятъ судороги въ горлѣ, и больному кажется, что это его задушитъ; припадки

бѣшенства, соединенные съ помѣшательствомъ, при видѣ воды; общія судороги съ наклонностью кусаться, выдѣленіе пѣны изо рта.

Лѣченіе: Рана должна быть немедленно промыта весьма тщательно *нашатырнымъ спиртомъ*, или *соленою водою*, или *мыльною водою*, или же *уксусомъ* и тотчасъ же выжжена или каленымъ желѣзомъ или другимъ какимъ-либо ѣдкимъ веществомъ. Затѣмъ необходимы ежедневныя паровыя ванны (париться въ банѣ), которыя никоимъ образомъ не должно прекращать въ теченіе нѣсколькихъ недѣль.

Внутрь: 1) *Белладонна* 3, при краснотѣ лица, судорогахъ въ горлѣ при глотаніи, приступахъ бѣшенства, или же *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Купрумъ ацетикумъ* 3, *Гіосціамусъ* 3 или съ *Дяжезисъ* 6. Въ случаѣ безуспѣшности Белладонны,—*Страмоніумъ* 3. 2) *Кантарисъ* 3 при чрезвычайно затрудненномъ глотаніи, большой сухости во рту и общемъ возбужденіи. 3) Рекомендуютъ также принимать по 10—20 капель *Эуфорбіумъ* (Euphorbium sylvestre)×3, раза 4 въ день.

Водянка.

Причины: Скопленіе жидкости въ полостяхъ тѣла (живота, груди) или подкожной клѣтчаткѣ происходитъ отъ болѣзни сердца, почекъ, печени и легкихъ, а также отъ продолжительныхъ болѣзней, часто повторяющихся кровотеченій, потери жизненныхъ соковъ и т. п.

Признаки: Водянка можетъ быть мѣстная или распространяется по всему тѣлу. При мѣстной водянкѣ части эти отекаютъ, ощущаются холодными и не потѣютъ. При надавливаніи пальцемъ остается вдавленная ямка. Моча скудная, темная; запоръ, отсутствіе аппетита, одышка.

Лѣченіе: Теплыя ванны, а затѣмъ обертыванія въ теплое шерстяное одѣяло. Пища легкая и удобоваримая. 1) Противъ водянки, какъ слѣдствія сердечныхъ болѣзней: *Дигиталисъ* 1, *Строфантусъ* 2, *Кактусъ* 3, *Адонисъ* 2; 2) у

легочныхъ больныхъ: *Фосфоръ* 6, *Арсеникъ* 6, *Кали карбон.* 6; 3) у больныхъ почками: *Апизинумъ* 3, Blatta oriental. 2, *Ацид. ацетик.* 3; 4) у больныхъ печенью: *Хелидоніумъ* 2, *Натрумъ холеиникумъ* 6, *Аурумъ муріатик.* 6, *Апоцинумъ каннабик.* 3, *Лептандра* 3. 5) При отекахъ конечностей, грудей и т. п. *Аписъ* 3 и *Арсеникъ іодатумъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель. 6) Водянка яичекъ или яичниковъ *Аписъ* 3 и *Іодіумъ* 3, по 2 раза въ день. 7) Если водянка является слѣдствіемъ скарлатины или оспы, то *Гепаръ сульфурисъ* 3 и *Аписъ* 3, по 3 раза въ день по костяной ложечкѣ и по 3 капли. 8) При болѣзняхъ матки: *Аписъ* 3 и *Сульфуръ* 3, по 3 раза въ день по 3 капли.—9) Водянка кожи: *Аписъ* 3, *Арсеникъ* 3, *Олеумъ Теребинтин.* 1, поочередно по 2 раза въ день по 3 капли.—10) Водянка сердечной сумки: *Арсеникъ* 3, *Ликоподіумъ* 6, *Кали карбоникумъ* 3.—11) Водянка мошонки: *Ацидумъ флуорикумъ* 6, 4 раза въ день по 5 капель.

Водянка мозга.

При наличности указанныхъ ниже симптомовъ этой болѣзни немедлено послать за врачемъ, который и долженъ лѣчить эту опасную и рѣдко излѣчиваемую болѣзнь.

Причины: Наслѣдственность; золотуха, иногда сопряженная съ бугорчаткою; несоотвѣтствующая пища; нездоровая сырая квартира; нецѣлесообразное питаніе маленькихъ дѣтей; послѣдствіе коклюша, кори, скарлатины. Большею частью бываетъ у дѣтей между 3 и 7 годами жизни.

Признаки: Болѣзнь начинается мало-по-малу и почти незамѣтно, и поэтому вначалѣ ее часто трудно распознать. Головныя боли, капризное настроеніе, неспокойный сонъ, поперемѣнные запоры и поносы, блѣдность лица и исхуданіе, вечеромъ лихорадка, частая *рвота при необложенномъ языкѣ*. При дальнѣшемъ развитіи: сильныя головныя боли, упорные запоры при втянутомъ животѣ, глаза выпучены, зрачки сужены; иногда является косоглазіе, судороги, спячка, упадокъ силъ, параличи, глубокія тяжелыя дыханія и вы-

дыханія и, наконецъ, незадолго до смерти холодный клейкій потъ.

Лѣченіе: Пить можно давать свѣжую воду, молоко и бульонъ. Комната, гдѣ помѣщается больной ребенокъ, должна быть сухая, чистая. Для правильныхъ отправленій желудка ставить ежедневно клистиры изъ комнатной воды, а для опорожненія мочевого пузыря производить легкія растиранія ладонью нижней части живота.

1) Какъ только появятся предвѣстники воспаленія мозга или малѣйшія показанія, то тотчасъ же давать *Кали гидроіодикумъ*×2, по 5 капель черезъ 2 часа, а затѣмъ *Бріонія* 3 и *Кали гидроіодикумъ*×2, попеременно. 2) Когда лицо блѣдное и одутловатое, потъ холодный и зрачекъ суженъ, а также неспокойный сонъ и скудное отдѣленіе мочи,—*Гелеборусъ* 3, черезъ 1 часъ по 2 капли. 3) При судорогахъ *Купрумъ* 6, черезъ 1/4 часа по 2 капли. 4) При параличѣ *Фосфоръ* 3, по 2 капли черезъ 1/2 часа, а потомъ черезъ 2 часа.

Выпаденіе волосъ.

Волосъ выпаденіе обусловливается разстройствомъ въ питаніи волосяныхъ мѣшечковъ.

Причины: Тяжкія болѣзни (тифъ, скарлатина, родильная горячка, воспаленіе легкихъ, сифилисъ, рожа головы, экзема, парша и др.), частые роды, распутная жизнь, слишкомъ тугое стягиваніе волосъ (косъ), злоупотребленіе помадами, эссенціями, маслами для волосъ; горе и заботы; наслѣдственность.

Лѣченіе: Содержаніе волосистой части головы въ чистотѣ. Расчесываніе волосъ частою гребенкою по два раза въ день. Еженедѣльное обмываніе головы процѣженнымъ сквозь кисею отваромъ пшеничныхъ отрубей. Д-ръ Герингъ совѣтуетъ слѣдующее средство: тщательно смѣшать, наливая по каплямъ, нѣсколько капель *лаврового масла* или *масла горькаго миндаля* съ 2 столовыми ложками *бычачьихъ мозговъ*, или же взять въ равныхъ частяхъ *костный мозгъ* и *миндальное масло* и смѣшать съ 15—20 каплями *фосфорной ки-*

слоты; втирать каждый вечеръ небольшое количество этой помады въ волосистую часть головы. Хорошо укрѣпляетъ волосы также *Арниковая* и *Аписная помада*. 1) При выпаденіи волосъ вслѣдствіе изнурительныхъ болѣзней слѣдуетъ давать *Феррумъ гэматиникумъ*×2 и *Хину* × 3, по 2 раза по ложечкѣ и 5 капель. 2) Вслѣдствіе головныхъ болей отъ неспокойной, полной заботъ жизни: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, *Стафизагрія* 3, по 3 раза въ день по 5 капель. 3) Вслѣдствіе меркуріализма (злоупотребленія ртутью): *Гепаръ сульфурисъ* 3, *Карбо вегетабилисъ* 3, по 3 раза въ день по ложечкѣ. 4) Вслѣдствіе воспалительныхъ или горячечныхъ болѣзней: *Гепаръ сульфурисъ* 3 и *Арсеникъ* 3 попеременно, по 2 раза въ день. 5) У родильницъ: *Секале корнутумъ* 3, *Фосфоръ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель. 6) Вслѣдствіе длительной головной боли: *Ацидумъ нитрикумъ* 3, *Фосфоръ* 3. 7) Если выпаденіе волосъ происходитъ безъ видимой причины: *Фосфоръ* 6, по 3 раза въ день въ теченіе долгаго времени, дѣлая послѣ каждыхъ 10—15 дней лѣченія двухнедѣльный отдыхъ.

Волчанка, туберкулезъ кожи.

Разъѣдающій лишай, въ видѣ красноватыхъ узелковъ, чаще всего на лицѣ и на носу, которые шелушатся, становятся бугристыми и изъязвляются. Эта кожная болѣзнь вызывается туберкулезными палочками и производитъ страшныя разрушенія тканей, увѣчья и безобразія. Она очень трудно излѣчивается.

Лѣченіе: 1) *Арсеникъ іодатумъ* 6, по 3 раза въ день по 5 капель.—2) При разрушеніи носового хряща или кости: *Аурумъ муріатикумъ натрон.*×3 и *Силицеа* 3, черезъ день попеременно, по 3 раза въ день по костяной ложечкѣ и по 5 капель.

Хорошимъ средствомъ отъ волчанки считаютъ *Туя* 30, утромъ и вечеромъ по 3 капли, и снаружи *мазь изъ раствора Туя* 3,20 капель *тинктуры* на 1 унцъ *глицерина*, или *вазелина*, или

Лянолина; продолжать это лѣченіе въ теченіе 14 дней, а затѣмъ сдѣлать 8-дневный перерывъ. Послѣ этого принимать въ теченіе 14 дней утромъ и вечеромъ *Туя* 12, а снаружи прикладывать *ту же мазь*; затѣмъ опять перерывъ въ 8 дней, и т. д. продолжать это лѣченіе въ теченіе 12—18 мѣсяцевъ.

Воспаленіе клѣтчатки.

Гепаръ сульфурисъ 6 попеременно съ *Белладонна* 3, каждый часъ по 5 капель или 5 крупинокъ, а позднѣе *Силицеа* 3, утромъ и вечеромъ по костяной ложечкѣ. Въ опухоль втирать *Аписное масло*. При омертвѣніи клѣтчатки: *Арсеникумъ* 3 и *Ляхезисъ* 6, черезъ 2 часа по 2 капли, и наружное примѣненіе: промывать гнойникъ *растворомъ Календулы* Θ (по чайной ложкѣ на ½ ст. воды) или на омертвѣвшую поверхность прикладывать компрессы изъ масла белладонна.

Воспаленіе легкихъ, крупозная пневмонія.

Воспаленіе легкихъ или крупозная пневмонія представляетъ собою очень распространенную острую болѣзнь, сопровождающуюся довольно высокой лихорадкой, вызываемую особымъ видомъ микроорганизмовъ (диплококка Френкеля).

Причины: Всего чаще простуда, быстрое охлажденіе разгоряченнаго тѣла, промачиваніе ногъ и т. п.

Признаки: Сильный, потрясающій ознобъ; короткое, учащенное дыханіе (съ приподыманіемъ носовыхъ крыльевъ); жгучая кожа; недостаточное мочеотдѣленіе, при чемъ моча ярко-краснаго цвѣта; сильная лихорадка (40°); короткій болѣзненный кашель; колющія боли въ боку; выдѣляемая мокрота сначала вязка, клейка и смѣшана съ кровью, а позд-

нѣе слизиста, буро-краснаго цвѣта (ржавая), гноевидна. Обыкновенно на 5—8 день появляется кризисъ, а затѣмъ слѣдуетъ медленное выздоровленіе. При переходѣ же болѣзни въ легочную чахотку, вечернія лихорадочныя движенія не прекращаются, больной замѣтно худѣетъ, у него появляются сильные, изнурительные ночные поты.

Діэта: Молоко главнымъ образомъ; какъ питье, давать черезъ каждые 5 минутъ по ложечкѣ свѣжей, не слишкомъ холодной воды или миндальнаго молока. Въ случаяхъ, принимающихъ длительный характеръ,—хорошее молоко, яйца, сырое скобленое мясо. При упадкѣ силъ: давать три раза въ день по ложечкѣ токайскаго вина или крѣпкаго рейнвейна. Слабымъ дѣтямъ слѣдуетъ съ самаго начала болѣзни давать токайское вино. Нужно наблюдать, чтобы въ комнатѣ больного былъ всегда свѣжій, чистый воздухъ и чтобы температура не превышала 15°. По окончаніи болѣзни недѣли черезъ 3—4 постепенно пріучать себя къ обтираніямъ тѣла холодною водою по утрамъ или на ночь, носить шерстяное бѣлье, дѣлать продолжительныя прогулки на чистомъ воздухѣ въ хорошіе, солнечные, сухіе дни, при этомъ развивать грудь глубокими вдыханіями воздуха.

Лѣченіе: Главнымъ излѣчивающимъ средствомъ при воспаленіи легочной плевы и легкихъ является *Бріонія* 3, которую и слѣдуетъ давать немедленно больному каждый часъ по 5 капель и, какъ питье, *Белладонна* 3, 30 капель на стаканъ, черезъ часъ по глотку. Какъ только кровь покажется въ мокротѣ, то принимать черезъ каждые 1/2 часа или часъ попеременно *Бріонію* 3 и *Фосфоръ* 3. 3) При влажныхъ (слизистыхъ) хрипахъ, мучительномъ кашлѣ съ труднымъ отдѣленіемъ мокроты, языкѣ, покрытомъ толстымъ налетомъ: *Тартарусъ эметикусъ* 3, по 5 капель попеременно черезъ часъ съ *Пульсатилла* 3. 4) При угрожающемъ параличѣ легкихъ: *Купрумъ ацетикумъ* 3 и *Фосфоръ* 6, черезъ 1/2 часа по 5 капель. 5) Съ цѣлью вызвать при влажномъ плевритѣ всасываніе эксудата (выпотѣнія): *Бріонія* 3 и *Арсеникумъ іодатумъ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель. 6) Противъ долго остающагося сухого раздражительнаго

капля: *Гіосціамъ* 3 и *Хамомилла* 3, по 2 раза въ день, по 5 капель.

Воспаленіе надкостницы.

Причины: Дѣйствіе микроорганизмовъ, всевозможныя поврежденія (ударъ, толчекъ, паденіе, давленіе и т. д.), различныя общія болѣзни (золотуха, сифилисъ) и т. д.

Признаки: Лихорадка и боль въ пораженномъ членѣ; опухоль и краснота кожи. Если образуется нагноеніе, то кожа, покрывающая воспаленную надкостницу, становится багровою, затѣмъ—темнокрасною, а сама опухоль увеличивается и распространяется все болѣе и болѣе.

Лѣченіе: При воспаленіи надкостницы вслѣдствіе удара, давленія и другой механической причины: *компрессы изъ холодной воды* съ примѣсью *тинктуры Симфитумъ* (одна часть на 5 ч. воды). При образованіи нагноенія—припарки для скорѣйшаго созрѣванія гнойника. Вскрывшійся нарывъ слѣдуетъ промывать растворомъ *Каллендула* (Θ или тинктуры), 1 чайную ложку на стаканъ воды, и закладывать ватой, смоченной белладоннымъ масломъ.

Внутрь давать: 1) Сначала *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріемъ солюбилисъ* 6, черезъ 2 часа по 5 капель. 2) При незначительномъ объемѣ воспаленія съ сверлящими болями: *Мезереумъ* 3. 3) При твердой опухоли надкостницы: *Калькареа флуорика* 3, 4 раза въ день по ложечкѣ. 4) По прекращеніи болей и отдѣленіи доброкачественнаго гноя: *Гепаръ сульфуръ* 6, поперемѣнно съ *Силиціей* 6, черезъ 2 часа по 3 капли. 5) При нагноеніи носовыхъ и лицевыхъ костей. *Аурумъ муріатикумъ* 6, 4 раза въ день по 3 капли. 6) При отдѣленіи сукровицы, злокачественнаго, вонючаго гноя: *Ассафетида* 6, *Сульфуръ* 6. 7) При воспаленіи надкостницы у золотушныхъ: *Калькареа іодата* 6, *Іодъ* 3. 8) При хроническомъ воспаленіи надкостницы съ образованіемъ утолщеній надкостницы (наростовъ на кости): *Калькареа іодата* 6 и

Арсеникъ іодатумъ 6, поперемѣнно. 9) При образованіи костоѣды, свищей, для лучшаго отторженія омертвѣвшаго участка кости, примочки изъ Aqua silicata Θ (кремневокислая вода).

Воспаленіе

надкостницы зубного корня.

Оно развивается въ зубахъ съ дуплами, зараженныхъ костоѣдою; боли при этомъ бываютъ непрерывными и увеличиваются отъ дотрогиванія зуба.

Лѣченіе: Сначала *Кали іодатумъ* 2, черезъ 2 часа по 5 капель. Если боль усилится: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3. Если воспаленіе часто возобновляется: *Фосфоръ* 3. При механическомъ поврежденіи здоровыхъ зубовъ: *Арника* 3. Принимать лѣкарства черезъ 2 часа по 3 капли. Въ опухоль (флюсъ) втирать масло *Аписъ*.

Выкидышъ, преждевременные роды.

Причины: Тяжелая работа, подниманіе и ношеніе тяжестей, скорая ходьба, прыганье, танцы, переутомленіе, паденіе, толчокъ, ударъ, сотрясеніе, душевныя волненія и т. д. Женщины, разъ выкинувшія, имѣютъ предрасположеніе и къ дальнѣйшимъ выкидышамъ, которые въ такихъ случаяхъ наступаютъ въ то же время, какъ и предыдущій.

Признаки: Боль въ поясницѣ и крестцѣ, родовыя схватки и потуги, истеченіе крови и слизи.

Лѣченіе: Нужно немедленно послать за врачемъ, а до его прихода лечь въ постель и лежать на спинѣ, соблюдая безусловный покой и діэту. 1) Для предохраненія себя отъ

выкидыша на 1-мъ и 2-мъ мѣсяцѣ беременности: *Кали карбоникумъ* 3; на 3-мъ мѣсяцѣ: *Сабина* 3 и *Актеа раземоза* 3; на 7-мъ: *Сепіа* 3, по 2 раза въ день по 3 капли. Кромѣ того показуются: *Вибурнумъ* 3, или *Валеріана* 3 при сильномъ возбужденіи, боляхъ въ нижней части живота, безсонницѣ, сновидѣніяхъ; а при возбужденіи полового влеченія—*Платина* 6.—2) Если вслѣдствіе выкидыша появилось сильное кровотеченіе, то слѣдуетъ давать: 1) *Арнику* и *Гамамелисъ* 3, черезъ 1/4—1/2 часа по 3 капли, если выкидышъ произошелъ вслѣдствіе удара, толчка, паденія. 2) *Хина* × 3 и *Крокусъ* 3, при выдѣленіи черной, вязкой крови. 3) При мертвомъ плодѣ и для удаленія такового: *Секале корнутумъ* 3, черезъ часъ по 5 капель. 4) При судорогахъ: *Белладонна* 3 и *Камомилла* 3, черезъ 1/2 часа или 1 часъ по 3 капли. Такъ какъ выкидыши легко повторяются около того же времени, какъ въ первый разъ, то женщина должна въ теченіе своей беременности соблюдать тѣлесное и душевное спокойствіе, не носить корсета и стягивающей одежды, воздерживаться отъ всякихъ возбуждающихъ средствъ, въ томъ числѣ и отъ крѣпкаго чая и кофе, и принимать вышеуказанныя средства.

Выпаденіе матки.

Больная должна нѣсколько дней, а иногда и нѣсколько недѣль лежать спокойно на спинѣ, при чемъ тазовая часть должна быть немного приподнята. Поднимать или носить что-либо тяжелое, а равно всякая физическая работа, долго ходить и стоять, безусловно воспрещается. Необходимо обратиться къ спеціалисту-акушеру.

Лѣченіе: 1) Выпаденіе послѣ родовъ—*Нуксъ вомика* 3 и *Сепія* 3, черезъ день поперемѣнно, по 2 раза въ день каждаго по 3 капли.—2) Если послѣ двухъ-трехнедѣльнаго употребленія упомянутыхъ средствъ болѣзнь не поправится, то давать *Аурумъ муріатикумъ* 6, по 3 капли 3—4 раза въ день.—3) Если

причиною былъ ушибъ или переутомленіе, то *Нуксъ вомика* 3 и *Арника* 3.

Выпаденіе маточнаго рукава. Посредствомъ пальца, намазаннаго масломъ или вазелиномъ, рукавъ вправляется обратно, причемъ больная должна лежать на спинѣ съ вытянутыми ногами. Полное спокойствіе. Впрыскиваніе *Календулы* съ тепловатой водой (столовую ложку тинктуры на кружку воды) во влагалище и регулированіе желудка посредствомъ клизмы—необходимы.

Лѣченіе: Сперва давать *Нуксъ вомика* 3 дня три, 3 раза въ день по 5 капель, а затѣмъ *Ликоподіумъ* 6 и *Натрумъ муріатикумъ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли.

Выпаденіе прямой кишки.

Выпаденіе прямой кишки является результатомъ ослабленія ея мышцъ, вслѣдствіе продолжительнаго жиленія и натуживанія, при длительныхъ поносахъ, при упорныхъ запорахъ, хроническомъ геморроѣ.

Часто бываетъ у дѣтей, въ особенности у рахитиковъ. Ребенка надо положить на животъ, такъ чтобы голова и ноги находились выше, а средняя часть туловища ниже: при этомъ обыкновенно кишка уходитъ на свое мѣсто. Если этого не случится, то полотняную тряпочку обмочить въ прованскомъ или деревянномъ маслѣ и легкимъ надавливаніемъ этой тряпочкой вправить кишку обратно.

Лѣченіе: Внутрь давать *Игнація* 3, а если не поможетъ, *Нуксъ вомика* 3, три раза въ день по 5 капель. Если выпаденіе кишки послѣдуетъ отъ поноса или дизентеріи, то давать *Арсеникъ* 6, каждый часъ по 5 капель или 5 крупинокъ. Золотушнымъ дѣтямъ даютъ продолжительное время *Калькареа карбоника* 6, утромъ и вечеромъ по 2 капли или 5 крупинокъ. Когда выпаденіе кишки случается при глистахъ, раздражающихъ прямую кишку, то давать *Белладонну* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ 2 часа попеременно.

Если выпаденіе кишки бываетъ у взрослыхъ при геморроѣ, то нужно смочить полотняную тряпочку въ растворѣ тинктуры *Гамамелисъ*, 1:4 части воды, и нѣсколько часовъ подъ рядъ дѣлать примочки, а внутрь давать *Нуксъ вомика* 3 и *Сульфуръ* 3, по два раза въ день каждаго поперемѣнно по 2 капли.

Вѣтры.

Часто страдающіе вздутіемъ живота вслѣдствіе переполненія его газами должны придерживаться указанной ниже діэты, массировать ежедневно по утрамъ желудокъ и животъ и въ случаѣ надобности класть на ночь согрѣвающій компрессъ.

Лѣченіе: 1) При вздутіи живота послѣ пищи жирной и неудобоваримой—*Пульсатилла* × 3 и *Нуксъ вомика* 3, черезъ 1 часъ по 3 капли.—2) Сильныя вздутія, сопряженныя съ болями—*Карбо вегетабилисъ* × 3 и *Нуксъ вомика* × 3, черезъ ½ часа по костяной ложечкѣ и по 3 капли поперемѣнно. 3)—При вѣтрахъ съ отрыжкою—*Магнезія карбоника* 1 и *Карбо вегетабилисъ* × 3, поперемѣнно черезъ ½ часа по костяной ложечкѣ,—два, три пріема. 4) Если вѣтры сопряжены съ запорами, завалами кишекъ, то давать *Сульфуръ* 3, *Нуксъ вомика* 6 и *Ликоподіумъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель, и на ночь согрѣвающій компрессъ.—5) Вздутіе живота: *Карбо вегетабилисъ* 6 и *Камомилла* 3.—6) Приливъ крови къ головѣ и груди: *Белладонна* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 6.—7) Переходящія вздутія живота: *Карбо вегетабилисъ* 6, *Гепаръ сульфурисъ* 6, *Графитъ* 6, поочередно черезъ часъ по 3 капли.—8) При боляхъ живота, происходящихъ отъ ѣды, и при наклонности къ поносамъ: *Рафанусъ сат.* 2, черезъ 2 часа 5 капель.—9) При геморроѣ: *Сульфуръ* 6.

Вѣтры у дѣтей легко проходятъ отъ *Камомилла* 3 и *Ликоподіумъ* 6: давать поперемѣнно черезъ часъ по 1 каплѣ или 5 крупинокъ, и натирать животикъ масломъ.

Діэта: Избѣгать всякихъ кушаній, вызывающихъ развитіе газовъ, какъ, напр., капусты, бобовъ, стручковъ, гороха, свѣжаго хлѣба, пироговъ, пива и т. п.

Галлюцинаціи.

Если кому-либо представляются при открытыхъ глазахъ воображаемыя фигуры, животныя, привидѣнія, люди и т. д.,— *Валеріана* 3 и *Игнація* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.

Гангрена.

Если пораженная гангреною часть тѣла представляется опухшею, воспаленною и вызываетъ жгучія боли, послѣ чего она синѣетъ и, наконецъ, прекращаются всякія боли, а сама пораженная часть становится холодною и черною, то въ такомъ случаѣ ее *слѣдуетъ отнять* (отрѣзать).

Вспомогательныя мѣры: При наклонности къ омертвѣнію накладывать на пораженную часть компрессы, смоченные въ маслѣ Белладонна. Накладываютъ тоже на больные члены довольно толстый слой совершенно сухой глины которую превращаютъ до того въ мельчайшій, просѣянный сквозь шелковое сито порошокъ; такой порошокъ можно достать у горшечниковъ. Эту повязку нужно мѣнять ежедневно такъ, чтобы каждый разъ былъ накладываемъ свѣжій порошокъ глины. Отъ этого исчезаетъ не только дурной запахъ, но и сами боли уменьшаются, а язва по истеченіи нѣсколькихъ дней принимаетъ здоровый видъ. Вмѣсто глины, можно употребить чистый, просѣянный порошокъ древеснаго угля.

Лѣченіе. При грозящей образоваться гангренѣ: *Русъ* 3 попеременно съ *Белладонна* 3. При вполнѣ развившейся гангренѣ: *Белладонна* 3 попеременно съ *Арсеникъ* 3 или съ *Секале корнутумъ* 3. При большомъ упадкѣ силъ: *Фосфоръ* 3 попеременно съ *Хина* 1 и *Ацидумъ гидроціаникумъ* 6. Лѣкарства давать черезъ 1—2 часа, по мѣрѣ надобности, по 5 капель на пріемъ.

Геморрой.

Находящіяся въ нижней части прямой кишки вены и венозныя сплетенія, расширяясь, вслѣдствіе застоя и давленія крови, превращаются въ узлы (шишки) и разлитыя расширенія, крайне болѣзненныя и затрудняющія опорожненіе кишечника; подобное болѣзненное разстройство называется геморроемъ.

Причины: Сидячая жизнь; слишкомъ частая или продолжительная верховая ѣзда; чрезмѣрное употребленіе крѣпкаго кофе, вина, пива, водки, а также тяжелой пищи, какъ ветчина, пироги, всякія печенія, пряности и соленія; скопленіе кала въ прямой кишкѣ; болѣзни сердца и печени; беременность и роды; болѣзни матки, яичниковъ, предстательной железы и т. п.

Признаки: Узлы (шишки) въ заднемъ проходѣ, которые иногда выступаютъ наружу; по временамъ истеченіе крови и слизи; зудящія, колющія боли въ заднемъ проходѣ, чувство давленія въ животѣ; боли въ поясницѣ; незначительныя кровотеченія, возвращающіяся въ правильные промежутки времени, облегчаютъ страданіе. Геморрой развивается преимущественно между 30—50 годами жизни.

Лѣченіе: Нужно заботиться о правильномъ и легкомъ испраженіи на низъ. Выпивать по утрамъ натощакъ 1—2 стакана чистой холодной воды. Ставить клистиры, если не дѣйствуютъ лѣкарственныя средства, упомянутыя ниже. При сильныхъ боляхъ шишки нужно обмывать ватою, смоченною въ растворѣ 1 чайной ложки *Гамамелисъ* въ чашкѣ воды, и вставлять 3—4 раза въ день свѣчки изъ *Гамамелисъ*.

Діэта должна быть преимущественно растительная: плоды, овощи, молоко, яйца и т. д. Лицамъ, привыкшимъ къ спиртнымъ напиткамъ, можно разрѣшить легкое вино, легкое пиво, сыворотку. Воспрещаются всѣ трудноваримыя, жирныя и приправленныя острыми пряностями кушанья, а также спиртные напитки, крѣпкое пиво, черный кофе и всякія возбуждающія средства. По вечерамъ супы всего легче перено-

сятся. Для достиженія правильныхъ испражненій на низъ весьма полезно употреблять зерновой или изъ грубой муки хлѣбъ, плоды и виноградъ. Кромѣ того слѣдуетъ дѣлать движеніе на чистомъ воздухѣ. Избѣгать сидѣнія на мягкой мебели. Можно также посовѣтовать ванны и холодныя обмыванія живота, равно какъ кратковременныя холодныя поясныя ванны.

При выпаденіи и ущемленіи геморроидальныхъ шишекъ больному придаютъ колѣно-локтевое или боковое положеніе и стараются *вправить шишки* помощью обмокнутаго въ масло пальца или смоченнаго въ масло куска полотна, а затѣмъ прикладываютъ часто смѣняемые холодные компрессы или ледъ. Полнокровнымъ больнымъ полезно лѣченіе *сывороткой* и *виноградомъ*, а также *Карлсбадскія* минеральныя воды. Слѣдуетъ еще замѣтить, что всякія геморроидальныя страданія быстро проходятъ отъ употребленія *экстракта Гамамелисъ*. Ежедневные пріемы по три раза въ день по 15 капель этого экстракта и прикладываніе мази или примочки изъ *экстракта Гамамелисъ* унимаютъ боль и уничтожаютъ кровотеченія, послѣ чего и самыя шишки постепенно исчезаютъ. Равнымъ образомъ совѣтуютъ при твердыхъ, болѣзненныхъ шишкахъ *тинктуру Вербаскумъ*, которую слѣдуетъ принимать три раза въ день по 1 каплѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ смазывать шишки смѣсью оливковаго масла съ этою тинктурою или тинктурою *Гамамелисъ*.

Внутрь: 1) Чрезъ 1—2 ч. по 5 капель *Гамамелисъ* ×3, *Нуксъ вомика* 6 и *Сульфуръ* 6, принимаемыя: первое по утрамъ, а второе по вечерамъ, по 5 капель въ теченіе 8 дней, съ промежутками въ 3—4 дня послѣ каждыхъ 8 дней лѣченія, устраняютъ геммороя въ большинствѣ случаевъ. Иногда бываетъ полезна *Коллинзонія*×3.—2) При зудящихъ болячъ: *Нуксъ вомика* 3 и *Ацидумъ нитрикумъ* 3 поперемѣнно, черезъ 2 часа по 3 капли или крупинки.—3) При жгучихъ болячъ: *Арсеникъ* 3, *Туя* 3 черезъ 2 часа.—4) При опуханіи и воспаленіи шишекъ: *Белладонна* 3 и *Коллинзонія*×2, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—5) При трещинахъ задняго прохода: *Пэонія* 3, 4 раза въ день по 3 капли, и смазывать нѣсколько разъ въ день *мазью изъ Ратаніи*.—

6) При запорахъ, когда каловыя массы покрыты слизью: *Карбо-вегетабилисъ* 6 и *Сульфуръ* 6, по 2 раза въ день.—7) При гангренѣ шишекъ: *Арсеникъ* 3 и *Ацидумъ муріатикумъ* 3.—8) При кровотеченіяхъ: *Гамамелисъ* 2, *Миллефоліумъ* 3 и примочки изъ 1—2 чайныхъ ложекъ жидкаго *экстракта Гамамелиса* на чашку воды.—9) При отдѣленіи слизи: *Карбо вегетабилисъ* 3 и *Антимоніумъ-крудумъ* 6, каждые 2 часа по ложечкѣ и по 3 капли.—10) При выдѣленіи гноя: *Гепаръ сульфурисъ* 3.—11) При геморроѣ во время беременности и родильнаго періода *Коллинзонія*×2, по 5 капель 3 раза въ день.

Глазныя болѣзни.

1. Воспаленіе слизистой оболочки вѣкъ (конъюнктивы). Однимъ изъ самыхъ частыхъ заболѣваній глазъ является воспаленіе слизистой оболочки или конъюнктивы. Самый обыкновенный видъ этой болѣзни—катарральное воспаленіе (острое и хроническое), самый опасный—гнойное воспаленіе или бленнорея глазъ (вслѣдствіе зараженія). Наконецъ, существуетъ еще также тяжелое воспаленіе такъ называемое зернистое или трахома, заразительное для окружающихъ больного.

Вспомогательныя мѣры: Слѣдуетъ защитить воспаленные глаза отъ свѣта посредствомъ зеленаго (либо синяго) глазного зонтика или посредствомъ куска черной или темнозеленой тафты, прикрѣпляемой надъ глазомъ такъ, чтобы она свободно висѣла передъ нимъ, вполнѣ прикрывая его: или же нужно носить синія (сѣрыя) очки. Тугія повязки, согрѣвая глаза, увеличиваютъ ихъ воспаленіе. Гноящіеся глаза необходимо тщательно и какъ можно чаще очищать отъ гноя, слизи и т. п. гигроскопическою ватою, смоченною въ тепловатой водѣ, къ которой можно прибавить нѣсколько капель тинктуры Евфразія на рюмку воды. Такъ какъ слизь и гной, отдѣляющіеся изъ глазъ, бываютъ весьма часто чрезвычайно заразительны, то другія лица не должны

употреблять губокъ, полотенецъ и т. п., которыми вытирались больные глаза.

Лѣченіе: 1) Противъ **катарральнаго воспаленія глазъ**, происходящаго отъ простуды: *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Белладонна* 3 или же съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 2 часа по 3 капли въ рюмочкѣ воды. Иногда также, если воспаленіе въ связи съ насморкомъ, хорошо помогаетъ *Кали бихромикумъ* 6 и *Гепаръ сульфурисъ* 6. На глаза дѣлать компрессы изъ 1% раствора борной кислоты съ *Евфразіей* (20 капель на 1/2 стакана раствора). Эти компрессы слѣдуетъ дѣлать 3-4 раза въ день и болѣе, оставляя ихъ на вѣкахъ по нѣсколько минутъ, или же промывать глаза этимъ растворомъ раза 3 и болѣе въ день.—2) При катарральномъ воспаленіи глазъ, соединенномъ съ сильнымъ слезотеченіемъ и отдѣленіемъ слизи: *Натрумъ муріатикумъ* 6 и *Евфразія* 3, поперемѣнно, по 3 раза въ день по 3 капли. При сильномъ воспаленіи краевъ вѣкъ и образованіи на нихъ толстыхъ гнойныхъ струпьевъ (корокъ)—*Гепаръ сульфурисъ* 6. При частыхъ возвратахъ воспаленія: *Гамамелисъ* 3.—Въ длительныхъ случаяхъ могутъ быть еще назначены: *Сульфуръ* 6 и *Арсеникумъ* 6 черезъ день, по 3 раза въ день по 3 капли.

2. **Ревматическое воспаленіе вслѣдствіе простуды глазъ** характеризуется рвущими, колющими болями, свѣтобоязнью, разъѣдающимъ слезотеченіемъ, воспаленіемъ соединительной оболочки, образованіемъ пузырьковъ и язвочекъ (фликтенъ) на соединительной оболочкѣ и роговицѣ и часто сильною головною болью или болью въ сочлененіяхъ.

Лѣченіе: *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Пульсатилла* 3 или съ *Русъ* 3, каждые 2 часа по 3 капли или 5 крупинокъ. Если воспаленіе глазъ соединено съ ревматическими болями въ членахъ и суставахъ: *Русъ* 3, а затѣмъ *Калькарея карбоника* 6 или *Гепаръ сульфурисъ* 6.—При боляхъ въ глазныхъ впадинахъ, опаденіи верхнихъ вѣкъ, какъ бы отъ паралича, наклонности мигать глазами: *Спигелія* 3, черезъ 2-3 часа по 3 капли.

3. **Зернистое воспаленіе соединительной оболочки глазъ или трахома** бываетъ часто эпидемическимъ и небезопаснымъ.

Такъ какъ оно очень прилипчиво, то слѣдуетъ принять всякія мѣры предосторожности противъ зараженія имъ. Въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни образуются на соединительной оболочкѣ узелки (бѣлые пузырьки), величиною съ просяное зерно, похожіе на икру.

Лѣченіе: *Меркуріусъ преципитатусъ руберъ* 3 и *Гепаръ сульфурисъ* 3, по костяной ложечкѣ черезъ 2 часа, при чемъ слѣдуетъ смазывать внутреннюю оболочку вѣкъ воднымъ растворомъ *Купрумъ сульфурикумъ*×3 и промывать глаза нѣсколько разъ въ день 1% растворомъ борной кислоты. Необходима абсолютная чистота и обязательное обмываніе. Важно: не запускать болѣзни и до полнаго излѣченія находиться подъ наблюденіемъ врача.

4. **Золотушное или лимфатическое воспаленіе соединительной оболочки глазъ** наблюдается у лицъ, страдающихъ золотухою, у которыхъ обыкновенно замѣчается опухоль, а иногда и воспаленіе носа, а также опухоль губъ и железъ, сыпи, струпья на головѣ и за ушами и т. д., частое опуханіе вѣкъ, свѣтобоязнь, жгучія и колющія боли въ глазахъ, слезотеченіе, нагноеніе.

Вспомогательныя мѣры: Частое промываніе вѣкъ воднымъ 1% растворомъ *борной кислоты*.

Лѣченіе: *Белладонна* 3 попеременно съ *Сульфуръ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли. По истеченіи 8 дней прекращаютъ пріемы *Сульфура*, а продолжаютъ давать одну лишь *Белладонну*. Хорошо также втирать ежедневно въ больной глазъ кусочекъ желтой глазной мази величиною въ чечевицу.—При сильной свѣтобоязни: *Коніумъ* 3, *Ацидумъ нитрикумъ* 3, по 2 раза въ день по 3 капли.—При судорожномъ сжиманіи вѣкъ: *Магнезія фосфорика* 6, *Агарикусъ мускаріусъ* 6.—При слезотеченіи, свѣтобоязни, воспалительной опухоли краевъ вѣкъ, которыя по утрамъ гноятся, а также при образованіи пятенъ и язвъ на роговицѣ глаза, ощущеніи песку въ глазахъ: *Белладонна* 3 попеременно съ *Гепаръ сульфурисъ* 6, по 3 раза въ день. Если эти средства не помогутъ: *Меркуріусъ коррозивусъ* 3, три раза въ день по 2 капли. При золотушномъ воспаленіи глазъ съ

образованіемъ узелковъ (зернистости) на краяхъ вѣкъ: *Кали хлоратумъ* × 6, 3 пріема въ день по ложечкѣ. При частыхъ возвратахъ золотушнаго воспаленія глазъ: *Арсеникъ* 30, въ рѣдкихъ пріемахъ (1-2 въ день) и затѣмъ одинъ пріемъ *Туя* 30. Кромѣ того въ длительныхъ случаяхъ можно назначать: *Натрумъ муріатикумъ* 6, *Туя* 6, *Аурумъ муріатикумъ* 6, *Силицеа* 6, *Кали бихромикумъ* 6; эти средства слѣдуетъ давать, соблюдая 3—6-дневные промежутки между каждымъ изъ нихъ. При образованіи пятенъ и пузырьковъ на роговицѣ: *Коніумъ* 3, въ продолженіе 8 дней по одному пріему въ день, а потомъ *Каннабисъ сатива* 3. Если эти средства не помогутъ, то *Сульфуръ* 6, *Калькареа карбоника* 6, *Ацидумъ нитрикумъ* 6, съ большими промежутками (паузами) между каждымъ. Настойчиво лѣчить пораженіе носа, которое поддерживаетъ страданіе глазъ.

5. Сифилитическое воспаленіе глазъ лѣчится по указанію врача. До предписанія врача даютъ ежедневно *Меркуріусъ преципитатусъ руберъ*×3, 4 раза въ день по костяной ложкѣ.

6. Воспаленіе глазъ вслѣдствіе механическихъ причинъ (ушиба, давленія, занозы, операціи и другихъ поврежденій): сначала компрессы изъ раствора 1 чайной ложечки *тинктуры Арники* въ ½ бутылкѣ холодной отварной воды, а затѣмъ тепловатые компрессы воднаго раствора Арники. Попавшія въ глазъ постороннія тѣла должны быть немедленно удалены съ большою осторожностью, въ виду чего слѣдуетъ вывороти вѣки и затѣмъ удалить постороннее тѣло посредствомъ скрученной въ трубочку бумажки или гигроскопической ваты.

Лѣченіе: *Аконитъ* 3 поперемѣнно черезъ часъ съ *Арникой* 3. Кромѣ того полезны: *Коніумъ* 3, *Евфразія*, *Белладонна* п. При расширеніи зрачка вслѣдствіе ушиба, паденія и т. п., *Аурумъ муріатикумъ*.

7. Воспаленіе глазъ у новорожденныхъ. (Немедленно обратиться къ врачу). Вскорѣ послѣ рожденія ребенка влить осторожно одну капельку ½0% раствора *Аргентумъ нитрикумъ* въ мѣшокъ, образуемый соединительною оболочкою глаза, чѣмъ въ большинствѣ случаевъ можно предотвратить дальнѣйшее развитіе болѣзни. (Впускать каплю этого раствора не на

роговицу глаза). Слѣдуетъ почаще промывать глаза тепловатой водой съ *Евфразіей* (5 капель тинктуры на рюмку воды) и прикладывать къ нимъ такіе же компрессы, которые необходимо мѣнять черезъ каждыя 15 минутъ до тѣхъ поръ, пока замѣтны будутъ опухоль и жаръ въ вѣкахъ. Въ опасныхъ случаяхъ дѣлать такія примочки со льдомъ.

Лѣченіе: *Белладонна* 3 и *Меркуріусъ преципитатусъ руберъ* 3 или *Меркуріусъ коррозивусъ* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—При легкомъ кровотеченіи и безпрестанномъ истеченіи гноя *Аргентумъ нитрикумъ* 3, черезъ $1^1/_2$—2 часа по 3 капли, и кромѣ того нѣсколько разъ въ день компрессы изъ раствора 10 капель *Аргентумъ нитрикумъ* 2 на блюдечко воды. Если появится помутнѣніе молочнаго цвѣта на роговицѣ глаза или образуются на ней маленькія углубленія, тогда глазу грозитъ большая опасность, такъ какъ засимъ можетъ послѣдовать потеря зрѣнія; поэтому непремѣнно лѣчить подъ наблюденіемъ врача-спеціалиста.

8. **Различныя глазныя болѣзни.** При кровотеченіи отъ открыванія глазъ: *Ацидумъ нитрикумъ* 3, *Антимоніумъ крудумъ* 6, *Белладонна* 3, *Нуксъ вомика* 3.—При сильномъ кровоизліяніи въ соединительную оболочку глаза: *Нуксъ вомика* 3, *Арника* 6, *Фосфоръ* 6.—При увеличеніи сальныхъ железъ (вѣкъ): *Стафизагрія* 3, *Пульсатилла* 3, *Силицеа* 3, *Аурумъ* 6, по два пріема въ день.—При заворачиваніи глазъ: *Игнація* 3.—При опуханіи вѣкъ: *Аписъ* 3, *Русъ токс.* 3.—При слипаніи глазныхъ вѣкъ: *Гепаръ сульфурисъ* 6. Частое промываніе.—При злокачественномъ воспаленіи роговой оболочки глаза: *Аурумъ муріатикумъ натронатумъ* 3, *Этіопсъ антимоніалисъ* 3, *Кали іодатумъ* 3.—При уменьшеніи остроты зрѣнія вслѣдствіе его напряженія при дурномъ освѣщеніи: *Литіумъ карбоникумъ* 6.

Глисты.

1. **Аскариды**—длинныя круглыя глисты, похожія на дождевыхъ червей, находятся преимущественно въ тонкихъкишкахъ.

Признаки: Безпокойный сонъ, блѣдность лица, зудъ въ носу, капризный аппетитъ, отвращеніе къ извѣстнымъ кушаньямъ, исхуданіе, головныя боли и даже судорожные припадки; иногда появляется и лихорадка, поносъ и боли въ животѣ. Во снѣ дѣти скрежещутъ зубами.

Лѣченіе: Давать утромъ и вечеромъ въ теченіе нѣсколькихъ дней лепешки изъ *Калькареа сантоника*, раза 3 въ день по 2 лепешки. Не слѣдуетъ начинать противоглистнаго лѣченія во время какой-либо другой болѣзни у дѣтей. При тяжкихъ болѣзняхъ, преимущественно при воспаленіяхъ въ кишечникѣ, глисты часто сами по себѣ выходятъ. Разстройства, вызываемыя глистами, могутъ быть устранены посредстомъ *Дина* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, *Валеріана* 3; дѣтямъ, имѣющимъ большой, твердый животъ, нужно назначить *Сульфуръ* 6 и *Калькареа карбоника* 6 въ рѣдкихъ пріемахъ. При рвотѣ глистами: *Сабадилла* 3.

2. **Острицы** или **дѣтскія аскариды**,—маленькія, едва замѣтныя, быстро двигающіяся, похожія на короткій обрывокъ бѣлой нитки, глисты, которыя водятся въ громадномъ количествѣ преимущественно въ толстой кишкѣ и заднемъ проходѣ.

Признаки: Эти глисты могутъ вызывать у дѣтей значительныя разстройства, вслѣдствіе раздраженія, производимаго ими на кишечникъ. Онѣ легко переползаютъ изъ задняго прохода къ половымъ органамъ у дѣвочекъ, гдѣ и вызываютъ жестокій зудъ и бѣли. Дѣти, страдающія отъ острицъ, бываютъ безпокойны, у нихъ появляется внезапно краснота одной щеки, которая также скоро исчезаетъ, какъ и появилась. Остальные признаки совсѣмъ похожи на тѣ, которые бываютъ при обыкновенныхъ глистахъ.

Лѣченіе: Острицы всего лучше удаляются посредствомъ *клистировъ изъ холодной воды* съ примѣсью 10 капель на $^1/_2$ стакана воды тинктуры *Теукріумъ* или изъ *отвара чеснока*. Другой способъ удаленія этихъ глистовъ: размѣшать въ стаканѣ отварной воды одинъ *яичный желтокъ* и $^1/_2$ чайной ложки тинктуры *Пиретрумъ розеумъ*; опорожнить прямую кишку отъ кала посредствомъ клистира изъ комнатной воды и поставить новый клистиръ изъ 2—3 столовыхъ ложекъ

вышеозначенной смѣси, который нужно по возможности дольше удержать въ себѣ. Клистиры эти дѣлать по вечерамъ 4 дня подъ рядъ, а затѣмъ черезъ день въ теченіе нѣкотораго времени. Одновременно слѣдуетъ принимать по нѣсколько капель *Пиретрумъ* въ водѣ, а дѣвочкамъ, кромѣ того, промывать наружныя половыя части *растворомъ* 1 части *Пиретрумъ* или *Теукріумъ* въ 10 частяхъ воды. Не слѣдуетъ употреблять въ пищу зернового хлѣба. Внутрь давать: *Игнація* 3 или *Теукріумъ* 3, принимать съ цѣлью удаленія мучительнаго зуда въ заднемъ проходѣ и половыхъ частяхъ по 2 раза въ день по 3 капли. Равнымъ образомъ можно смазывать по нѣсколько разъ въ день зудящія мѣста *Теукріумъ мазью.*

3. Ленточныя глисты, лентецы.

Признаки: Желудочныя боли, колики, головокруженіе, тошнота, сердцебіеніе, рвота, зудъ въ заднемъ проходѣ и въ носу; лицо блѣдное, свинцоваго цвѣта. Вѣрнѣйшій признакъ ихъ присутствія въ кишечникѣ,—это выдѣленіе кусковъ ленточной глисты съ испражненіями.

Предупредительная мѣра: Никогда не ѣсть сырого мяса.

Лѣченіе: Какъ только куски ленточной глисты станутъ показываться, нужно тотчасъ же принять мѣры, чтобы изгнать ее. Въ виду этого необходимо, чтобы больной 1 сутки до принятія глистогоннаго средства выдержалъ надлежащую діэту, а именно: не ѣсть ничего мучного, молочнаго и мяснаго, а лишь только соленыя и кислыя вещи, какъ-то: селедку, сардины, кильки, огурцы соленые и маринованные, всякую маринованную рыбу и т. п. и по возможности меньше хлѣба. Пить можно чай, красное вино. Послѣ такой подготовки больному можно дать глистогонное (микстуру изъ Филиксъ) одну половину на ночь, а другую на слѣдующее утро натощакъ. Часъ спустя дать ложку миндальнаго или касторовaго масла и выждать, пока не подѣйствуетъ и глиста не выйдетъ цѣликомъ вмѣстѣ съ головкой. Можно также послѣ вышеуказанной подготовки давать порошокъ Панна въ количествѣ $^1/_2$ унціи и такимъ образомъ утромъ натощакъ принять первую треть *порошка Панна,* запивая во-

дою или чаемъ, а затѣмъ черезъ каждые 1/2 часа обѣ другія трети этого порошка. Спустя часъ послѣ пріема послѣдней порціи, больной получаетъ столовую ложку касторoваго масла или какое нибудь иное слабительное и спокойно выжидаетъ выдѣленія глисты. Когда послѣдуетъ испражненіе, то больной не долженъ во время самаго акта ни жилиться, ни ускорять выдѣленія лентеца какимъ нибудь инымъ образомъ, а терпѣливо выжидать, чтобы онъ самъ вышелъ вмѣстѣ съ головкою, такъ какъ въ противномъ случаѣ онъ можетъ оборваться и втянуться обратно, а головка его остаться въ кишечникѣ. Черезъ часъ послѣ принятія слабительнаго больной можетъ поѣсть бульона съ курицей, немного мяса, булки и стаканъ кофе. Страданія, вызываемыя ленточной глистой или солитеромъ, уменьшаются ежедневными пріемами 5 капель *Сабадиллы* 3.

Головная боль.

Головная боль почти всегда зависитъ отъ какихъ либо другихъ разстройствъ организма (желудочно-кишечныя болѣзни, сидячій образъ жизни, нервное разстройство, ревматизмъ, малокровіе, разстройство мѣсячныхъ и др.), почему необходимо всегда отыскать сначала причину головной боли и лѣчить главную болѣзнь, а не одинъ только припадокъ болѣзни. Лишь тогда, когда головная боль является главнымъ симптомомъ болѣзни, и когда она очень сильно безпокоитъ больного, слѣдуетъ приступить къ лѣченію этого тяжелаго симптома.

Лѣченіе: 1) Отъ прилива крови къ головѣ: холодные компрессы на лобъ. Воздухъ въ комнатѣ долженъ быть прохладный. Спокойствіе. Голова должна лежать довольно высоко на подушкахъ. Прохладительные напитки. Горячія ножныя ванны. Внутрь: *Белладонна* 3, а если не поможетъ, то *Гельземинумъ* 3 или *Глоноинъ* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли.

2) Отъ разстройства желудка или отъ злоупотребленія спиртными напитками. Вечеромъ

не употреблять никакой трудно перевариваемой пищи; вообще же всякую пищу слѣдуетъ хорошо размельчать зубами, затѣмъ прожевывать и пропитывать слюною. Вечеромъ не слѣдуетъ пить чаю, пива и крѣпкаго вина. Принимать: *Нуксъ вомика* 3 и *Антимоніумъ крудумъ* 6, черезъ 2 часа по 3 капли попеременно.

3) Отъ простуды, ревматическая головная боль. Принимать *Аконитъ* 3 прежде всего, попеременно съ *Белладонна* 3, черезъ 1 часъ по 3 капли. При дергающей боли: *Колоцинтъ* 3. При періодически возвращающейся боли преимущественно съ лѣвой стороны головы: *Спигелія* 3, *Хининумъ сульфурикумъ* 2. Если головная боль соединена съ насморкомъ: *Аконитъ* 3 попеременно съ *Белладонною* 3 или же съ *Меркуріусъ* 3, черезъ 2 часа по 3 капли и по костяной ложечкѣ.

4) Отъ подагрической (ломотной) головной боли: *Силицеа* 6 и *Русъ* 3, или *Ликоподіумъ* 6, ежедневно лишь по два пріема по 3 капли.

5) Отъ нервной головной боли (которая появляется большею частью съ правой или съ лѣвой стороны лба или въ вискахъ). Спокойствіе. Голова не должна быть приподнята высоко на подушкахъ, а должна лежать довольно низко: а) При головной боли, начинающейся съ затылка, затѣмъ поднимающейся вверхъ, на темя и лобъ, и сосредоточивающейся надъ глазами, при чемъ тугость въ затылкѣ и краснота лица: *Гельземинъ* 3 и *Белладонна* 3, черезъ $^1/_2$ часа по 3 капли до уменьшенія болей.—б) При головной боли, появляющейся рано по утрамъ во лбу и надъ глазами, при чемъ обнаруживается боль въ глазныхъ яблокахъ: *Хіонантесъ виргиника* ×3, 3 раза въ день по 3 капли.—в) При односторонней, пульсирующей, давящей, рвущей боли то въ томъ, то въ другомъ вискѣ, во лбу и глазахъ, которая распространяется оттуда на темя, при чувствѣ какъ бы появленія узловъ въ кожѣ, покрывающей черепъ, при боли преимущественно по утрамъ и вечерамъ, которая уменьшается отъ покоя и сна, въ особенности у женщинъ: *Фосфоръ* 6 и *Актеа* 3, по 3 раза въ день по 3 капли. г) При боли, простирающейся отъ темени къ носу и продолжающейся 12—14 часовъ сряду: *Игна-*

ція 3, 4 раза въ день по 3 капли. д) При боли въ затылкѣ и во лбу, преимущественно съ правой стороны, или при сверлящей, давящей боли, начинающейся отъ шеи и плечъ и простирающейся на лобъ и затылокъ, при чемъ наблюдается ухудшеніе отъ движенія, шума и свѣта, лицо блѣдно и даже появляется иногда тошнота и рвота, весьма часто помогаетъ *Глоноинъ*×3, 5 капель на рюмку воды и пить по глотку черезъ 5 минутъ.—е) При головной боли, появляющейся толчками въ видѣ внезапныхъ приступовъ: *Валеріана* 6.—ж) При головной боли преимущественно надъ глазами, постепенно усиливающейся и такимъ же образомъ исчезающей, при чемъ она бываетъ всего сильнѣе по утрамъ и сопровождается рвотою: *Белладонна* 3 и *Феландріумъ* 3, черезъ 1 часъ по 3 капли. з) Кромѣ того, при нервной головной боли очень полезны: *Коффеа* 2, *Нуксъ вомика* 3 и *Сепія* 6.

6) При головныхъ болѣхъ, вслѣдствіе ушиба, паденія и т. д.: *Арника* 3.

7) При головной боли, вслѣдствіе геморроя: *Нуксъ вомика* 3.

8) При длительныхъ головныхъ болѣхъ съ образованіемъ узловатыхъ опухолей на головѣ: *Сангвинарія* 3 и *Кали іодатумъ*×2, по 5 капель по 3 раза въ день.

Головокруженіе.

Головокруженіе бываетъ вслѣдствіе различныхъ причинъ, и если повторяется часто, то лучше всего обратиться за совѣтомъ къ врачу.

Лѣченіе: 1) Полнокровнымъ—*Белладонна* 3 и *Нуксъ вомика* 3.—2) Малокровнымъ—*Хина* 3 и *Сепіа* 6, а также очень полезно принимать нѣсколько недѣль подъ рядъ капли *Гензелевскаго желѣза*, по 10 капель утромъ и вечеромъ въ 1/2 рюмкѣ сахарной воды.—3) Послѣ ушиба, паденія и т. п. *Арника* 3, черезъ 2 часа по 3 капли.—4) Если головокруженіе является слѣдствіемъ половыхъ возбужденій—*Нуксъ вомика* 3, каждые 2 часа по 3 капли.—5) При повертываніи головы

въ ту или другую сторону—*Коніумъ* 3.—6) При ходьбѣ—*Фосфоръ* 3.—7) Сопряженное съ ревматическими болями—*Спигелія* 3.—8) Какъ послѣдствіе злоупотребленія спиртными напитками и кофе—*Фосфоръ* 3 и *Нуксъ вомика* 3, попеременно.—9) Утромъ и вечеромъ, а также послѣ ѣды, съ приливами крови и давящими головными болями—*Фосфоръ* 3 и *Белладонна* 3, попеременно.—10) Припадки головокруженія у страдающихъ порокомъ сердца—*Фосфоръ* 3, утромъ и вечеромъ по 3 капли.

Голоса потеря.

Встрѣчается чаще всего у пѣвцовъ, учителей, священниковъ и происходитъ отъ переутомленія голоса.

Лѣченіе: *Арника* 6 и *Фосфоръ* 6, принимать попеременно каждые 2 часа по 3 капли или 5 крупинокъ. Также хорошо давать *противъ охриплости Румексъ*×3 и *Арумъ Трифиллумъ* 3, въ такой же дозѣ и такихъ же промежуткахъ. Полоскать горло растворомъ 20 капель *Гамамелисъ экстракта* на 1/2 стакана воды.

Голосовой щели судорога.

Болѣзнь встрѣчается у дѣтей отъ 6-ти до 18—20 мѣсяцевъ.

Причины: Испугъ, крикъ, душевныя волненія. Рахитъ.

Признаки: Страданіе это появляется отдѣльными приступами: свистящее, хрипящее дыханіе и недостатокъ воздуха отъ сжиманія въ горлѣ; лицо синѣетъ и глаза вытаращиваются. Черезъ минуту припадокъ кончается, больной опять дышетъ свободно и голосъ становится громкимъ и чистымъ.

Вспомогательныя мѣры: Какъ только наступитъ припадокъ, нужно вспрыснуть лицо холодною водою и разстегнуть бѣлье и платье. Положить больного на бокъ, чтобы голова была наклонена напередъ. При продолжительныхъ

припадкахъ положить на горло смоченную горячею водою губку.

Діэта. Молоко, яйца всмятку, бульонъ, овощи. Токайское вино. Свѣжій воздухъ.

Лѣченіе: 1) Главныя средства—*Ипекакуана* 3 и *Арсеникъ* 6, черезъ 1/4 часа по 5 капель въ ложечкѣ воды. 2) Такъ же полезны *Игнація* 6 и *Спонгія* 3, поперемѣнно черезъ 1/4 часа по 5 капель—3) Если послѣ припадка наступаетъ рвота, то давать *Купрумъ ацетикумъ* 3, черезъ 1/4 часа по 5 капель, или *Тартарусъ эметикусъ* 6, по 2 капли.

Горла воспаленіе.

Болѣзни глотки это—катарръ зѣва и воспаленіе миндалевидныхъ железъ (ангина).

Причины: Простуда, преимущественно отъ промоченія тѣла и ногъ.

Признаки: Лихорадка, головная боль, сухость, колотье въ горлѣ, болѣзненное, затрудненное глотаніе; обложенный языкъ, отсутствіе аппетита, слюнотеченіе; проглатываніе пищи и питья болѣзненно; увеличеніе миндалевидныхъ железъ, удлиненіе языка.

Лѣченіе: Положить немедленно согрѣвающій компрессъ на горло. Если уже образовалось нагноеніе въ миндалевидныхъ железахъ, то прикладывать къ части шеи, соотвѣтствующей положенію миндалинъ, теплыя припарки изъ льняного сѣмени или отрубей. Вдыханіе теплыхъ паровъ молока. Полосканіе горла растворомъ чайной ложечки *Фитолакка* 1 на стаканъ воды. Если происходитъ замедленіе въ отдѣленіи гноя изъ нарыва, образовавшагося на миндалинахъ, то этотъ послѣдній долженъ быть вскрытъ врачемъ. Чтобы воспрепятствовать возвратамъ болѣзни, слѣдуетъ ежедневно обмывать шею холодною водою и полоскать себѣ горло; вмѣстѣ съ тѣмъ принимать утромъ и вечеромъ *Белладонна* 3, по 5 капель на пріемъ.

Внутрь: 1) Сначала *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Фитолакка* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—2) При образованіи *налета*: *Меркуръ ціанатъ* 6 и *Фитолакка*×3, усиленно полоскать *Фитолакка*×1, 30 кап. на стаканъ воды; при *нагноеніи*: *Гепаръ сульфурисъ* 6, а потомъ *Силицея* 6.—3) Если вмѣстѣ съ уменьшеніемъ лихорадочныхъ явленій остается хроническое опуханіе и отвердѣніе миндалевидныхъ железъ: *Калькареа карбоника* 6 или *Калькареа іодата*×6, ежедневно по 2 пріема по 5 капель.

Гортани воспаленіе или ларингитъ.

Острый и хроническій катарръ гортани.

Причины: Простуда, вдыханіе пыли, ѣдкихъ газовъ, употребленіе холодныхъ напитковъ въ разгоряченномъ состояніи, громкій крикъ, продолжительное пѣніе и т. п.; затѣмъ корь, скарлатина, оспа, тифъ, сифилисъ, бугорчатка легкихъ (чахотка).

Признаки: Сухость и щекотаніе въ гортани, кашель, хрипота, грубость голоса, беззвучность, а иногда потеря; боль въ гортани, одышка, отдѣленіе слизи; у дѣтей припадки удушья (ложный крупъ).

Лѣченіе: Согрѣвающіе компрессы на горло; чистый, средней теплоты воздухъ; вдыханіе теплаго пара, теплое молоко съ сахаромъ; воздержаніе отъ всякихъ острыхъ, раздражающихъ, возбуждающихъ и горячительныхъ явствъ и напитковъ. Воспрещается: пѣть, говорить громко, курить табакъ, употреблять холодные напитки. Для предупрежденія возвратовъ: холодныя обмыванія всего тѣла, а преимущественно ногъ, съ послѣдовательнымъ растираніемъ; ношеніе теплой одежды; вдыханіе однопроцентнаго раствора соли въ водѣ.

Внутрь: 1) При сухомъ, щекочущемъ, судорожномъ кашлѣ: *Белладонна* 3, 4 раза въ день по 3 капли.—2) При царапающемъ горло, хрипломъ, грубомъ кашлѣ: *Спонгія* 3 и *Бріонія* 3, черезъ два часа по 5 капель.—3) При хрипломъ

кашлѣ съ хрипотою или потерею голоса: *Румексъ*×3, 4 раза въ день по 5 капель.—4) При чувствѣ изъязвленія въ гортани и сухомъ, потрясающемъ кашлѣ: *Меркуріусъ іодатусъ* 6, черезъ 2 часа по 5 капель.—5) Когда кашель станетъ влажнымъ, слизистымъ: *Гепаръ сульфурисъ* 3 и *Пульсатилла* 3.—6) При мучительномъ, щекочущемъ кашлѣ, который не даетъ покоя ни днемъ, ни ночью: *Гіосціамусъ*×3 и *Фосфоръ* 3.—7) При крупозномъ кашлѣ или ложномъ крупѣ у дѣтей: *Аконитъ* 3, попеременно со *Спонгіей* 3 или *Іодіумъ* 3, черезъ каждые 10 минутъ по 1—2 капли или 5 крупинокъ, а когда станетъ лучше, то рѣже.—8) При длительномъ воспаленіи гортани (катаррѣ) употреблять въ теченіе продолжительнаго времени *Эмскую воду пополамъ съ теплымъ молокомъ* или съ *яблочнымъ отваромъ*. Вдыханіе паровъ. Внутреннія средства: *Гепаръ* 30, *Аргентумъ нитрикумъ* 30, *Кали карбоникумъ* 30, *Калькареа іодата* 30, *Фосфоръ* 30, *Силицеа* 30,—каждое изъ нихъ порознь въ теченіе 7—10 дней, утромъ и вечеромъ по 2 капли или по 5 крупинокъ.

Горячка бѣлая (Delirium tremens).

Болѣзнь развивается у привычныхъ пьяницъ, пьющихъ долго и много.

Признаки: Больной неспокоенъ, бредитъ, страдаетъ безсонницей, галлюцинаціями, ему кажутся видѣнія; безпокойство, страхъ и боязнь не позволяютъ оставаться въ постели; въ движеніяхъ, разговорѣ и поступкахъ замѣчается ненормальность общаго состоянія; глаза блестятъ; кожа покрыта клейкимъ потомъ.

Въ виду буйства больныхъ, ихъ слѣдуетъ отправлять въ лѣчебныя заведенія.

Вспомогательныя мѣры: ежедневно теплыя ванны; при приливахъ холодныя примочки на голову. Діэта: мясной бульонъ, молоко, кашки и плоды. Постоянный надзоръ, изоляція.

Лѣченіе: 1) Безпокойство, красное лицо и полный пульсъ—*Белладонна* 3 и *Игнація*×3, поперемѣнно, или *Дигиталисъ* 2, *Страмоніумъ* 3 и *Тартарусъ эметикусъ* 3, черезъ 1 часъ поочередно по 5 капель или 5 крупинокъ. 2) Блѣдное лицо и слабый пульсъ—*Арсеникъ* 3 и *Нуксъ вомика* 3, черезъ 1 часъ по 5 капель.

Грудной железы воспаленіе.

Причины: Застой молока; болѣзнь эта нерѣдко появляется у женщинъ послѣ отнятія ребенка отъ груди или у родильницъ, которыя не хотятъ сами кормить своихъ дѣтей грудью; затѣмъ—внѣшнія поврежденія, ушибы, тѣсная одежда, простуда, испугъ и другія душевныя потрясенія; наконецъ, особенное предрасположеніе (напр., при золотухѣ).

Признаки: Заболѣвшая грудь представляется напряженной, красной, опухшей и горячей; появляются жестокія боли, распространяющіяся въ подмышку, а также жаръ, лихорадка, общее раздраженіе, а иногда головная боль и запоры; образуется нарывъ, который вскрывается, выдѣляя много гноя, нерѣдко смѣшаннаго съ молокомъ. Часто воспаленіе переходитъ съ одного мѣста на другое, или нарывы вскрываются въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Въ такомъ случаѣ въ груди образуются свищевые ходы, которые заживаютъ очень трудно. Остающіяся въ груди затвердѣнія не опасны. Если же у женщинъ зрѣлаго возраста (между 40—50 годами) появляются въ груди узлы, въ которыхъ ощущается сильное колотье, то можно опасаться образованія рака грудной железы и поэтому слѣдуетъ немедленно обратиться къ помощи врача.

Вспомогательныя мѣры: Какъ только у родильницы образуются въ грудной железѣ узлы или затвердѣнія, то нужно стараться ихъ разбить или раздробить посредствомъ осторожнаго разминанія пальцами или растиранія по направленію къ грудному соску; затѣмъ втирать въ грудь рыбій жиръ. Для уменьшенія болей натираютъ грудь *арниковымъ масломъ* и накладываютъ на нее свѣжую вату. Грудь под-

вязываютъ повязкой изъ мягкой шерстяной матеріи или такого же платка; въ то же время укрѣпляютъ плечо сбоку такъ, чтобы оно оставалось въ спокойномъ положеніи. Скопившееся молоко слѣдуетъ почаще отцѣживать машинкой для отсасыванія молока. Если появится нагноеніе, то надо дѣлать припарки изъ льняного сѣмени. Не слѣдуетъ кормить ребенка больною грудью, такъ какъ это раздражаетъ больную и вызываетъ у ребенка разстройство пищеваренія.

Лѣченіе: 1) Въ началѣ рожистаго воспаленія: *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Бріоніей* 3, каждые 1½ часа по 3 капли.—2) При начинающемся нарывѣ, когда при этомъ появляются бьющія, дергающія боли и количество отдѣляемаго молока уменьшается: *Фосфоръ* 6.—3) При замедленіи вскрытія нарыва: *Гепаръ* 3, черезъ 2 часа по ложечкѣ.—4) При наступившемъ нагноеніи: *Гепаръ сульфурисъ* 6, а потомъ *Силицея* 6, черезъ 2 часа по 3 капли.—5) Если воспаленіе произошло вслѣдствіе ушиба или удара, то *Коніумъ* 3, 4 раза въ день по 3 капли.—6) При образованіи узловатостей въ груди—*Калькареа карбоника* 6 и *Коніумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель, и прикладывать *мазь* изъ *Коніумъ* или втираніе таковой въ образовавшіеся узлы раза 2—3 въ день. Также *Карбо анималисъ* 6 и *Фосфоръ* 6.

Грудныхъ сосковъ воспаленіе.

Происходитъ у кормящихъ женщинъ очень часто отъ нечистоплотнаго содержанія грудей, раздраженія одеждой, поврежденія деснами ребенка и пр., и представляется въ видѣ трещинъ или язвочекъ на соскахъ, при чемъ бываютъ сильныя боли, когда ребенокъ сосетъ.

Для предупрежденія этой болѣзни нужно еще во время беременности обмывать грудные соски холодной водой или водкой. Молодыя женщины или тѣ, у которыхъ соски короткіе или втянувшіеся, должны вытягивать ихъ помощью рожка и, вытянувши, обмотать мягкой шерстью. Обмываніе сосковъ *растворомъ буры* или *отваромъ крѣп-*

каго чая дѣлаетъ соски болѣе твердыми, а обмываніе *растворомъ Календулы* устраняетъ чувствительность кожи и предупреждаетъ образованіе ссадинъ.

Вспомогательныя мѣры: Смазывать грудные соски мазью *Календула* нѣсколько разъ въ день, обмывать ихъ передъ каждымъ смазываніемъ, а также передъ кормленіемъ ребенка. Прикладывать ребенка къ больной груди не иначе, какъ защищая ее резиновою накладкою, и не болѣе 2-хъ или 3-хъ разъ въ день; если же язвочка велика, то не слѣдуетъ вовсе кормить до полнаго заживленія.

Лѣченіе: *Калькареа карбоника* 6, *Графитъ* 6, *Сульфуръ* 6, каждое порознь, если не поможетъ одно, переходить къ другому, а послѣ къ третьему, три раза въ день по 5 капель или по 5 крупинокъ.

Грыжа.

Грыжи встрѣчаются какъ у дѣтей, такъ и у взрослыхъ. У маленькихъ онѣ большею частью проходятъ сами собою. Нужно носить такъ хорошо пригнанные грыжевые бандажи, чтобы ихъ трудно было сдвинуть съ мѣста. При появленіи грыжи, что легко можетъ произойти отъ тяжелой ноши, отъ подниманія тяжестей, при тяжелой работѣ, сильномъ кашлѣ, крикѣ, жиленіи и т. д., грыжу слѣдуетъ немедленно вправить. Для этого кладутъ больного на постель такъ, чтобы ягодицы его были приподняты подложенною подъ нихъ подушкою, и затѣмъ посредствомъ осторожнаго нажиманія, разминанія и вдавливанія опухоли стараются протолкнуть ее обратно въ брюшную полость чрезъ грыжевое отверстіе. Если этого не удается достигнуть самому, то нужно обратиться къ помощи врача. Вправленіе грыжи происходитъ гораздо легче, если до этого наложить на опухоль теплые, влажные компрессы и больной приметъ *Аконитъ* 3 попеременно съ *Нуксъ вомика* 3 или *Коккулюсъ* 3.— Грыжа становится опасною лишь тогда, когда произойдетъ ея ущемленіе. Признаки ущемленія слѣдующіе: въ опухоли ощущается сильная, жгучая боль; кожа надъ нею

краснѣетъ и отекаетъ; появляется тошнота, рвота, страхъ и холодный потъ. Нужно послать немедленно за врачемъ, накладывать на опухоль очень теплую сухую припарку изъ завернутой въ полотенце согрѣтой муки и отрубей, поставить больному клистиръ изъ тепловатой воды. Пульверизація грыжи снаружи эфиромъ унимаетъ боль.

Лѣченіе; *Белладонна* 3, поперемѣнно черезъ ¼ часа съ *Нуксъ вомика* 2 или *Опіумъ* 3. Если грыжевая опухоль становится багровою или темносѣрою, то *Ляхезисъ* 6 или *Арсеникъ* 3, поперемѣнно съ *Нуксъ вомика*×3, черезъ ½ часа по 3 капли.

Для излѣченія грыжи, нужно постоянно носить грыжевой бандажъ и смазывать опухоль три раза въ день свѣжимъ *Арниковымъ* масломъ.

Полезны также слѣдующія средства: *Русъ* 3 и *Коккулюсъ* 3, въ рѣдкихъ пріемахъ. При мошоночной грыжѣ, т.-е., когда паховая грыжа опускается въ полость мошонки: *Нуксъ вомика* 3, *Калькарея карбоника* 6.—При врожденной мошоночной грыжѣ у дѣтей: *Магнезія муріатика* 6.—При водянкѣ яичка; *Аписъ* 3, *Графитъ* 6, *Калиіодатумъ* 2, по 5 капель раза 2 въ день.

Грыжа пупочная у дѣтей.

Грыжевой бандажъ и внутрь: *Нуксъ вомика* 6 и *Русъ* 3, по 2 раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ, принимать мѣсяца 2—3.

Дизентерія, кровавый натужной поносъ.

Сущность этой болѣзни, эпидемической и заразительной, дифтеритическое пораженіе слизистой оболочки толстой кишки. Чаще всего поражаетъ дѣтей.

Причины: Простуда, зараженіе, разстройство желудка незрѣлыми плодами, несоотвѣтствующею діэтою, кислымъ пивомъ и т. п.

Признаки: Лихорадочное состояніе, слабость, иногда рвота желчью. Сильные, болѣзненные, съ натугой позывы къ испражненію, при чемъ отходятъ слизистыя или кровянистыя массы. Боли преимущественно въ лѣвой сторонѣ живота и, несмотря на частые позывы и жиленіе, отдѣленія довольно скудныя. Иногда частые позывы къ мочеотдѣленію.

Предохранительныя мѣры: Эта болѣзнь очень заразительна, поэтому всѣ сосуды, отхожее мѣсто и проч. нужно тщательно дезинфецировать растворомъ марганцово-кислаго кали. Если болѣзнь господствуетъ въ извѣстномъ мѣстѣ, то полезно носить на животѣ шерстяную или фланелевую повязку, остерегаться простуды и соблюдать строгую діэту. Воду для питья употреблять хорошо прокипяченную и къ ней прибавлять красное вино. Какъ только покажется разстройство желудка, тотчасъ же принять соотвѣтствующія мѣры.

Лѣченіе: На животъ прикладывать согрѣтыя полотенца или фланелевые платки или бутылки съ горячею водою, завернутые во что-нибудь мягкое. Ѣсть можно давать: овсянку, саго, куриный бульонъ, всего понемногу. Пить рисовую воду, а лучше распустить 1 яичный бѣлокъ въ стаканѣ холодной прокипяченной воды, процѣдить, положить кусокъ сахара и ½—1 чайную ложку коньяку: такой напитокъ питательный и здоровый. Послѣ каждаго испражненія обтирать болѣзненный и раздраженный задній проходъ губкою, смоченною въ теплой водѣ съ Календулой и затѣмъ вставлять *свѣчку, приготовленную изъ Гамамелисъ* (можно получать въ гомеопатической аптекѣ). Очень полезны бываютъ теплыя ванны, но принимать ихъ можно только по назначенію врача. Полезно начинать лѣченіе ложкою касторoваго масла для очищенія кишекъ.

Внутрь: 1) При лихорадочномъ состояніи, обложенномъ языкѣ и слизистыхъ испражненіяхъ—*Аконитъ* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 1-2 часа по 5 капель. 2) При кровавыхъ выдѣленіяхъ съ большою натугою и жиленіемъ—*Меркуріусъ коррозивусъ* 6 и *Нуксъ вомика* 3, черезъ 1-2 часа по 5 капелъ. 3) Когда испражненія непроизвольныя, водянистыя, съ сильнымъ запахомъ—*Арсеникъ* 3, черезъ 1-2 часа. Когда поносъ и боли прекратятся, то давать дня

два *Гепаръ Сульфурисъ* 3, утромъ и вечеромъ по костяной ложечкѣ. Для возстановленія силъ, а также если болѣзнь запущена, давать *Ацидумъ фосфорикумъ* 3 поперемѣнно съ *Арсеникъ* 3, черезъ 2-3 часа по 5 капель.

Дифтеритъ.

Заразное пораженіе зѣва, миндалевидныхъ железъ, гортани, преимущественно у дѣтей.

Причины: Зараженіе дифтеритными бациллами.

Признаки: Дифтеритъ появляется иногда внезапно, но въ большинствѣ случаевъ ему предшествуютъ предвѣстники. Дитя становится безпокойнымъ, по утрамъ жалуется на усталость, разбитость, ознобъ, жаръ, головную боль, на затрудненіе при движеніи шеи и на затрудненное глотаніе, боли при разговорѣ, хрипоту, жаръ въ зѣвѣ. Иногда появляются тошнота и рвота, безсонница, и безпокойный сонъ. Шейныя железы начинаютъ опухать; опухоль эта часто развивается лишь съ одной стороны и нерѣдко бываетъ едва замѣтною. Языкъ густо обложенъ, а аппетитъ потерянъ. Лицо становится одутловатымъ, глаза влажными и нѣсколько покраснѣвшими. Изъ носа появляется течь или онъ бываетъ заложенъ. Всѣ описанныя здѣсь явленія наблюдаются не постоянно; нѣкоторые изъ признаковъ могутъ отсутствовать, а въ иныхъ случаяхъ они бываютъ симптомами простого, неопаснаго воспаленія горла. Вѣрнѣйшимъ же признакомъ дифтерита является *сѣровато-бѣлый налетъ*, въ видѣ пленки, образующійся на распухшихъ миндалевидныхъ железахъ, язычкѣ или на дужкахъ въ зѣвѣ. Части эти становятся вмѣстѣ съ тѣмъ темнокрасными. Поэтому при каждомъ заболѣваніи горла слѣдуетъ тщательно осмотрѣть зѣвъ и всю полость рта. Съ этою цѣлью заставляютъ ребенка выговаривать протяжно букву „*э*“, такъ какъ при этомъ языкъ опускается и изслѣдованіе горла становится болѣе удобнымъ. Нажавъ тогда корень языка ложечкой, осмотрѣть всѣ части горла, при чемъ если окажутся бѣловатыя точки или болѣе значи-

тельныя пленки на воспаленныхъ миндалинахъ, на языкѣ, либо на слизистой оболочкѣ зѣва, то нужно немедленно приступить къ лѣченію. Дифтеритъ бываетъ не только у дѣтей, но и у взрослыхъ.

Предохранительныя мѣры: При появленіи дифтерита въ домѣ, слѣдуетъ удалить изъ него всѣхъ дѣтей. Ни въ какомъ случаѣ они не должны входить въ комнату больного. Взрослые не должны спать въ одной комнатѣ съ заболѣвшимъ. Не слѣдуетъ никогда цѣловать больныхъ въ губы и вообще слишкомъ приближаться къ нимъ, когда они дышатъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ надо полоскать ротъ и горло растворомъ *Фитолакка* Θ, 1 чайную ложку на стаканъ воды.

Діэта: Молоко, яйца всмятку, яблочный мусъ или компотъ, виноградъ. При слабости давать по временамъ ложечку токайскаго вина. Противъ жажды—чистая вода съ *Аконитомъ* 3, 20 капель на стаканъ. Пища не должна быть горячею. Болѣе взрослыя дѣти должны полоскать горло указаннымъ выше средствомъ.

Лѣченіе: Самымъ важнымъ средствомъ является *Меркуріусъ ціанатусъ* 6, давать поперемѣнно съ *Белладонна* 3, черезъ $^1/_2$ часа по 5 капель. Горло полоскать возможно чаще растворомъ *Фитолакка* Θ, 1 чайную ложку на стаканъ воды; а при невозможности или неумѣніи ребенка полоскать горло давать пить *Фитолакка*×3, 30 капель на стаканъ. Если это не оказываетъ скорой помощи, то *Меркуріусъ коррозивусъ* 6. При опухоли железъ: *Меркурій іодатъ* и *Аписъ* 3, поперемѣнно, черезъ 1-2 часа по 2 капли. При злокачественной формѣ: *Ацидумъ нитрикумъ* 3 и *Арсеникумъ іодатумъ* 6, поперемѣнно съ *Меркуріусъ ціанатусъ* 6. При дифтеритѣ гортани: *Аммоніумъ броматумъ* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ ціанатусъ* 6; *Бромъ* 2 (свѣжій водный) дѣйствуетъ лучше, чѣмъ *Аммоніумъ броматумъ*. При кровотеченіи изъ носа: давать *Натрумъ нитрикумъ* 3, въ промежуткахъ между пріемами указанныхъ средствъ. При гнойномъ истеченіи изъ носа: *Кали бихромикумъ* 3. При угрожающемъ параличѣ сердца, *Кали гидроціаникумъ* 3, какъ промежуточное средство. При возникшемъ, вслѣдствіе дифтерита, параличѣ зрительныхъ органовъ: *Калабаръ* 3.—При пара-

личѣ глоточныхъ мышцъ: *Каустикумъ* 3.—Во всѣхъ иныхъ случаяхъ дифтеритнаго паралича: *Фосфоръ* 3, *Русъ* 3, *Гельземинумъ* 3. Лѣкарства въ этихъ случаяхъ давать черезъ 2 часа по 3 капли или 5 крупинокъ.

Душевныя волненія.

Съ цѣлью удаленія дурныхъ послѣдствій, происшедшихъ вслѣдствіе душевныхъ волненій, назначаются: 1) При разстройствахъ отъ испуга: *Опій* 3, *Аконитъ* 3, а позднѣе *Самбукусъ* 3.—2) При разстройствахъ вслѣдствіе горя, печали, тоски: *Игнація* 3, *Ацидумъ фосфорикумъ* 3.—3) Вслѣдствіе гнѣва, досады: *Камомилла* 3, *Бріонія* 3.—4) Вслѣдствіе ярости, гнѣва: *Нуксъ вомика* 3, *Камомилла* 3.—5) При раздражительности: *Коффеа* 3.—6) Вслѣдствіе чрезмѣрной радости: *Коффеа* 3, *Опій* 3. Во всѣхъ случаяхъ давать лѣкарства по 2-3 капли въ ложечкѣ воды, черезъ $^1/_2$ часа.

Железъ опухоли.

Опухоли лимфатическихъ железъ часто наблюдаются у золотушныхъ и бываютъ нерѣдко соединены съ гноетеченіемъ изъ уха, съ накожными болѣзнями, паршами и т. д.

Лѣченіе: Не ѣсть ничего остраго, раздражающаго и возбуждающаго (какъ перецъ, горчица, копченое мясо, ветчина, колбаса и всякія пряности) и не пить водки и пива. Также вредно все мучное и картофель; употреблять мясо и растительную и молочную пищу. Ежедневныя обтиранія тѣла холодною водою, а лѣтомъ ежедневныя купанія въ рѣкѣ очень полезны.

Внутрь давать: 1) При опухоли железъ у золотушныхъ: *Сульфуръ* 6, *Калькареа іодата* 6, *Ликоподіумъ* 6, при-

нимать каждое порознь черезъ довольно длинные промежутки времени, утромъ и вечеромъ по 1 пріему.—2) При воспаленіи железъ: *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ биіодатусъ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли.—3) При злокачественныхъ опухоляхъ железъ: *Арсеникумъ іодатумъ* 6, 3 раза въ день по 3 капли.—3) При отвердѣніи железъ, *Барита карбоника* 6 и *Аписъ* 3, по 2 раза въ день.—5) При воспаленіи и опухоли околоушныхъ железъ: *Кали бихромикумъ* 6 и *Аписъ* 3, поперемѣнно черезъ 2-3 часа по 5 капель, и смазывать опухшія мѣста *Аписнымъ масломъ*.—6) При затвердѣніи железъ: вслѣдствіе удара, ушиба, поврежденія и т. п., *Коніумъ* 6, 3-4 раза въ день по 5 капель.—7) При опухоли паховыхъ железъ: *Меркуріусъ солюбилисъ*×3 или *Гепаръ сульфурисъ* 3, черезъ 2 часа по костяной ложкѣ, а если затвердѣніе перешло въ нагноеніе, то *Меркуріусъ солюбилисъ*×3 и *Белладонна* 3, каждые 2 часа, и снаружи припарки.—8) При раковидномъ затвердѣніи женскихъ грудей (обратиться немедленно къ врачу): *Коніумъ* 6, *Гидрастисъ* 3, по 2 раза въ день, и смазываніе мазью изъ *Коніумъ*.

Железъ миндалевидныхъ воспаленіе. Ангина.

Весьма распространенная болѣзнь горла вслѣдствіе простуды.

Признаки: Лихорадка. Боль при глотаніи. Миндалевидныя железы опухши и воспалены, покрыты слизью или бѣлыми пятнышками. Воспаленіе можетъ пройти такъ или перейти въ нагноеніе. Иногда опухаетъ и язычекъ.

Вспомогательныя мѣры: Полосканіе горла растворомъ *Фитолакка*×1, 30 капель на стаканъ. Согрѣвающій компрессъ. Втираніе въ шею теплаго *Аписнаго масла*. Вдыханіе водяныхъ паровъ.

Лѣченіе: 1) Вначалѣ болѣзни *Фитолакка*×3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 5 капель 2) Если черезъ 3—4

часа не лучше, то давать *Белладонну* 3 и *Меркурій ціанатъ* 6, попеременно, черезъ 1—2 часа по 5 капель. 3) При нагноеніи или нарывѣ—*Гепаръ сульфурисъ* 3. Въ хроническихъ случаяхъ *Сульфуръ* 6 и *Калькареа іодата* 6, черезъ день, утромъ и вечеромъ. При затвердѣніи опухшихъ железъ *Калькареа карбоника* 6 или *Калькареа фосфорика* 6.

Желтуха катарральная.

Причины: Болѣзнь развивается при различныхъ тяжелыхъ пораженіяхъ печени; послѣ горячечныхъ болѣзней, какъ напр., тифъ, родильная горячка и т. д.; простуды; обремененія желудка; ее вызываетъ также сильный гнѣвъ; беременность. Кромѣ того, желтуха развивается на почвѣ заболѣванія 12-типерстной кишки.

Признаки: Желтизна кожи. Темнобурая моча, которая окрашиваетъ бѣлье въ зеленый цвѣтъ. Свѣтло-окрашенныя, почти бѣлыя испражненія. Разстройства пищеваренія. Головная боль. Раздражительность. Болѣзненность печени при надавливаніи. Болѣзнь длится 2—8 недѣль.

Діэта: молоко, яйца всмятку или сырыя, яблочный компотъ или мармеладъ, легкіе супы, нѣжное бѣлое мясо.

Лѣченіе: 1) При лихорадкѣ *Аконитъ* 3 попеременно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 2 часа.—2) При желтухѣ вслѣдствіе гнѣва: *Бріонія* 3, *Камомила* 3.—3) При длительной желтухѣ: *Берберисъ* 3, *Подофиллумъ*×3, черезъ 2 часа по 3 капли, или *Хелидоніумъ*×3.—4) Также совѣтуютъ еще: *Іодіумъ* 1—6, 10 капель котораго влить въ ½ стакана воды и принимать по глотку черезъ 4 часа, переходя отъ низшаго до болѣе высокаго дѣленія этого средства.—5) При осложненіи желтухи хроническимъ катарромъ тонкихъ кишекъ, когда запоры смѣняются поносами и появляется значительное скопленіе вѣтровъ, а также при при частыхъ возвратахъ желтухи: *Берберисъ* 2, четыре раза въ день по 3 капли.

Желтуха у новорожденныхъ. — 1) При темныхъ каловыхъ испражненіяхъ, свѣтлой мочѣ: *Аконитъ* 3.—2) При слизистыхъ испражненіяхъ, которыя представляются какъ-бы

рубленными: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, *Камомилла* 3.—3) Въ упорныхъ случаяхъ: *Ляхезисъ* 6 и *Подофиллумъ* 3, каждые 2 часа по 2 капли, попеременно.

Желчные камни, желчная колика.

Образованіе въ желчномъ пузырѣ камней величиною отъ песчинки до куринаго яйца. Колика отъ желчныхъ камней наступаетъ большею частью внезапно. Больные ощущаютъ вначалѣ тупую, затѣмъ острую, буравящую или колющую судорожную боль въ правомъ подреберіи (печени), откуда она распространяется на весь животъ, а иногда въ правую половину груди до плеча, въ спину, лопатки и даже въ правую руку. При нѣкоторыхъ приступахъ боль становится невыносимою и вызываетъ судороги и обморокъ. Животъ чрезвычайно чувствителенъ къ давленію. Больные корчатся и мучатся въ кровати или на полу, тѣло ихъ покрывается холоднымъ потомъ. При этомъ пульсъ малъ, замедленъ или ускоренъ и нерѣдко бываютъ потрясающіе ознобы и даже упорная рвота. Къ концу приступа часто появляется желтуха. По истеченіи нѣсколькихъ часовъ, а иногда и дней, приступъ оканчивается прекращеніемъ болей, послѣ чего, въ промежуткахъ между отдѣльными приступами, нѣкоторые больные чувствуютъ себя совершенно здоровыми, а другіе страдаютъ желтухою, увеличеніемъ печени, разстройствами желудка и живота и т. п. Если по окончаніи приступа разбавить испражненія водой и пропустить черезъ сито, то можно очень часто найти въ немъ одинъ или нѣсколько желчныхъ камней.

Лѣченіе: Съ цѣлью удаленія желчныхъ камней, нужно принять при пустомъ желудкѣ 6—8 унц. (нѣсколько сотъ граммовъ) *оливковаго масла*. Черезъ 20—30 минутъ послѣ этого слѣдуетъ лечь на лѣвый бокъ такимъ образомъ, чтобы бедра были выше плечей. Обыкновенно это вызываетъ испражненіе, при которомъ отходятъ камни. Каждое утро на тощакъ выпивать стаканчикъ воды *Мюльбруннена*. Во время приступа желчной колики: *горячіе компрессы* на область печени или *продолжительная горячая ванна* (30° R.

и даже больше), и вмѣстѣ съ тѣмъ давать *Калькареа карбоника* 30, чрезъ каждыя 5 минутъ по 2 капли. Кромѣ того совѣтуютъ: *Белладонна* 1 или *Атропинумъ сульфурикумъ* 3 въ частыхъ пріемахъ (черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часл по 3 капли) до прекращенія болей, и при этомъ нѣсколько глотковъ горячей воды. Для полнаго излѣченія принимать одну недѣлю *Подофиллумъ*×3 и *Литіумъ карбоникумъ*×2, по 2 раза въ день, другую недѣлю *Хелидоніумъ* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6; а также умѣстно лѣченіе въ Карлсбадѣ по указанію врача.

Желудка воспаленіе. Желудка острый катарръ.

Воспаленіе слизистой оболочки желудка, вслѣдствіе попаданія какого-нибудь остраго, ѣдкаго вещества, употребленія пищи жирной, кислой или сладкой и попорченныхъ съѣстныхъ припасовъ, питья спиртныхъ напитковъ. Также вслѣдствіе простуды, промачиванія ногъ или всего тѣла питья холодныхъ (со льдомъ) напитковъ въ жаркое время года или при разгоряченномъ тѣлѣ.

Признаки: Тошнота, горькій вкусъ, головная боль. Усиленная жажда. Непріятный запахъ изо рта. Отрыжка. Запоръ и темная моча. Лихорадочное состояніе. Одновременное воспаленіе кишекъ выражается кромѣ того зловонными болѣзненными поносами.

Лѣченіе: Какъ главное средство—*Аконитъ* 3, 20 капель на стаканъ воды и выпивать въ теченіе дня, со слѣдующими наиболѣе подходящими средствами. Если причиною болѣзни: 1) холодные плоды или мороженое,—то *Арсеникъ* 6 и *Карбо вегетабилисъ* 3, по 3 капли или по костяной ложечкѣ, поперемѣнно, черезъ 2 часа.—2) Жирное мясо, пироги и т. п.—*Пульсатилла* 3 и *Ипекакуана* 3.—3) Обремененіе желудка пищею—*Нуксъ вомика* 3, *Антимоніумъ крудумъ* 6;—напитками: *Нуксъ-вомика* 3, *Бріонія* 3, *Арсеникъ* 6.—4. Простуда разгоряченнаго потнаго тѣла—*Бріонія* 3 и *Пульсатилла* 3.—5) При избыткѣ желудочныхъ кислотъ (кислая отрыжка)—

Никсъ вомика 3 и *Карбо вегетабилисъ* 3 или *Магнезія фосфорика* 6 и *Сульфуръ* 6.—6) При жаждѣ, тѣсненіи и чувствѣ полноты подъ ложечкой, ухудшеніи послѣ ѣды, пученіи желудка, твердомъ желудкѣ, тѣсненіи въ груди въ особенности послѣ ѣды—*Ляхезисъ* 6.—7) При тупой боли, запорѣ, кислой отрыжкѣ—*Гидрастисъ канадензисъ* 6 и *Румексъ криспусъ* 6.—8) При поносѣ—*Вератрумъ* 6.

Желудка хроническій катарръ.

Причины: Развивается послѣ остраго катарра, если послѣдній былъ запущенъ, а также при болѣзняхъ легкихъ и сердца. Злоупотребленіе спиртными напитками и сильными лѣкарственными средствами.

Признаки: Давящая боль подъ ложечкой. Ухудшеніе послѣ ѣды и отъ надавливанія. Острыя, кислыя, жирныя кушанья не перевариваются. Улучшеніе наступаетъ послѣ отрыжки. Аппетитъ къ острымъ и пряным кушаньямъ, къ питательной пищѣ отвращеніе. Запоръ. Если же при этомъ и катарръ кишекъ, то таковой обнаруживается особенно утренними поносами. Цвѣтъ лица сѣровато-желтый. Исхуданіе.

Діэта и режимъ: Молочная діэта, въ особенности полезно пить свѣжую сыворотку. Молочные супы. Мучнистая пища, овсянка, ячменный отваръ. Всего трудноваримаго избѣгать. Всякую пищу хорошо разжевывать и смѣшивать со слюною. Послѣ ѣды $^1/_2$—1 часовой отдыхъ. Хорошее вино (Рейнвейнъ, Бургундское) и понемногу полезно. Ежедневныя прогулки, при чемъ вдыхать воздухъ полною грудью (глубокими вдыханіями). Теплыя ванны. Обтираніе области желудка и живота полотенцами, намоченными въ холодной водѣ и хорошо выжатыми. На ночь согрѣвающій компрессъ на весь животъ. Теплая одежда. При поносахъ—шерстяной бинтъ на животъ. Массажъ.

Запрещаются: Кофе, пиво, водки и ликеры, невыпеченный черный хлѣбъ, острые сыры, картофель, салаты, бобы, капуста и все жирное и пряное.

Лѣченіе: Начать съ *Натрумъ муріатикумъ* 6, по 3 раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ, поперемѣнно съ *Нуксъ вомика* 6 или съ *Антимоніумъ крудумъ* 6, а затѣмъ перейти къ *Магнезія муріатика* 6. Кромѣ того, бываютъ полезны: *Сульфуръ* 6, *Арсеникъ* 6, *Фосфоръ* 6. При хорошемъ дѣйствіи одного средства, не слѣдуетъ пробовать другія, а остановиться на немъ и принимать тогда болѣе высокое дѣленіе (12—30).

Желудка воспаленіе у дѣтей.

Причины: Недоброкачественное молоко: Частое кормленіе грудью (раньше чѣмъ черезъ каждые 2 часа). Неопрятное содержаніе рожка и соска. Трудноваримая пища, какъ, напр., мучная кашка и т. п. Простуда.

Признаки болѣзни: Животикъ вздутъ. Рвота створоженнымъ молокомъ. Если воспаленіе желудка сопровождается воспаленіемъ кишекъ, то таковое выражается слѣдующими признаками: зеленоватые, зловонные съ кислымъ запахомъ поносы, съ сильною болью, отъ которой ребенокъ корчитъ ножки. Сильное исхуданіе.

Лѣченіе: Строгая діэта. Давать ячменный отваръ, рисовый или салепный отваръ, съ прибавленіемъ небольшого количества хорошаго, чистаго молочнаго сахара. Согрѣвающій компрессъ на животъ. При сильной жаждѣ давать по немногу раствора *Аконита* 3,—5 капель въ $^1/_2$ стаканѣ отварной воды. Запрещается давать: сахарную воду и фруктовые соки или варенье съ водой.

Внутреннее лѣченіе: 1) При рвотѣ молокомъ—*Ипекакуана* 3 поперемѣнно съ *Арсеникумъ* 6, черезъ $^1/_2$ часа по 5 крупинокъ до улучшенія, а затѣмъ черезъ 2—3 часа.—2) При слабости, блѣдномъ лицѣ и холодѣніи рукъ и ногъ—*Вератрумъ* 3 (давать такъ же).—3) При слизистомъ поносѣ—*Пульсатилла* 3.—4) При обильномъ поносѣ съ болями и зеленоватаго цвѣта—*Камомилла* 3 поперемѣнно съ *Натрумъ фосфорикумъ*×6 или съ *Магнезія фосфорика*×6.—5) При воспаленіи желудка и кишекъ, когда испражненія

кровавыя и отходятъ клочковатые кусочки слизистой оболочки кишекъ—*Аргентумъ нитрикумъ* 3, черезъ 1—2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ. Дѣтямъ, вскармливаемымъ на рожкѣ, можно иногда помочь только замѣною искусственнаго кормленія материнскимъ молокомъ, такъ какъ дѣятельность желудка при болѣзни настолько ослабляется, что онъ не переваритъ другой пищи.

Желудка несвареніе.

При испорченномъ желудкѣ, когда есть тошнота, обложенный языкъ, непріятный вкусъ во рту, а иногда и рвота, лучше всего 2—3 дня не употреблять твердой пищи, а только пить слизистые напитки. Послѣ переполненія желудка сытнымъ обѣдомъ или ужиномъ полезно выпить чашку чернаго кофе.

Лѣченіе: При несвареніи желудка: 1) Отъ жирной пищи—*Пульсатилла* 3, *Ипекакуана* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 6, поперемѣнно черезъ 2 часа по 5 капель; въ длительныхъ случахъ *Пульсатилла* 3 и *Арсеникъ* 6.—2) Отъ спиртныхъ напитковъ—*Нуксъ вомика* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 6.—3) Отъ кислой ѣды и питья—*Арсеникъ* 6 и *Аконитъ* 3.—4) Отъ фруктовъ—*Пульсатилла* 3 и *Хина* 3.—5) Отъ мороженаго и холодныхъ напитковъ—*Арсеникъ* 6 и *Пульсатилла* 3.—6) Отъ молока—*Нуксъ вомика* 3, *Бріонія* 3 и *Калькареакарбоника* 6.—7) Отъ кофе—*Нуксъ вомика* 3 и *Камомилла* 3.—8) Отъ табаку—*Нуксъ вомика* 3 и *Кокулюсъ* 3.—9) Давленіе въ желудкѣ, жженіе подъ ложечкой и судорожныя боли—*Антимоніумъ крудумъ* 6 (принятое тотчасъ послѣ сытнаго обѣда или ужина устраняетъ обыкновенно дурныя послѣдствія).—10) Рвота водою, кислая отрыжка, жженіе и язвины во рту—*Ацидумъ сульфурикумъ* 3. Если засореніе желудка у дѣтей отъ сладостей, пирожнаго и т. п., то давать *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Ипекакуана* 3, по 2 капли или 5 крупинокъ черезъ 2 часа.

Желудка язва, круглая.

Причины: Является преимущественно слѣдствіемъ употребленія слишкомъ горячихъ напитковъ или кушаній.

Признаки: Рвота, при чемъ пищевыя изверженія содержатъ частички крови. Кровавая рвота. Выдѣленіе черной дегтеобразной крови въ испражненіяхъ. Тупая или жгучая боль подъ ложечкой, облегчаемая послѣ рвоты. Боль между лопатками. Блѣдность лица. Обмороки. Запоры. Спазмы желудочные. Исхуданіе.

Діэта: Жидкая, легкая пища, небольшими порціями. Молоко небольшими количествами (давать ложками). Сырыя яйца или бѣлокъ, размѣшанный водою (1 бѣлокъ на стаканъ воды). Когда желудокъ становится менѣе раздражительнымъ, то можно давать понемногу мясного бульона, дичи, рыбы и овощей. Тяжелыхъ кушаній избѣгать. Хорошо прожевывать и смачивать пищу слюной. При кровотеченіяхъ: глотать кусочки льда и дѣлать холодныя примочки на желудокъ. Горизонтальное положеніе тѣла. Покой. При обморокахъ вспрыскивать лицо холодною водою. Тепло держать руки и ноги.

Лѣченіе: 1) *Фосфоръ* 30, черезъ 2—3 дня по 1 пріему.—2) При боляхъ—*Арсеникъ* 6.—3) При малокровіи давать въ промежуткахъ *облатки* изъ *телячьей крови*, по 1 облаткѣ 3 раза въ день, и *Калькарея фосфорика* 6, три раза въ день по 3 капли.—6) При спазмахъ—*Секале корнутумъ* 2, *Бисмутумъ нитрикумъ* 6, *Атропинумъ сульфурикумъ* 6.—7) При кровотеченіяхъ—*Гамамелисъ* 2, *Ипекакуана* 2, поперемѣнно, черезъ 1—2 часа по 2 капли въ чайной ложечкѣ отварной воды.

Желудка судороги, боли въ желудкѣ.

Причины: Тяжелая, трудноваримая пища. Употребленіе слишкомъ холодныхъ или горячихъ кушаній и напитковъ. Простуда при потномъ тѣлѣ. Запоры. Страданія матки. Истерія. Волненія, особливо досада. Малокровіе.

Признаки: Острыя, стягивающія, жгучія, давящія боли подъ ложечкой, продолжающіяся отъ ½ часа до 2 часовъ и затѣмъ прекращающіяся. Легкое дотрогиваніе до этого мѣста вызываетъ ухудшеніе, сильный нажимъ рукою—улучшеніе.

Діэта: Вредны: кофе, жирныя и пучащія кушанья, раздражающія водки, крѣпкій чай. Пища должна быть легкая, удобоваримая.

Лѣченіе: Для нервныхъ и малокровныхъ субъектовъ рекомендуется водолѣченіе. Холодныя обтиранія всего тѣла по утрамъ. Согрѣвающіе компрессы. Если судороги являются слѣдствіемъ простуды, то полезно принимать теплыя и паровыя ванны.

Внутрь: 1) Для раздражительныхъ женщинъ—*Нуксъ вомика* 3 и *Коккулюсъ* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—2) *Отъ нравственныхъ волненій — Камомилла* 3, *Игнація* 6, *Колоцинтисъ* 3.—3) Отъ засоренія желудка—*Нуксъ вомика* 3, *Бріонія* 3, *Пульсатилла* 3.—4) Отъ простуды—*Бріонія* 3, *Колоцинтисъ* 3.—5) Если судороги сопровождаются усиленнымъ слюноотдѣленіемъ во рту—*Бисмутумъ нитрикумъ* 2 и *Натрумъ фосфорикумъ* 3, черезъ ½—1 часъ по костяной ложечкѣ.—6) При геморроѣ—*Нуксъ вомика* 3, *Сульфуръ* 3, *Белладонна* 3.—7) При малокровіи—*Пульсатилла* 3, *Сепія* 6 и кромѣ того облатки изъ свѣжей телячьей крови, 3 облатки въ день.—8) При ракѣ—*Коніумъ* 6 и *Арсеникъ* 6, попеременно по 2 раза въ день.—9) При язвѣ желудка—*Атропинъ* 3, *Бисмутумъ нитрикумъ* 2, *Нуксъ вомика* 3.

Живота боль, колика.

Причины: Простуда; тяжелая, трудноваримая или разлагающаяся пища, употребленіе бродящихъ напитковъ и незрѣлыхъ плодовъ; отравленіе и т. д.

Признаки: Припадки жестокихъ болей въ животѣ, преимущественно въ области пупка; при давленіи на животъ боли уменьшаются; блѣдность лица.

Лѣченіе: Уложить больного въ постель; горячія припарки на животъ или прикладываніе къ животу нагрѣтыхъ полотенецъ, салфетокъ и т. п. Пища должна состоять изъ ячменнаго супа, овсянки, отвара саго, желудоваго кофе и, какъ питье, употреблять лишь рисовую воду или воду съ яичнымъ бѣлкомъ. 1) Если колика произошла вслѣдствіе простуды, то принимать черезъ каждые 1/2 часа по нѣсколько капель *Камомилла* 1 съ *Колоцинтъ* 3, черезъ 2 часа по 3 капли въ ложечкѣ горячей воды.—2) Послѣ переполненія желудка, *Нуксъ вомика* 3, *Бріонія* 3.—3) При скопленіи кала въ кишкахъ: *клистиры, Нуксъ-вомика* 30 и *Ликоподіумъ* 30.—4) При тошнотѣ и наклонности къ рвотѣ: *Ипекакуана* 3.—5) При коликѣ со скопленіемъ газовъ въ животѣ: *Карбо вегетабилисъ* 6 и *Пульсатилла* 3.—6) Послѣ гнѣва: *Камомилла* 3, *Бріонія* 3.—7) При судорожной коликѣ: *Колоцинтисъ* 3, *Камомилла* 3, *Діоскорея* 3.—8) У дѣтей, при припадкахъ боли живота, сопровождаемыхъ проходящей блѣдностью лица, вялостью, сонливостью, обмороками и т. п.: *Нуксъ мосхата* 30, а въ другихъ случаяхъ *Камомилла* 3, *Колоцинтисъ* 6, *Беладонна* 6. Лѣкарства давать при сильныхъ коликахъ черезъ 1/4—1/2 часа, а когда боли станутъ уменьшаться, то рѣже, черезъ 2—3 часа.

Заднепроходной кишки воспаленіе.

Причины: Простуда, механическія поврежденія—ушибъ, ударъ. При язвахъ въ прямой кишкѣ, геморроѣ и отъ скопленія каловыхъ массъ.

Признаки: Колющія или давящія боли въ заднемъ проходѣ. Запоръ и натужныя испражненія. Опухоль переходитъ въ нагноеніе при сильныхъ пульсирующихъ боляхъ.

Лѣченіе: Холодныя примочки изъ чистой воды. Какъ только покажется гной, тотчасъ льняныя припарки. При запорѣ дать на ночь 1 пріемъ *Нуксъ вомика* 3, 5 капель.

Внутрь давать: 1) Если нѣтъ еще образованія гноя—*Атропинумъ сульфурикумъ* 3, черезъ 2 часа.—2) Когда покажется гной—*Гепаръ сульфурисъ*×3, черезъ 2 часа по

ложечкѣ.—3) Въ случаяхъ продолжительныхъ, затяжныхъ—*Меркуріусъ солюбилисъ* 3, каждые 2 часа, а потомъ *Сульфуръ* 6 или *Силицеа* 6, по 2 раза въ день по 2—3 капли, въ продолженіе 2 недѣль.—4) Когда образовалась фистула кишки, то таковая лѣчится продолжительными пріемами внутрь *Силицеа* 6 и *Сульфуръ* 6, черезъ день каждое лѣкарство, утромъ и вечеромъ по 3 капли въ ложечкѣ воды.—5) Если замѣтны выдѣленія желчи, то въ добавленіе къ другимъ средствамъ назначаютъ еще *Берберисъ* 3.

Запахъ изо рта.

Полоскать ротъ послѣ каждой ѣды растворомъ Хинолина, который можно получить въ Аптекѣ О-ва Врачей Гомеопатовъ. Полезно съ этою же цѣлью употреблять и *Лактицинъ*.

Лѣченіе: Если запахъ является слѣдствіемъ разстройства желудка и притомъ: 1) по утрамъ,—*Нуксъ вомика* 3, давать утромъ и вечеромъ по 3 капли или по 5 крупинокъ; 2) утромъ и вечеромъ со слизью во рту,—*Пульсатилла* 3;—3) послѣ обѣда — *Камомилла* 3;—4) при продолжительныхъ желудочныхъ разстройствахъ—*Карбо вегетабилисъ* 3, *Сульфуръ* 3, *Арсеникъ* 3.—Если запахъ является слѣдствіемъ испорченныхъ зубовъ, то необходимо чистить зубы порошкомъ изъ *Стафизагріи* съ молочнымъ сахаромъ, мягкою щеточкою, и полоскать ротъ утромъ и вечеромъ зубнымъ эликсиромъ.—Если запахъ идетъ изъ легкихъ, то давать *Калькареа карбоника* 3, *Креозотъ* 3, *Натрумъ муріатикумъ* 6, поочередно, одну недѣлю одно, другую—другое, третью—третье, по 3 пріема въ день.

Запой. Пьянство.

Чтобы вызвать у страдающаго запоемъ отвращеніе къ водкѣ, нужно таковую прибавлять въ его пищу и ко всякому его напитку. Другой пищи давать не слѣдуетъ и че-

резъ недѣлю или двѣ обыкновенно пьяница перестаетъ пить. Хорошо также прибавлять въ водку 3—4 раза въ день по 20 капель *Тартарусъ эметикусъ* × 2. Затѣмъ уже, когда больной почувствуетъ въ себѣ волю отказаться отъ своего порока, необходимо давать ему въ теченіе нѣсколькихъ недѣль *Нуксъ вомика* 3 и *Арсеникъ* 8, по 2 раза въ день по 5 капель.

Діэта: Никакихъ острыхъ и возбуждающихъ веществъ, а лучше всего молочная діэта.

Запоръ. Хроническій катаръ кишекъ.

Избѣгать всѣхъ сильныхъ слабительныхъ, такъ какъ они въ концѣ концовъ ухудшаютъ болѣзнь и дѣйствуютъ разрушительно на кишечникъ. Если необходимо опорожнить кишки, то самое лучшее поставить клизму съ мыльной водой и масломъ или съ глицериномъ. При продолжительныхъ запорахъ нужно обязательно соблюдать діэту. Пища должна быть легкая: плоды, овощи и всякія молочныя блюда очень полезны, а также растительная пища. Вредно: жирное мясо, пирожныя и пироги, жирные и соленые соусы, крутыя яйца, водки, пиво, вино, кофе и т. п. Полезно выпивать натощакъ 1—2 стакана холодной воды и послѣ этого гулять полчаса; верховая ѣзда, гимнастика, гуляніе по горамъ и комнатная гимнастика; массажъ живота, т.-е., растираніе, поглаживаніе, подавливаніе рукою, при лежаніи на спинѣ, очень хорошо дѣйствуетъ на урегулированіе желудка. Холодныя обмыванія по утрамъ, въ особенности нижней части живота, очень полезны. Позыва къ испражненію не слѣдуетъ задерживать ни на одну минуту. Желудокъ долженъ быть пріучаемъ работать регулярно, самое лучшее по утрамъ въ одинъ и тотъ же часъ, и нужно добиваться этого постепенно и настойчиво.

Лѣченіе: 1) При отсутствіи аппетита, при тяжести въ животѣ, безсонницѣ, приливахъ крови въ головѣ—*Нуксъ вомика* 6, утромъ и вечеромъ по 5 капель или 5 крупинокъ.—2) При упорныхъ и продолжительныхъ запорахъ—

Плюмбумъ 6 и *Опіумъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель: давать недѣлю, потомъ недѣлю ничего не принимать, и если желудокъ урегулировался, то и не повторять пріемовъ лѣкарствъ; въ противномъ случаѣ опять повторить 1—2 раза въ такомъ же порядкѣ.—3) При геморроѣ, сердитомъ настроеніи духа—*Сульфуръ* 3.—4) При частомъ потѣніи днемъ и недѣятельности кишекъ, въ упорныхъ случаяхъ — *Натрумъ муріатикумъ* 6, утромъ и вечеромъ по 5 капель.—5) При ночномъ потѣніи, вздутіи живота отъ сильнаго развитія газовъ и отхожденіи вѣтровъ—*Кали карбоникумъ* 6, по 2 пріема въ день по 5 капель.—6) Когда языкъ обложенъ, желудокъ испорченъ и животъ вздутъ—*Бріонія* 3, раза 3 въ день по 5 капель.—7) Когда запоры сопровождаются болѣзнью печени и коликою отъ желчныхъ камней, то давать *Подофиллинъ* 1, по 2 костяныхъ ложечки черезъ 2 часа, до дѣйствія.—8) При геморроѣ съ пученіемъ живота отъ накопленія газовъ—*Коллинзонія* 1 и *Гидрастисъ*×3, черезъ 2 часа поперемѣнно по 5 капель или 5 крупинокъ. Болѣе радикальное средство—*Ликоподіумъ* 6, утромъ и вечеромъ по 5 капель.—9) При запорахъ у беременныхъ—*Бріонія* 3, *Сепія* 3 и *Нуксъ вомика* 6.—10) При сильномъ образованіи кислотъ—*Натрумъ муріатикумъ* 6 и *Натрумъ фосфорикумъ* 6, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 3 капли.—11) При позывахъ на низъ съ выпаденіемъ кишки—*Рута* 3 и *Нуксъ вомика* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 3 капли.—12) При съуженіи кишечника—*Туя* 3, утромъ и вечеромъ по 5 капель.—13) При гнойныхъ выдѣленіяхъ изъ кишечника—*Арника* 1 и *Хина* 1, черезъ 2 часа по 5 капель.

Запоры у дѣтей: — 1 Когда испражненія тягучія, свѣтлыя, бѣловатыя и какъ бы покрытыя жиромъ—*Каустикумъ* 3 и *Нуксъ вомика* 3, по 2 капли черезъ 2 часа.—2) При твердыхъ, глинистыхъ испражненіяхъ—*Алюмина* 3, три раза въ день по 2 капли.—3) При вздутіи живота и боли въ кишкахъ—*Нуксъ вомика* 6 и *Ликоподіумъ* 6, черезъ 4 часа по 2 капли.

Зобъ.

Избѣгать всякихъ мышечныхъ напряженій и не носить на головѣ никакихъ тяжестей. Слѣдуетъ производить частыя глубокія вдыханія.—Изъ наружныхъ средствъ можно рекомендовать *мазь* изъ *Коніумъ*, которую втирать въ зобъ утромъ и вечеромъ, или *мазь* изъ *Спонгіи*, которую употребляютъ такимъ же образомъ. Принимать утромъ и вечеромъ по костяной ложечкѣ (совочку) *порошка отъ зоба* или *Спонгія* 1, утромъ и вечеромъ, а *Іодіумъ*×3, два раза въ день по 3 капли. Рекомендуется также *Калькареа карбоника* 6, утромъ и вечеромъ по 5 капель, въ теченіе 8 дней, послѣ чего сдѣлать продолжительный перерывъ для послѣдовательнаго дѣйствія лѣкарства и опять принимать его въ томъ же порядкѣ.

Золотуха.

Золотуха есть общее разстройство питанія, которое характеризуется наклонностью къ воспаленію различныхъ органовъ, при чемъ всегда воспаляются сосѣднія лимфатическія железы. Золотуха стоитъ въ большой связи съ бугорчаткой; чаще всего она встрѣчается у дѣтей чахоточныхъ родителей. Предрасполагающими моментами служатъ также сифилисъ, различныя другія хроническія болѣзни и дурныя гигіеническія условія.

Признаки: Дѣти, подверженныя этой болѣзни, большею частью страдаютъ мокнущими сыпями, которыя потомъ засыхаютъ и образуютъ корки и струпья. Носъ и верхняя губа опухаютъ, глаза воспаляются, появляются жидкія или густыя гнойныя истеченія изъ носа и ушей; на шеѣ и затылкѣ прощупываются опухшія железы, которыя большею частью переходятъ въ нагноеніе и образуютъ болѣзненные нарывы. Бываютъ также слѣдствіемъ золотухи костоѣда, воспаленіе спиннаго хребта и воспаленіе бедренныхъ суставовъ и др.

Вспомогательныя мѣры: Должно прежде всего обратить вниманіе на пищу. Маленькихъ дѣтей кормить хорошимъ, здоровымъ материнскимъ или коровьимъ молокомъ. Дѣтямъ старшаго возраста *не давать:* чернаго хлѣба, картофеля, сыра, жирныхъ кушаній, свѣжаго горячаго бѣлаго хлѣба, а только черствый. *Можно давать:* молоко, фрукты, овощи во всѣхъ видахъ, яйца всмятку, мясной супъ, цыплята, индѣйку, телятину и молодую баранину. Свѣжій, чистый воздухъ въ комнатахъ и въ особенности въ спальнѣ необходимъ. Какъ можно больше движенія на воздухѣ. Золотушныхъ дѣтей не слѣдуетъ отдавать слишкомъ рано въ школы, а равно не обременять уроками. Ежедневное купанье или обмываніе тѣла очень полезно, при чемъ въ ванну прибавлять обыкновенную или морскую соль (1 фунтъ на ванну). Давать слабымъ и худощавымъ дѣтямъ рыбій жиръ (неочищенный), утромъ и вечеромъ по чайной ложкѣ въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ: особенно хорошо давать его въ зимнее время. Лѣтомъ полезно давать желудовый кофе и утромъ и вечеромъ по стакану яблочной сыворотки.

Лѣченіе: Слабымъ золотушнымъ дѣтямъ съ нѣжною кожею давать *Калькареа карбоника* 6, *Фосфоръ* 3 и *Натрумъ муріатикумъ* 6, въ слѣдующемъ порядкѣ: двѣ недѣли *Калькареа карбоника* 6, 3 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ; затѣмъ одну недѣлю ничего не принимать; потомъ двѣ недѣли *Фосфоръ* 3; опять недѣлю пропустить и давать *Натрумъ муріатикумъ* 6 двѣ недѣли; затѣмъ опять начать съ *Калькареа карбоника* и продолжать принимать эти три средства въ такомъ порядкѣ отъ 6—10 мѣсяцевъ.— 2) Дѣтямъ, страдающимъ золотушными сыпями и опуханіемъ железъ.—*Сульфуръ* 3, *Меркуріусъ іодатусъ* 3 и *Силицеа* 6, въ такомъ же порядкѣ какъ указано выше.—3) При мокнущихъ сыпяхъ — *Калькареа карбоника* 30 и *Сульфуръ* 30, каждое черезъ день, поперемѣнно, утромъ и вечеромъ по 3 капли или 5 крупинокъ, въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.—4) При затвердѣвшихъ железахъ: *Барита карбоника* 6 *Калькареа іодата* 6 и *Іодіумъ* 3.—5) Если железы часто нагнаиваются и образуются нарывы, то давать мѣсяца 2—3

Гепаръ сульфурисъ 6, черезъ день поперемѣнно съ *Силицеа* 6, по 2 раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.—6) При страданіяхъ костей давать продолжительное время *Фосфоръ* 6 и *Калькареа фосфорика* 3, черезъ день поперемѣнно, по 2 раза въ день по 2 капли и по костяной ложечкѣ.

Зубы и ихъ сохраненіе.

Для предохраненія зубовъ отъ порчи употребляется зубной спиртъ д-ра Брукнера *(Лактицинъ)*. Берутъ 20 капель на рюмочку воды для прополаскиванія зубовъ или нѣсколько капель на зубную щеточку, протираютъ зубы и прополаскиваютъ ротъ тепловатой водою. Это средство предохраняетъ также зубы отъ костоѣды.

Внутрь принимать *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Стафизагрія* 3, по 2 раза въ день по 5 капель, каждое поперемѣнно черезъ день.

Зубная боль.

Причины: Гніеніе зубовъ, воспаленіе надкостницы зубныхъ корней, обнаженіе зубныхъ нервовъ, скопленіе гноя въ зубной полости, беременность, золотуха, простуда, ревматизмъ и т. д.

Сохраненіе зубовъ: Для того, чтобы зубы были здоровы, не слѣдуетъ употреблять ни горячей, ни холодной пищи и питья (а только теплую); тщательно наблюдать за чистотою рта; прополаскивать ротъ послѣ каждой ѣды и удалять посредствомъ зубочистки (не металлической) остатки внѣдрившейся между зубами пищи и по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ день чистить зубы мягкою щеточкою. Изъ средствъ, употребляемыхъ для чистки зубовъ, можно рекомендовать *порошокъ изъ Стафизагріи*. Дурной запахъ изо рта отъ гніющихъ зубовъ всего лучше устраняется воднымъ *растворомъ марганцово кислаго калія*×1, 20 капель на стаканъ воды. Другимъ безвреднымъ средствомъ является *Лакти-*

цинъ. Для этой цѣли приготовляютъ растворъ для полосканія рта изъ 1 чайной ложки лактицина на стаканъ воды. Какъ только замѣчено будетъ, что какой-нибудь зубъ начинаетъ портиться, то слѣдуетъ немедленно обратиться къ зубному врачу, для того, чтобы онъ поступилъ съ нимъ по правиламъ зубного искусства, при чемъ имѣть въ виду, что посредствомъ пломбированія пустыхъ зубовъ можно избѣгнуть многихъ страданій. Если же зубъ началъ болѣть, то и въ этомъ случаѣ необходимо, чтобы зубной врачъ опредѣлилъ причину заболѣванія. Часто маленькая операція можетъ предохранить отъ сильнѣйшихъ страданій. Иногда она проходитъ отъ смазыванія *іодомъ* десны около больного зуба; въ другихъ случаяхъ помогаетъ теплая ванна. Что же касается до зубного нерва, то умертвить его можно поручить только спеціалисту. Гомеопатическія средства, если только они вѣрно выбраны, унимаютъ въ большинствѣ случаевъ зубную боль и устраняютъ ее на долгое время.

Лѣченіе: Наилучшими средствами, помогающими въ большинствѣ случаевъ, считаются *Синія ромашковыя капли*, которыя продаются въ гомеопатическихъ аптекахъ съ наставленіемъ, а также *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Камомилла* 3, или *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 3. Кромѣ того: 1) При приливахъ крови къ лицу, поперемѣнномъ ознобѣ и жарѣ, рвущихъ боляхъ послѣ простуды, когда улучшеніе является при покоѣ и теплѣ: *Аконитъ* 3, черезъ 1 часъ по 3 капли или 5 крупинокъ.—2) Нервныя боли; стучащія, колющія и жгучія; зубы какъ бы удлинены; боязнь и безпокойство; сильная жажда; сердцебіеніе; отъ лежанія на боку боль усиливается, а отъ тепла уменьшается; передъ регулами: *Арсеникъ* 3, принимать черезъ 1—2 часа по 3 капли или 5 крупинокъ.—3) Воспалительная боль; пульсирующіе, стучащіе приливы; рожистая опухоль лица; жженіе глазъ; улучшеніе отъ питья холодной воды; ухудшеніе отъ ѣды и разжевыванія зубами: *Белладонна* 3, черезъ часъ по 3 капли или 5 крупинокъ.—4) Ревматическая боль; судорожныя, колющія, надавливающія какъ бы привинчиваніемъ боли, перескакивающія къ головѣ и щекѣ; *Бріонія* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли.

Если боли сопровождаются лицевою болью, то давать *Аконитъ* 3 и *Бріонія* 3 поперемѣнно, черезъ 1—2 часа по 3 капли или 5 крупинокъ.—5) Ревматическая боль блуждающая, наступающая пароксизмами, иногда очень болѣзненными, особенно ночью; отъ тепла и холода хуже; плаксивость: *Камомилла* 3.—6) Ревматическая боль особенно при пустыхъ зубахъ; слюнотеченіе; десны опухшія и кровоточивыя; боли сверлящія; ухудшеніе ночью, а также отъ холода, свѣжаго воздуха, сквозняка, ѣды и питья; иногда опухоль щеки: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 и *Магнезія карбоника* 3.—7) Ревматическая зубная боль съ колотьемъ въ ушахъ; одностороннею головною болью; лицевою болью; отсутствіемъ жажды; у малокровныхъ дѣвушекъ и женщинъ; во время регулъ; ухудшеніе въ покоѣ, въ комнатѣ и постели; улучшеніе на воздухѣ, при втягиваніи холоднаго воздуха и сильномъ нажиманіи или надавливаніи больного мѣста: *Пульсатилла* 3 черезъ 1 часъ по 3 капли или 5 крупинокъ.—8) Ревматическая боль отъ промоченія вспотѣвшаго тѣла; зубы какъ бы расшатаны; улучшеніе отъ наружнаго согрѣванія: *Русъ* 3.—9) Десны болѣзненныя, опухшія, легко кровоточащія; боли съ колотьемъ въ ушахъ; особенно при гнилыхъ зубахъ; улучшеніе отъ тепла, а ухудшеніе отъ пищи и питья, попадающихъ въ дупло зуба: *Стафизагрія* 3.—10) Боль въ зубахъ сильная, тянущая, а также въ правой сторонѣ нижней челюсти, которая успокаивается временно при ѣдѣ: *Рододендронъ* 3.—11) Невыносимыя рвущія боли, въ особенности въ пустыхъ скуловыхъ зубахъ, распространяющіяся до висковъ; десны воспалены: *Креозотъ* × 2, по 1—2 капли на пріемъ черезъ $^1/_2$ часа.—12) При лицевой боли, когда поражено нѣсколько зубовъ, въ особенности съ лѣвой стороны: *Спигелія* 3.—13) Рвущія тянущія, колющія боли въ зубахъ, особенно если проникнетъ въ ротъ холодной воздухъ; сильныя подагрическія боли въ особенности съ правой стороны; улучшеніе ночью въ теплой постели: *Каустикумъ* 3.—14) Чисто нервная зубная боль, послѣ душевныхъ волненій, во время регулъ, въ періодъ развитія у молодыхъ дѣвушекъ, у истеричныхъ особъ: *Коффеа* 3, *Игнація* 3, *Нуксъ вомика* 3, *Платина* 6,

Спигелія 3.—15) При распухшихъ деснахъ, боли въ лицевыхъ костяхъ и зубныхъ опухоляхъ вообще: *Гепаръ сульфурисъ* 3.—16) Воспаленіе надкостницы зуба; зубъ кажется удлиненнымъ и при кусаніи болитъ: *Фосфоръ* 3.—17) Зубныя боли послѣ злоупотребленія ртутью: *Ацидумъ нитрикумъ* 3 и *Кали іодатумъ* 3, поперемѣнно черезъ 2 часа по 3 капли.—18) Наросты на деснахъ: *Ляхезисъ* 6 и *Туя* 3, по 3 раза въ день каждаго по 3 капли.—19) Зубныя боли при кормленіи грудью: *Хина* 3, *Калькареа карбоника* 6, *Нуксъ вомика* 3.—20) У истеричныхъ женщинъ; *Игнація* 6, *Сепія* 6, *Нуксъ мосхата* 6.—21) Послѣ зубныхъ операцій: *Арника* 3.—22) Во время беременности, при нервныхъ зубныхъ болях: *Спигелія* 6, *Пульсатилла* 6, *Игнація* 6, *Фосфоръ* 6; при приливахъ крови: *Белладонна* 3, *Хина* 3, *Сепія* 3. Во время періода беременности выдергиваніе зубовъ не рекомендуется. Необходимо слѣдить за правильною дѣятельностью желудка.

Высокаго, т.-е. 30-го, дѣленія лѣкарства часто дѣйствуютъ быстрѣе и лучше, нежели низкія дѣленія, т.-е., 3-го. Гдѣ показаны 2—3—4 средства, тамъ не слѣдуетъ быстро переходить отъ одного средства къ другому, а сдѣлать нѣсколько пріемовъ одного лѣкарства и, если не помогаетъ, то принимать слѣдующее, и т. д.

Зубовъ прорѣзываніе у дѣтей.

Во время прорѣзыванія зубовъ, т.-е., въ періодѣ жизни отъ 6 до 12 мѣсяцевъ, появляются часто у дѣтей различныя разстройства, какъ-то: лихорадка, поносъ, грудныя болѣзни, судороги, конвульсіи. Такъ какъ дѣти въ этомъ періодѣ чрезвычайно чувствительны, то слѣдуетъ наблюдать за малѣйшимъ ихъ недомоганіемъ. Если у нихъ появится въ это время умѣренный поносъ, то его не нужно останавливать. Во всякомъ случаѣ, полезно давать имъ въ теченіе этого періода по временамъ по 1 пріему *Калькареа фосфорика* × 6 или *Калькареа карбоника* × 6.

Лѣченіе: Лучшимъ средствомъ во время прорѣзыванія зубовъ бываетъ большею частью *Камомилла* 3, особенно если при этомъ есть нервная раздражительность, плаксивость (ребенокъ требуетъ, чтобы его постоянно носили на рукахъ); желто-зеленыя испражненія, какъ бы рубленными яйцами.—Кромѣ того бываютъ полезны:—1) *Аконитъ* 3 при лихорадочномъ безпокойствѣ и воспаленіи десенъ.—2) *Белладонна* 3—при приливахъ крови къ головѣ, краснотѣ лица, горячемъ затылкѣ, безсонницѣ, конвульсіяхъ.—2) *Коффеа* 3 при безсонницѣ, нервной раздражительности.—*Арсеникъ* 6 при сильномъ исхуданіи, слабости, водянистыхъ поносахъ, жаждѣ.—5) *Купрумъ ацетикумъ* 3 при судорогахъ; когда ребенокъ долго не приходитъ въ себя, стеклянные глаза, зарываетъ голову въ подушку; постоянная смѣна румянца и блѣдности лица.—6) *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 при поносѣ съ зеленоватыми испражненіями, а также при воспалительныхъ опухшихъ деснахъ.—7) *Сульфуръ* 6, одно изъ лучшихъ средствъ при запорѣ, одно или поперемѣнно съ *Нуксъ вомика* 3.

Зубной свищъ,

или фистула челюсти.

Свищъ этотъ происходитъ вслѣдствіе воспаленія и нагноенія надкостницы зубного корня. Образуется тогда отверстіе на наружной сторонѣ челюсти, надъ корнемъ больного зуба, и изъ этого отверстія выдѣляется гной. Въ такихъ случаяхъ зубъ или корень его долженъ быть удаленъ.

Лѣченіе: *Силицеа* 6 и *Калькареа карбоника* 6, по 2 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ и промывать растворомъ марганцово-кислаго кали × 1 (20 капель на стаканъ воды) или *Лактициномъ* (чайную ложку на стаканъ воды).

Зудъ или жженіе въ заднемъ проходѣ.

1) Вслѣдствіе геморроя: *Аконитъ* 3, *Сульфуръ* 6, *Нуксъ вомика* 3, по 2 раза въ день по 5 капель. При ощущеніи

жженія: *Арсеникъ* 3, *Карбо вегетабилисъ* 6, черезъ 2 часа по 5 капель. Кромѣ того полезно обмывать задній проходъ ватою, смоченною въ растворѣ тинктуры Теукріумъ (1 чайную ложку на стаканъ воды).—2) Вслѣдствіе свища (фистулы) въ заднемъ проходѣ: *Силицеа* 30 и *Сульфуръ* 6, черезъ день, утромъ и вечеромъ по 5 капель. Эти лѣкарства принимать мѣсяца 3—4 съ промежутками въ 8—14 дней.—3) Вслѣдствіе верховой ѣзды: *Арника* 3, 3 раза въ день по 5 капель.—4) Вслѣдствіе сидячей жизни или употребленія спиртныхъ напитковъ: *Нуксъ вомика* 3, 3 раза въ день по 5 капель.—5) При ощущеніи жара и краснотѣ въ заднемъ проходѣ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, черезъ 2 часа по 5 капель и вставлять свѣчи изъ Белладонны раза 2 въ день.—6) При судорожномъ сокращеніи или стягиваніи въ заднемъ проходѣ, натугахъ и тщетныхъ позывахъ къ испражненію: *Нуксъ вомика* 3 и *Бріонія* × 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—7) Вслѣдствіе глистовъ: когда глисты длинные и круглые, то *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 2—3 часа по 5 капель; если же мелкіе, въ особенности у дѣвочекъ, то *Игнація* 3 и *Сульфуръ* 6, каждые 2 часа поперемѣнно по 2—3 капли, и обмываніе задняго прохода и промежности губкою, смоченною растворомъ Теукріумъ (1 чайная ложка на стаканъ воды).

Зудъ кожи.

Причины: Недостаточно опрятное содержаніе кожи; ношеніе нечистой нижней одежды (бѣлья); разнаго рода сыпи и лишаи; старческій возрастъ; желтуха; женскія болѣзни.

Признаки: Кожные узелки; образованіе струпьевъ или корочекъ отъ разсчесыванія кожи; при уколѣ выступаетъ свѣтлая жидкость; появленіе зуда часто лишь при раздѣваніи, когда ложишься спать, или отъ теплоты. Иногда зудъ распространяется на все тѣло, а въ другихъ случаяхъ поражаетъ лишь отдѣльныя части,

Діэта: Воспрещаются всякія острыя пряности (перецъ, корица, горчица, каенна, уксусъ и т. п.), всякія жирныя кушанія, водка, вино, пиво; Пища должна состоять изъ легкихъ, не возбуждающихъ веществъ, при чемъ полезно пить сыворотку, лучше же всего исключительно молочная діэта. Частая перемѣна носильнаго и постельнаго бѣлья; прогулки на свѣжемъ воздухѣ.

Теплыя ванны по назначенію врача; обмываніе зудящихъ мѣстъ креозотной водой (1 : 1000); втираніе кокосоваго масла съ примѣсью *Арсеникъ* × 3 (10 капель на ложку масла).

Лѣченіе: 1) При зудѣ, соединенномъ съ ощущеніемъ колотья: *Ацидумъ карбоникумъ* 1, *Русъ* 3.—2) При жгучемъ зудѣ: *Арсеникъ* 3 и *Сульфуръ* 3, черезъ 2 часа попеременно.—3) При простомъ зудѣ: *Графитъ* 3 и *Сепія* 6.—4) При сильномъ зудѣ всего тѣла, ухудшеніи отъ холода и уменьшеніи зуда отъ тепла: *Румексъ криспусъ* 3.—5) При зудѣ, усиливающемся отъ расчесыванія: *Русъ* 3, *Сульфуръ* 3.—6) При зудѣ, исчезающемъ отъ расчесыванія: *Фосфоръ* 3, *Туя* 6.—7) При усиленіи зуда въ теплотѣ: *Сульфуръ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6. Когда хуже отъ холода: *Арсеникъ* 3, *Румексъ* 3.—8) При ночномъ зудѣ въ старческомъ возрастѣ: *Мезереумъ* 3, *Сульфуръ* 3.—9) При зудѣ, возвращающемся въ правильные промежутки времени: *Арсеникъ* 3, *Хининумъ сульфурикумъ* 3.—10) Кромѣ того бываютъ полезны: *Дулькамара* 3, *Уртика уренсъ* 3, *Аписъ* 3, *Ацидумъ нитрикумъ* 3. Лѣкарства давать черезъ 2 часа по 5 капель или по костяной ложечкѣ.

Изжога.

Одно изъ проявленій катарра желудка.

Причины: Жирная, трудноваримая пища. Пироги и пирожное. Горячій хлѣбъ. Куреніе. Во время беременности.

Признаки: Жирная, острая кислая отрыжка изъ желудка черезъ горло до самаго рта.

Лѣченіе: Утромъ натощакъ и вечеромъ передъ сномъ выпивать глотками по 1 стакану свѣжей холодной воды. Холодныя обтиранія всего тѣла. Хорошо пережевывать и смачивать слюною принимаемую пищу. *Избѣгать:* мучной пищи, всякаго жирнаго тѣста и вообще неудобоваримой пищи. Кто плохо переноситъ кофе съ молокомъ, тому слѣдуетъ пить чистое молоко или какао. 1) Самое лучшее во многихъ случаяхъ средство *Натрумъ муріатикумъ* 6.—2) При существованіи запора—*Нуксъ вомика* 6.—3) При желудочныхъ спазмахъ—*Фосфоръ* 6.—4) При раздражительности—*Камомилла* 3.—5) Если изжога тотчасъ послѣ ѣды—*Карбо вегетабилисъ* 6 попеременно съ *Хина* 3.—6) Отъ куренія—*Стафизагрія* 6 и *Белладонна* 3.—7) Отъ пьянства—*Арника* 3 (это средство, если его принимать нѣсколько времени, вызываетъ и отвращеніе къ водкѣ).—8) Изжога у беременныхъ—*Белладонна* 3.—9) Отъ жирной пищи, сала и т. п.—*Пульсатилла* 3.—10) Противъ упорной продолжительной изжоги—*Фосфоръ* 30, *Калькареа ацетика* 30 или *Арсеникъ* 30 и *Ацидумъ сульфурикумъ* 30—попеременно, по 2 раза по 5 капель или по 5 крупинокъ.

Иканіе.—Икота.

Заткнуть уши указательными пальцами и выпить нѣсколько глотковъ чистой холодной воды. Или взять немного толченаго сахара, смочить нѣсколькими каплями виннаго уксуса и принять. Также хорошо взять щепотку соли на языкъ и дать ей растаять на языкѣ. Если иканіе у грудного ребенка, то надо его хорошенько согрѣть и дать ложечку сахарной воды.

Лѣченіе: 1) Судорожное иканіе—*Магнезія фосфорика* 6 и *Ацидумъ сульфурикумъ* 2, по 20 капель на стаканъ воды и давать попеременно черезъ 1/4 часа по глотку.—2) Очень хорошее средство какъ для взрослыхъ, такъ и для дѣтей—*Игнація* 3, два-три пріема черезъ 1/4 часа, по 5 капель въ ложечкѣ воды (дѣтямъ грудным 1 каплю съ молокомъ).

Инфлюэнца или гриппъ.

Заразительная эпидемическая болѣзнь, выражающаяся катарромъ слизистыхъ оболочекъ носа, гортани, бронховъ глазъ, рѣже желудка и кишекъ, при чемъ бываетъ поражена и нервная система. При гриппѣ рѣзко бросается въ глаза несоотвѣтствіе между пораженіемъ слизистыхъ оболочекъ и сильною разбитостью больного, а также быстрота, съ которою развивается эта болѣзнь. Черезъ какія-нибудь сутки до того вполнѣ здоровый человѣкъ едва двигается, чувствуетъ общее недомоганіе, общія боли, разбитость, ноги его дрожатъ. Иной же разъ гриппъ распознается лишь по своему длительному теченію.

Признаки: Жаръ, насморкъ, головная боль; тянущія и рвущія боли въ членахъ (ломота); отсутствіе аппетита; чувство слабости и разбитости; иногда потъ; мучительный, потрясающій ознобъ; горькій вкусъ во рту, кашель, боль въ груди и колотье въ боку; общій катарръ дыхательныхъ путей, при чемъ желудокъ иногда слабый, иногда же бываютъ запоры. Состояніе и самочувствіе больного весьма измѣнчивы.

Гриппъ можно прервать и остановить его развитіе въ самомъ началѣ, если часто нюхать *Камфарный спиртъ* и принимать его по нѣсколько капель на кусочкѣ сахара, черезъ каждые $^1/_2$ часа. Вообще слѣдуетъ немедленно уложить больного въ постель и способствовать появленію пота посредствомъ горячаго питья изъ ромашки или липоваго цвѣта.

Лѣченіе: 1) Уложивъ больного въ постель, давать попеременно *Русъ*×3 и *Бріонія*×3, по 5 капель черезъ $1^1/_2$—2 часа. При сильной ломотѣ натирать болящія мѣста теплымъ *оподельдокомъ* изъ *Русъ* или *Бріоніи*. Если при этомъ является разстройство желудка, то давать попеременно *Баптизія* 1 *и Нуксъ вомика* 1, по 5 капель. При очень сильныхъ боляхъ,—сдѣлать питье изъ 30 капель *Белладона* 3 на стаканъ воды и пить глотками, черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа при вышеуказанныхъ лѣкарствахъ. При тошнотѣ, позывѣ къ рвотѣ, какъ промежуточное средство,—2—3 пріема *Ипека-*

куана 3. Если лихорадка отъ Баптизіи и Бріоніи не прекращается, то давать *Арсеникъ* 6 или *Хининумъ арсенико-зумъ*×3, черезъ 1—2 часа по 5 капель. Когда главные симптомы инфлюэнцы прошли и оказываются другія осложненія, то надо перейти къ соотвѣтствующему лѣченію.—2) При сухомъ кашлѣ преимущественно ночью: *Гіосціамусъ* 3, *Камомилла* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—3) При кашлѣ съ отдѣленіемъ густой мокроты, позывѣ на рвоту и рвотѣ: *Тартарусъ эметикусъ* 6 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, черезъ 1—2 часа.—4) При пораженіи горла, сухомъ изнурительномъ кашлѣ: *Гепаръ сульфурисъ* 3, по костяной ложечкѣ черезъ 2 часа.—5) При боли въ горлѣ, опуханіи железъ и краснотѣ: *Белладонна* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ 2 часа попеременно.—6) При значительномъ упадкѣ силъ, ревматическихъ болякъ въ членахъ, сухомъ языкѣ, явленіяхъ пораженія нервной системы: *Арсеникъ* 3 и *Русъ*×3, по 5 капель черезъ 1—2 часа.—7) При гриппѣ у блѣдныхъ, слабыхъ маленькихъ дѣтей, страдающихъ сильнымъ ослизненіемъ дыхательныхъ и пищеварительныхъ путей: *Хина* 1, три раза въ день по 2 капли на пріемъ, попеременно съ *Ацидумъ фосфорикумъ* 3.—8) При воспаленіи легкихъ: *Бріонія* 3 попеременно съ *Тартарусъ эметикусъ* 6, черезъ $1^1/_2$—2 часа или *Фосфоръ* 6.—Противъ послѣдовательныхъ страданій:—9) При чувствѣ разбитости, преимущественно въ ногахъ: *Авена сатива* Θ два раза въ день по 10 капель въ горячей водѣ.—10) Противъ оставшагося катарра слизистыхъ оболочекъ носа, гортани и бронхъ: *Сульфуръ ауратъ*×3 или *Тартарусъ эметикусъ* 6 попеременно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—11) При послѣдовательныхъ невралгіяхъ, особенно головныхъ болякъ: *Арсеникъ* 6, три раза въ день по 5 капель.

Испугъ.

1) Вначалѣ дать два—три пріема черезъ $^1/_2$ часа *Опіумъ* 6. Если прошло нѣсколько часовъ,—то *Самбукусъ* 1, 5 ка-

пель.—2) При сильномъ сердцебіеніи—*Аконитъ* 3.—3) При судорожномъ состояніи—*Игнація* 3 и *Белладонна* 6, черезъ ½ часа, а потомъ черезъ 2—3 часа по 5 капель поперемѣнно.

Истеченіе сѣмени. (Поллюціи).

Признаки: Непроизвольныя истеченія сѣмени, въ особенности ночью; слабость; усталость; головныя боли; сердцебіеніе; трясеніе рукъ; исхуданіе.

Вспомогательныя мѣры: Купанье или холодныя обтиранія; гимнастика. При запорахъ—клизмы изъ чистой воды. Избѣгать острой и мясной пищи, а также водки, вина, пива и кофе. Постель не должна быть мягкая, пуховая, и лучше всего набитая волосомъ. Покрываться на ночь легкимъ одѣяломъ или простыней и не спать на спинѣ. Для подкрѣпленія организма хорошо принимать 2—3 раза въ день передъ ѣдой *Гензелевскія капли.*

Лѣченіе: 1) При ночныхъ истеченіяхъ *Игнація*×3 и *Каннабисъ* 3, поперемѣнно, по 2 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ.—2) При истеченіи сѣмени днемъ: *Кантарисъ* 3 и *Гидрастисъ* 1,—4 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ.—3) Когда бываютъ при этомъ неспокойные, возбуждающіе сны, то давать на ночь по 1 пріему *Даміана* 3.

Исхуданіе.

Причины: Тяжкія заболѣванія (напр., легочная чахотка, ракъ желудка и т. д.), которыя въ такомъ случаѣ должны быть пользуемы врачемъ; недостаточное питаніе, переутомленіе, распутный образъ жизни, разстройства пищеваренія, сопровождающіяся поносами. При выборѣ средствъ слѣдуетъ поэтому принять въ соображеніе основное страданіе, вызвавшее исхуданіе.

Лѣченіе: Питательная, легко переваримая пища; за обѣдомъ рюмка вина; частыя обмыванія тѣла; свѣжій воздухъ; квартира, а въ особенности спальня, должны быть сухи,

просторны и хорошо вентилируемы (освѣжаться чистымъ воздухомъ).

Внутрь давать: 1) При зловонномъ поносѣ: 3 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ—*Арсеникъ* 12 или 30.—2) При слизистомъ, безболѣзненномъ поносѣ, съ урчаніемъ въ животѣ—*Ацидумъ фосфорикумъ* 3 и *Секале корнутумъ* 3, черезъ 2 часа по 3 капли поперемѣнно.—3) При малокровіи и головокруженіи, по костяной ложечкѣ 3—4 раза въ день—*Феррумъ*×3 или *Гензелевское желѣзо* утромъ и вечеромъ по 10 капель въ рюмкѣ сахарной воды.—4) При большой слабости, вслѣдствіе потери соковъ, кровотеченія и т. п.—*Хина* 3 и *Калькареа фосфорика* 6, по 2 раза въ день по 3 капли.

Если худоба развивается у дѣтей, при чемъ животъ у нихъ твердый и вздутый, то имъ назначается слѣдующая пища: ячменный супъ, овсянка, маисовый супъ, легуминозный какао и т. п. По устраненіи поноса: молоко, яйца всмятку, ячменный супъ, приготовленный на телячьемъ бульонѣ и т. п. Слѣдуетъ строго избѣгать излишествъ въ пищѣ. Воспрещаются: картофель, черный хлѣбъ и всѣ трудноваримыя кушанья. Ежедневныя ванны, къ которымъ можно прибавлять пшеничныя отруби.

Лѣченіе: 1) При поносѣ: *Арсеникъ* 12 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 6, черезъ 2 часа по 2 капли.—2) При запорахъ: *Нуксъ вомика* 6 и *Сульфуръ* 6, по 2 раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ. Эти средства слѣдуетъ принимать въ теченіе долгаго времени, при чемъ послѣ 3—4 недѣльнаго употребленія лѣкарствъ слѣдуетъ дѣлать перерывъ на 1—2 недѣли и такъ продолжать 5—6 мѣсяцевъ подъ рядъ.

Ишіасъ

или сѣдалищная боль.

Невралгія сѣдалищнаго нерва.

Причины: Ревматизмъ, простуда, лежаніе на сыромъ мѣстѣ, работа въ водѣ или сыромъ мѣстѣ, беременность,

скопленіе твердыхъ каловыхъ массъ въ кишкѣ, опухоли въ тазу и т. д.

Признаки: Боль въ сѣдалищныхъ мышцахъ или нервахъ бедра большею частью односторонняя; чаще всего она распространяется на протяженіи отъ ягодицы до средины икры, или по наружной поверхности голени до лодыжки и наружнаго края стопы, или боль сосредоточивается въ подошвѣ. Приступы боли являются чаще всего вечеромъ или ночью и ухудшаются отъ легкаго прикосновенія, при чемъ бываютъ часто судороги въ икрахъ, боль въ поясницѣ.

Лѣченіе: Легкое растираніе *оподельдокомъ* или *масломъ Русъ* или *Аконитиновою мазью;* полное спокойствіе, теплота; у беременныхъ тугое бинтованіе ногъ, начиная отъ пальцевъ и кончая выше колѣнъ.

Внутрь: 1) Въ свѣжихъ случаяхъ, если болѣзнь произошла вслѣдствіе простуды: *Аконитъ* 3 и *Бріонія* × 3, черезъ 2 часа поперемѣнно по 5 капель.—2) Если боли, выходя изъ правой поясничной области, распространяются на ногу и увеличиваются отъ движенія, при чемъ давленіе на бедренную мышцу вызываетъ боль, или если появляются колющія боли, идущія къ колѣну и даже къ лодыжкѣ. *Колоцинтисъ* 3.—3) Если боли увеличиваются въ спокойномъ положеніи и вызваны были чрезмѣрнымъ напряженіемъ,—*Русъ* 3.—4) Если боли усиливаются послѣ полуночи: *Арсеникъ* 6.—5) При сѣдалищной боли у беременныхъ и родильницъ: *Арника* 3 и *Ликоподіумъ* × 3, черезъ 2 часа.—6) У истеричныхъ: *Сепія* 6.—7) При боли, идущей отъ лѣвой стороны крестца черезъ бедро и его наружную часть къ икрамъ, при чемъ боли эти бываютъ наиболѣе сильными ночью: *Ирисъ* 30.—8) При боли отъ бедра къ колѣну, увеличеніи болей во время сидѣнія, уменьшеніи ихъ отъ ходьбы, и отсутствіи болей ночью: *Аммоніумъ муріатикумъ* 3.—9) При ухудшеніи черезъ каждые 4 дня: *Ликоподіумъ* 6.—10) При ухудшеніи утромъ: *Нуксъ вомика* 3.—11) Въ длительныхъ случаяхъ слѣдуетъ начинать лѣченіе съ *Сульфуръ* 3; послѣ—*Ликоподіумъ* × 3 (въ порошкѣ), три раза въ день по костяной ложечкѣ.

Катарръ.

Воспаленіе слизистыхъ оболочекъ, происходящее большею частью вслѣдствіе простуды и сопровождаемое сперва водянистымъ, а затѣмъ слизистымъ отдѣленіемъ. Катарромъ поражаются преимущественно дыхательные, пищеварительные и мочеполовые органы. (Сравн. Кашель, Насморкъ, Бронхитъ, Катарръ желудка и т. д.).

Лѣченіе: При катаррѣ дыхательныхъ путей теплое (горячее) молоко, сосать леденцы гомеопатическіе; чистый, теплый влажный воздухъ въ жилыхъ комнатахъ, а преимущественно въ спальнѣ. Потогонныя средства въ постели и питье—20 капель *Аконита* × 3 на стаканъ воды; *Эмская вода* пополамъ съ горячимъ молокомъ. Кромѣ того: 1) При катаррѣ, соединенномъ съ лихорадкою: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—2) Съ насморкомъ и кашлемъ: *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 или *Пульсатилла* 3.—3) При катаррѣ вслѣдствіе промоченія тѣла, сопровождаемомъ болью въ суставахъ, ломотою: *Русъ* 3, три раза въ день по 5 капель.—4) При катаррѣ, происходящемъ вслѣдствіе простуды во время сырой погоды или въ сыромъ мѣстѣ и соединенномъ съ кашлемъ и поносомъ: *Дулькамара* 3.—5) При катаррѣ съ ослизненіемъ въ груди и желудкѣ: *Кали бихромикумъ* 3.—6) При всякихъ катаррахъ во второмъ періодѣ: *Кали хлоратумъ* 3.—7) При хроническихъ (длительныхъ) катаррахъ дыхательныхъ путей: *Аммоніумъ броматумъ* 3, *Сульфуръ ауратумъ* 3, *Тартарусъ эметикусъ* 6, *Фосфоръ* 6, каждое порознь, 4 раза въ день по 5 капель.

Катарръ зѣва.

Причины: Простуда—холодный воздухъ, холодное питье, мороженое или слишкомъ горячая пища и питье; раздраженія отъ зубовъ; острыя лѣкарства, въ особенности ртуть; пьянство; а также бываетъ при такихъ болѣзняхъ, какъ скарлатина, сифилисъ и т. п.

Признаки: а) скоропроходящіе случаи: слизистая оболочка свѣтлокрасная, опухшая, которая отдѣляетъ потомъ тягучую слизь, блѣднѣетъ и дѣлается сѣрою или бѣлою; жаръ и жженіе во рту; вязкій слизистый вкусъ; слюнотеченіе, затрудненное глотаніе; иногда давящая боль, доходящая до ушной полости, съ шумомъ въ ушахъ и охриплостью. У дѣтей сопровождается часто лихорадкою; б) продолжительные, затяжные случаи: слизистая оболочка сильнѣе распухши, утолщена, темнокраснаго цвѣта и отдѣляетъ тягучую гноевидную слизь; задняя часть языка густо обложена; утромъ тошнота, рвота, сухость и давленіе въ горлѣ; катарръ зѣва часто сопряженъ съ катарромъ гортани, въ особенности у священнослужителей и у пѣвцовъ; тогда бываетъ грубый, беззвучный голосъ и кашель.

Діэта: Запрещается: курить, пить вино, пиво, водку и ѣсть кислое и очень жирное; утомлять голосовые органы пѣніемъ, крикомъ и т. п. Очень остерегаться простуды. Хорошо пить молоко или сыворотку, а также воду Эмсъ-Крэнхенъ. Какъ предохранительныя, рекомендуются холодыя обтиранія, въ особенности шеи, и полосканія горла холодною водою. На ночь согрѣвающій компрессъ на горло; полоскать горло 3 раза въ день слабымъ растворомъ бертолетовой соли. Также полезны и паровыя вдыханія раствора хлористаго натрія.

Лѣченіе: а) Острая форма: 1) Лучшія средства вначалѣ: *Белладонна* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 2 часа поперемѣнно по 5 капель; полоскать *Фитолакка*×1 30 капель на стаканъ.—2) Если краснота только на язычкѣ и на небныхъ занавѣскахъ,—то *Фитолакка* 3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно, полосканіе *Фитолакка*×1.—3) При потребности отхаркиваться и производить глотательныя движенія,—*Кали бихромикумъ* 3, *Кали іодатумъ* 3 и *Сульфуръ* 1, поочередно, черезъ 2 часа по 5 капель.—4) При катаррѣ зѣва у пьяницъ или послѣ пирушки,—*Нуксъ вомика* 3, черезъ 2—3 часа по 5 капель.—5) Когда языкъ обложенъ желтымъ, точно творожистымъ налетомъ и при этомъ существуетъ сухой кашель съ тягучею трудно отходящею мокротою,—*Натрумъ фосфорикумъ* 6.—6) При очень густой тягучей мо-

кротѣ *Алюмина* 6, черезъ 2—3 часа по 2 капли.—7) При хрипотѣ,—*Гепаръ сульфурисъ* 6, *Румексъ* 3, по 5 капель попеременно черезъ 2 часа.—8). При опухоли миндалевидныхъ железъ—*Калькареа іодата* 6 и *Сульфуръ* 6 попеременно, черезъ день, 3 раза въ день по 5 капель.

б) Затяжная продолжительная форма: 1) При опухоли миндалевидныхъ железъ, зернистости слизистой оболочки и хрипотѣ: *Румексъ* 3 и *Гепаръ сульфурисъ* 6, черезъ 2 часа по 5 капель.—3) При сухости въ горлѣ, хрипотѣ, потерѣ голоса: *Фосфоръ* 6, 4 раза въ день по 5 капель.—3) У дѣтей при прорѣзываніи зубовъ: *Белладонна* 3, *Камомилла* 3 и *Калькареа карбоника* 6, по 2 раза въ день по 2 капли или по 3 крупинки.

Катаракта.

Помутнѣніе хрусталика глаза.

Въ началѣ болѣзни паціенту кажется, какъ будто онъ смотритъ сквозь нечистое или вспотѣвшее окно, а позднѣе онъ видитъ какъ бы сквозь молочное стекло; при дальнѣйшемъ развитіи болѣзни, ему при свѣтѣ становится хуже, онъ плохо различаетъ стоящіе передъ нимъ предметы, видитъ все какъ бы въ дыму и, наконецъ, совсѣмъ ничего не видитъ. Зрачекъ бѣловатый или синеватый на видъ. Когда катаракта созрѣетъ, она должна быть снята опытнымъ окулистомъ.

Лѣченіе: 1) Если катаракта образовалась послѣ скрытія внутрь сыпи: *Сульфуръ* 30. — 2) Послѣ внезапной простуды: *Белладонна* 3.—3) Отъ задержанія регулъ: *Пульсатилла* 3.—4) Также важными средствами считаются при лѣченіи катаракты: *Аурумъ* 6, *Калькареа карбоника* 6, *Фосфоръ* 3, *Силицеа* 6, *Сепіа* 6. Каждое изъ вышеуказанныхъ лѣкарствъ надо принимать по нѣсколько дней подъ рядъ, затѣмъ сдѣлать паузу въ 1—2 недѣли и приступить къ слѣдующему лѣкарству. Давать также одну недѣлю *Фосфоръ* 6, по 5 капель 3 раза въ день; затѣмъ одну недѣлю ничего не давать, а потомъ—*Коніумъ* 3, такъ же, а вслѣдъ затѣмъ—

Кальціумъ флюорикумъ 3. Чередовать эти 3 лѣкарства съ указанными промежутками, мѣняя дѣленія, въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль.—Если образованіе катаракты произошло отъ ушиба глаза, то полезно *Арника* 3, по 5 капель 3 раза въ день.—Если есть помутнѣніе хрусталиковой сумки, то *Каннибисъ* 3 и *Магнезія карбоника* 6, поперемѣнно по 2 раза въ день по 5 капель. Старикамъ очень полезно *Коніумъ* 30, утромъ и вечеромъ по 5 капель, и снаружи, какъ промываніе глаза, *Коніумъ* Θ, 10 капель на рюмку воды.

Весьма хорошіе результаты получаются отъ примѣненія *Евфразія*×3 внутрь и *Евфразія* Θ, 10 капель на рюмку воды для промыванія глаза.

Послѣ операціи тотчасъ же начать давать *Аконитъ* 3 и *Арника* 3, черезъ 1—2 часа поперемѣнно по 5 капель въ чайной ложкѣ воды. Если появится боль надъ глазами или въ головѣ, то давать *Белладонна* 3 и *Коніумъ* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.

Кашель.

Причины: Воспаленіе слизистой оболочки дыхательныхъ путей; болѣзни гортани, бронховъ, легкихъ и сердца; раздраженія горла пылью, дымомъ, посторонними тѣлами, газами, слизью, гноемъ и т. д.

Кашель страдающихъ желудкомъ, у алкоголиковъ (со рвотою по утрамъ).

Признаки: Сухой, лающій, хриплый кашель происходитъ изъ гортани; глубокій, соединенный съ хрипами въ груди происходитъ изъ бронховъ или легкихъ; кашель съ отдѣленіемъ гнойной мокроты указываетъ на серьезное пораженіе дыхательныхъ путей, поэтому долженъ быть пользованъ врачемъ; колотье, ощущаемое въ боку при кашлѣ, указываетъ на раздраженіе или воспаленіе плевры (легочной плевы).

Лѣченіе: Кашля не слѣдуетъ никогда запускать. Лица, расположенныя къ кашлю, должны закалять себя отъ простуды частыми обмываніями тѣла, въ особенности шеи, хо-

лодною водою. Съ цѣлью быстро отдѣлаться отъ простуднаго кашля, слѣдутъ прибѣгнуть къ паровой ваннѣ или попариться хорошенько въ банѣ. Равнымъ образомъ хорошо дѣйствуютъ теплая (28° Р.) ванна (въ теченіе 1/2 часа), съ послѣдующимъ закутываніемъ въ шерстяное одѣяло съ цѣлью потѣнія. Кромѣ того нужно стараться, чтобы воздухъ въ жилыхъ комнатахъ, а въ особенности въ спальнѣ былъ всегда чистъ, влаженъ и средней теплоты. Куреніе табаку должно быть оставлено. Пить *Эмскую минеральную воду Крэнхенъ* пополамъ съ горячимъ молокомъ или овсяный отваръ. Противъ приступовъ кашля, какъ испытанное народное средство, рекомендуютъ слѣдующее: 1 литръ (бутылку) воды вливаютъ въ глиняный глазированный горшокъ и ставятъ на огонь (плиту); когда вода начнетъ кипѣть, тогда слѣдуетъ всыпать на поверхность воды чайную ложечку *ржаной муки*, не мѣшая ея, такъ, чтобы она сама постепенно втягивалась водою внизъ. Затѣмъ снимаютъ этотъ отваръ съ огня и, покрывши тщательно сосудъ, даютъ отвару остынуть; потомъ переливаютъ его осторожно въ бутылку такъ, чтобы мука оставалась на днѣ горшка, послѣ чего употребляютъ этотъ отваръ, какъ питье.

Внутрь: 1) При кашлѣ съ лихорадочнымъ состояніемъ и безпокойствомъ: *Аконитъ* 3 и *Бріонія*×3, черезъ 2 часа по 5 капель поперемѣнно, и какъ питье—глотками *Белладонна* 3, по 30 капель на стаканъ.—2) При сильномъ судорожномъ кашлѣ съ головною болью и краснотою лица, а также у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ: *Камомилла* 3 и *Белладонна* 3, черезъ 2 часа по 1—2 капли. При лающемъ кашлѣ у дѣтей—*Спонгія* 3. При судорожномъ затяжномъ кашлѣ съ посинѣніемъ лица у дѣтей: *Дрозера* 3.—3) При судорожномъ кашлѣ со слизистыми хрипами, тошнотою и рвотою, а именно: при воспаленіи гортани и бронховъ съ признаками удушья или задушенія, преимущественно у маленькихъ дѣтей: *Ипекакуана* 3.—4) При мучительномъ сухомъ кашлѣ, въ особенности ночью, съ разстройствомъ пищеваренія (гриппъ): *Тартарусъ эметикусъ* 6, *Бріонія* 3, черезъ 1—2 часа по 5 капель.—5) При мучительномъ ночномъ кашлѣ, вызывающемъ рвоту и щекотаніе въ горлѣ и не

дозволяющемъ больному уснуть; *Гіосціамусъ* 1, 20 капель на стаканъ воды, пить глотками; такъ же *Дрозера* 1 и *Камомилла* 3.—6) При влажномъ кашлѣ съ отдѣленіемъ большого количества мокроты, которая имѣетъ горьковатый или солоноватый вкусъ: *Дулькамара* 3 и *Пульсатилла* 3, черезъ 2 часа по 3 капли.—7) При кашлѣ съ сильными слизистыми хрипами въ груди: *Тартарусъ эметикусъ* 6, *Гепаръ* 6, *Фосфоръ* 6, поочередно черезъ 2 часа по 5 капель.—8) При запущенномъ катаррѣ дыхательныхъ путей, скопленіи слизи въ груди и гортани, въ особенности у слабыхъ, блѣдныхъ дѣтей: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3 попеременно съ *Арсеникумъ іодатумъ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.—9) При кашлѣ съ болью въ гортани и хрипотою: *Меркуріусъ бііодатусъ* 3—4 раза въ день по ложечкѣ.—10) При продолжительныхъ приступахъ кашля преимущественно по утрамъ, удушьи, упадкѣ силъ: *Фелландріумъ* 3 и *Аралія рацемоза* 3, по 2 раза въ день по 3 капли.—11) При сухомъ, мучительномъ, утомляющемъ кашлѣ, днемъ и ночью, съ ухудшеніемъ по ночамъ, а также, когда кашель этотъ мѣшаетъ спать, при чемъ ощущается въ гортани и дыхательномъ горлѣ присутствіе какъ бы пыли: *Хелидоніумъ* 3, 3 раза въ день по 3 капли.—12) При длительномъ кашлѣ: *Кали іодатумъ* 3, *Кали карбоникумъ* 6 и *Сульфуръ* 6.—13) При длительномъ кашлѣ у стариковъ: *Сенега*×3 и *Антимоніумъ арсенікозумъ*×3, по 2 раза въ день по 3 капли и по костяной ложечкѣ; также *Креозотъ* 3.

Кишекъ воспаленіе.

Причины: Простуда, употребленіе въ пищу испорченныхъ продуктовъ, трудноваримыя кушанья, незрѣлые плоды, злоупотребленіе слабительными, накопленіе каловыхъ массъ. У дѣтей бываетъ часто при глистахъ, послѣ отнятія отъ груди, отъ жирнаго молока, отъ прикармливанія кашицами и неподходящею возрасту пищею.

Признаки: Головная боль; общее недомоганіе; усиленная жажда; обложенный языкъ; отсутствіе аппетита; колики

и урчаніе въ животѣ; частыя, жидкія испражненія, очень изнуряющія больного; иногда лихорадочное состояніе. Если воспаленіе кишекъ сопряжено съ воспаленіемъ желудка, то животъ вздутъ. Если болѣзнь запущена, то она можетъ очень затянуться и перейти въ хроническую форму; при этомъ испражненія содержатъ тягучія, стекловидныя, студенистыя массы или таковыя отходятъ твердыми комками, покрытыми слизью; чувство слабости и исхуданіе. У дѣтей воспаленіе кишекъ выражается вздутіемъ живота, очень вонючими испражненіями, сильнымъ и быстрымъ исхуданіемъ, при сравнительно хорошемъ аппетитѣ.

Діэта для взрослыхъ: слизистые супы (ячменный супъ, овсянка) въ небольшомъ количествѣ за разъ; куриный супъ со слизистымъ отваромъ. Діэта дѣтей: Взять полную чайную ложечку салепу на 1/2 бутылки воды и, прокипятивъ эту жидкость, подсластить ее молочнымъ, или хорошимъ тростниковымъ сахаромъ, а затѣмъ давать пить по маленькой ложечкѣ. При лихорадочномъ состояніи: миндальное молоко; овсяная кашка съ бульономъ изъ телячьихъ или бараньихъ костей; разбавленное водою молоко. Соблюдать діэту нужно долго. Держать животъ въ теплѣ. Теплыя ванны и согрѣвающіе компрессы или теплыя сухія припарки на животъ очень полезны. Носить въ теченіе долгаго времени шерстяной набрюшникъ и теплую одежду. Въ длительныхъ случаяхъ: комнатная гимнастика; для развитія брюшного пресса—глубокія вдыханія, массажъ живота. Ѣсть ежедневно яблочный кисель.

Лѣченіе: 1) При кишечномъ катаррѣ вслѣдствіе простуды: *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Дулькамарою* 6, черезъ 2 часа по 5 капель или 5 крупинокъ.—2) При кашицевидныхъ и зеленоватыхъ испражненіяхъ съ вонючими вѣтрами и коликою (появляющихся часто весною и осенью въ видѣ эпидеміи): *Колоцинтисъ* 6 и *Камомилла* 3, *Пульсатилла* 6, а при сильныхъ боляхъ: *Вератрумъ* 3.—3) При испражненіяхъ, смѣшанныхъ со слизью и кровью: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Фосфоръ* 6, каждый часъ по 5 капель.—4) Вслѣдствіе разстройства желудка: *Антимоніумъ крудумъ* 6, *Пульсатилла* 6, каждые 2 часа

по 5 капель.—5) При безболѣзненныхъ частыхъ испражненіяхъ, преимущественно по утрамъ и до обѣда: *Подофиллумъ* 3, 4 раза въ день по 5 капель.—6) При поносѣ, сопряженномъ съ жаждою, страхомъ, болью и упадкомъ силъ: *Арсеникъ* 6, *Баптизія* 3, каждые 1½—2 часа по 5 капель.—7) У дѣтей: а) При зеленоватыхъ испражненіяхъ, имѣющихъ видъ рубленыхъ яицъ: *Камомилла* 3, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.—б) При зеленыхъ испражненіяхъ, изъязвляющихъ задній проходъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—в) При темныхъ и кашицевидныхъ испражненіяхъ: *Реумъ* 3.—г) При безболѣзненныхъ, водянистыхъ и вонючихъ испражненіяхъ: *Ипекакуна* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—д) При болѣзненныхъ испражненіяхъ съ большимъ упадкомъ силъ: *Арсеникъ* 6, каждые ½ часа по 5 капель.

Въ длительныхъ случаяхъ, т.-е., при хроническомъ кишечномъ катаррѣ: При скопленіи твердыхъ каловыхъ массъ, онѣ должны быть удалены помощью промывательныхъ изъ мыльной воды съ прованскимъ масломъ. Сильныя же проносныя средства (напр., Глауберова соль и т. п.), вредятъ и ухудшаютъ состояніе больного.—При пученіи, урчаніи и изверженіи твердыхъ каловыхъ массъ: *Калькареа карбоника* 6, три раза въ день по 5 капель.—2) При кровянистыхъ испражненіяхъ: *Карбо вегетабилисъ* 6 и *Меркуріусъ коррозивусъ* 6, черезъ 2—3 часа по 5 капель.—3) При пученіи безъ отдѣленія вѣтровъ и изверженіи сухихъ узловатыхъ, каловыхъ массъ: *Нуксъ вомика* 30 попеременно съ *Сульфуръ* 30 или *Натрумъ муріатикумъ* 30.—4) Если при этомъ обнаруживается воспаленіе почекъ и мочевого пузыря: *Фосфоръ* 6 попеременно съ *Гепаръ сульфурисъ* 3.—5) При рвотѣ каломъ: *Опій* 6, *Нуксъ вомика* 6, *Плюмбумъ* 6.—6) При боли въ области пупка и поносѣ, преимущественно ночномъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, три раза въ день по 5 капель.—7) При безболѣзненномъ поносѣ: *Русъ* 3 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, каждые 2—3 часа по 5 капель.—8) При жженіи въ нижней части живота и заднемъ проходѣ: *Арсеникъ* 6.—9 При жидкихъ, водянистыхъ испражненіяхъ послѣ ѣды: *Аргентумъ нитрикумъ* 6.—10)

Если отходятъ лентовидные или цилиндрическіе слизистые куски: *Графитъ* 6.—11) При хроническомъ воспаленіи слѣпой кишки, когда правая подвздошная впадина вздута, болѣзненна при надавливаніи и въ ней по временамъ появляются колючія боли, а испражненія съ трудомъ выдѣляются, *Гинзенгъ* 3. У дѣтей: а) у золотушныхъ дѣтей и во время прорѣзыванія зубовъ: *Калькареа карбоника* 6 или *Калькареа фосфорика* 6, попеременно съ *Камомиллой* 3, каждые 2—3 часа по 5 капель.—б) При сильномъ исхуданіи: *Фосфоръ* 6 или *Ацидумъ фосфорикумъ* 6, по два раза въ день, а также *Хина* 3.—в) При жаждѣ, безпокойствѣ, водянистыхъ испражненіяхъ: *Арсеникъ* 6.—г) При безболѣзненныхъ испражненіяхъ съ урчаніемъ: *Аргентумъ нитрикумъ* 6.—При появленіи судорогъ: *Цинкъ* 6, каждые 2 часа по 5 капель или 5 крупинокъ.

Коклюшъ.

Коклюшъ есть эпидемическая и заразительная болѣзнь и встрѣчается почти исключительно у дѣтей.

Причины: зараженіе въ большинствѣ случаевъ, а потому отдѣленіе здоровыхъ дѣтей отъ больныхъ коклюшемъ предохраняетъ первыхъ нѣкоторымъ образомъ отъ заболѣванія. Коклюшъ развивается преимущественно у дѣтей до 8 года ихъ жизни, имѣетъ хроническое теченіе и продолжается большею частью не менѣе 6-ти недѣль, а иногда и до 20-ти недѣль.

Признаки: Коклюшъ начинается насморкомъ и обыкновеннымъ кашлемъ, который вскорѣ становится судорожнымъ и сопровождается продолжительнымъ, глубокимъ свистящимъ вдыханіемъ, послѣ чего больной откашливаетъ большое количество липкой, тягучей, стекловидной слизи. При этомъ у дѣтей появляется страхъ, они цѣпляются за окружающіе ихъ предметы, лицо дѣлается багровымъ, синѣетъ, руки и ноги холодѣютъ. Послѣ этихъ приступовъ, которые становятся все болѣе и болѣе частыми, нерѣдко появляется рвота и кровотеченіе изъ носа.

Лѣченіе: Въ сырую, холодную погоду дѣтей не слѣдуетъ въ теченіе 14 дней выпускать изъ дому. Въ жилыхъ комнатахъ и спальнѣ нужно постоянно поддерживать чистый теплый воздухъ (16° Реом.). Только въ хорошую, солнечную погоду можно позволить имъ гулять на свѣжемъ воздухѣ, въ мѣстности, свободной отъ пыли, и съ тѣмъ, однако, чтобы они не бѣгали и вообще не доводили себя до испарины или усталости. Всякое раздраженіе для нихъ вредно, поэтому слѣдуетъ всегда ласково съ ними обращаться. Пища ихъ должна быть удобоварима и питательна и состоять изъ молока, яицъ всмятку, некрѣпкаго бульона, кашицы, овсянки, компотовъ, нѣжнаго, порѣзаннаго на мелкіе кусочки мяса, цыпленка и т. д. Всякія жирныя, кислыя и приправленныя острыми пряностями кушанья, а также сырые фрукты, воспрещаются. При истощеніи и большой слабости больному полезно давать токайское вино. Вообще слѣдуетъ такимъ больнымъ давать ѣсть и пить маленькими порціями, Въ теченіе первыхъ 14 дней болѣзни они должны брать ежедневную *теплую ванну*. Если приступъ кашля появится въ то время, когда ребенокъ лежитъ въ постели, нужно приподнять его и усадить такъ, чтобы мокрота могла легко отдѣляться, и если она представляется въ видѣ тягучей слизи, то удалить ее пальцами изъ зѣва. Для ослабленія очень сильныхъ, изнурительныхъ приступовъ хорошо прикладывать къ груди и къ горлу согрѣтую фланель или суконку. Если ребенокъ не можетъ отдышаться отъ сильнаго приступа, то слѣдуетъ вспрыснуть его лицо холодною водою и нѣсколькими ударами ладонью потрепать по спинѣ.—При потерѣ сознанія, вложить палецъ глубоко въ ротъ и нажимать довольно сильно на корень языка и вмѣстѣ съ тѣмъ растирать ноги и натирать виски уксусомъ. По прекращеніи коклюша нужно стараться закалить ребенка противъ простуды ежедневными холодными обмываніями всего тѣла и, во избѣжаніе возвратовъ болѣзни, тепло одѣвать въ холодную и сырую погоду. Многіе хвалятъ еще дезинфекцію спальни больного (разставлять на окнахъ и на полу растворъ *марганцово кислаго кали).* Часто очень полезна бываетъ перемѣна климата, т.-е., увезти больного на 3—

4 недѣли въ другой городъ или деревню; напр., изъ Петербурга увозятъ коклюшныхъ дѣтей въ Выборгъ или вообще въ Финляндію, гдѣ они при надлежащемъ лѣченіи быстро поправляются.

Внутрь давать: 1) *Аконитъ* 3, а если лихорадка незначительна, то *Натрумъ нитрикумъ* 3, попеременно черезъ 2 часа по 5 капель съ *Белладонна* 6 или съ *Ипекакуана* 6.—Очень дѣйствительно примѣненіе *Дрозера*×3, возможно чаще, по 2—3 капли. 2) Если, несмотря на эти средства, болѣзнь все болѣе и болѣе усиливается, то д-ръ Гиршъ совѣтуетъ давать въ теченіе двухъ недѣль по три пріема въ день *Вератрумъ* 3.—3) Во время періода сильнаго судорожнаго кашля—*Купрумъ* 6, *Тартарусъ эметикусъ* 6, утромъ и вечеромъ по 2 капли.—4) Хорошіе результаты достигались также отъ *Магнезія фосфорика* 6, *Феррумъ фосфорикумъ* 6 и *Калькареа оксалика* 6, которыя давать попеременно, въ порошкѣ, черезъ два часа (сколько помѣстится на кончикѣ ножа или въ костяной ложечкѣ).—Въ другихъ случаяхъ *Кожусъ какти* 1 (въ порошкѣ), по 3 пріема въ день, оказывался весьма полезнымъ.—При кровотеченіи изо рта и носа: *Арника* 3 и *Цина* 3.—Золотушнымъ дѣтямъ хорошо давать изрѣдка *Калькареа карбоника* 12 въ видѣ промежуточнаго средства. Если въ позднѣйшемъ періодѣ болѣзни образуется въ дыхательныхъ путяхъ много слизи, то слѣдуетъ давать *Гепаръ* 3 или *Тартарусъ эметикусъ* 3 попеременно съ *Хина* 1. Въ случаѣ развитія малокровія прекраснымъ средствомъ является *Тоникумъ Гензеля* въ количествѣ 1 чайной ложечки на стаканъ подслащенной воды, который нужно принимать маленькими глотками за ѣдою. Кромѣ того, полезными оказались: *Арсеникъ* 6, *Нафталинъ* 3, *Сепія* 6, а при преобладающей хрипотѣ *Арсеникумъ іодатумъ* 3.

Колѣннаго сустава воспаленіе.

а) **Острое (скоротечное) воспаленіе колѣннаго сустава.**

Причины: Ревматизмъ, простуда, толчокъ, ударъ, паденіе, поврежденіе.

Признаки: опухоль, жаръ и болѣзненность въ колѣнѣ, при чемъ надколѣнная чашка нѣсколько припухши.

Лѣченіе: покойное положеніе въ постели; *компрессы* изъ воднаго *раствора арники* (1 ч. на 10 ч. воды), если воспаленіе послѣдовало отъ паденія или удара; массажъ.—1) Если болѣзнь произошла вслѣдствіе ревматизма: *Аконитъ* 3 или *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Бріоніей* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.—2) Вслѣдствіе толчка, удара, паденія и т. д.: *Арника* 3, *Калькареа флуорика* 6, по 2 раза въ день по 3 капли.—3) Въ запущенныхъ случаяхъ: *Сульфуръ* 3 и *Силицеа* 6, черезъ день, утромъ и вечеромъ по 5 капель или 5 крупинокъ.—4) У золотушныхъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 и *Калькареа карбоника* 3, черезъ день утромъ и вечеромъ по костяной ложечкѣ.

б) **Хроническое** (длительное) **воспаленіе колѣннаго сочлененія** (бѣлая опухоль колѣна или туберкулезъ колѣна).

Признаки: колѣно становится мало-по-малу болѣзненнымъ и припухаетъ, при чемъ опухоль мягкая, а кожа, ее покрывающая, бѣлая; позднѣе появляется нагноеніе, влекущее за собою неподвижность сустава.

Лѣченіе: покойное положеніе въ постели, а при боляхъ *горячія обертыванія*.—1) При боляхъ вначалѣ: *Белладонна* 3. 4 раза по 5 капель, а затѣмъ *Коніумъ* 3, поперемѣнно съ *Кали іодатумъ* 2, по 3 раза въ день по 5 капель; послѣ 2-хъ недѣльнаго употребленія вышеозначенныхъ средствъ *Силицеа* 3 и *Сульфуръ* 3, черезъ день, утромъ и вечеромъ по ложечкѣ. Также хорошо давать *Аписъ* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, по 2 раза въ день. Полезно примѣненіе *Арсеникъ* 6 или *Арсеникъ іодатумъ* 3, *Калькареа карбоника* 6 и *Калькареа іодата* 6.

Корь.

Острая, заразная сыпь, поражающая эпидемически почти исключительно дѣтей.

Признаки: Лихорадочное состояніе. Чиханіе и насморкъ. Сухой кашель и слезотеченіе изъ воспаленныхъ глазъ. Свѣто-

боязнь. Сыпь—красноватыя пятна или красные узелки появляются сперва на лицѣ, а затѣмъ въ теченіе 24—36 часовъ распространяются по всему тѣлу. Сыпь держится 24 часа въ одномъ положеніи, а затѣмъ начинаетъ блѣднѣть. Кожа сходитъ отрубевидными кусочками. Корь можетъ осложниться слѣдующими болѣзнями: судорогами, крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, поносомъ и пр.

Лѣченіе: Уложить больного въ постель, но укрывать легкими одѣялами. Комнатная температура не должна превышать 14°. Прохладительные напитки и легкая пища. При смѣнѣ бѣлья предварительно нагрѣть его. Провѣтривать комнату. При свѣтобоязни занавѣшивать окна.

Въ началѣ болѣзни, при лихорадкѣ и жарѣ—*Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно черезъ 2 часа по 3—5 капель въ ложечкѣ воды. При сильномъ нервномъ безпокойствѣ—*Коффеа* 3. При задержаніи высыпи—*Сульфуръ* 6, *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Бріонія* 3 или *Аписъ* 3, черезъ 2 часа по 3 капли. При воспаленіи дыхательныхъ путей—*Бріонія* 3 и *Фосфоръ ацидъ* 3. При воспаленіи легкихъ *Аконитъ* 2, *Бріонія* 3 и *Фосфоръ* 6. При воспаленіи глазъ, слезливости, свѣтобоязни, текучемъ насморкѣ—*Евфразія* 3. Если выдѣленія носа желтоватаго цвѣта и притомъ есть поносъ—*Белладонна* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ два часа; при колющихъ боляхъ въ ухѣ и возможности осложненія со стороны уха (нагноеніе)—*Пульсатилла* 3. При поносѣ—*Пульсатилла* 3, *Ипекакуана* 3 и *Вератрумъ* 3. При судорожномъ кашлѣ, въ особенности по ночамъ—*Гіосціамусъ* 3 и *Купрумъ ацетикумъ* 3, черезъ 2 часа по 2 капли. При сильныхъ хрипахъ въ груди—*Тартарусъ эметикусъ* 3, по 2, капли и *Гепаръ сульфурисъ* 3, по костяной ложечкѣ черезъ 2 часа. Если кашель крупозный, лающій—*Спонгія* 3. Если корь опаснаго тифоиднаго характера, то необходимо пригласить врача и имѣть въ запасѣ: *Фосфоръ* 6, *Арсеникъ* 6 и *Русъ* 3.

Послѣдствія кори: 1) Легочная чахотка—*Арсеникумъ іодатумъ* 6 поперемѣнно съ *Хина* 3; затѣмъ *Фосфоръ* 6 и *Калькареа фосфорика* 6.—2) Воспаленіе уха—*Пульсатилла* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, поперемѣнно.—3) Истеченіе гноя изъ ушей—*Гепаръ сульфурисъ* 3 и *Силицеа* 2, поперемѣнно

черезъ день, по 2 раза въ день каждаго по костяной ложечкѣ.—4) Воспаленіе глазъ—*Евфразія* 3, *Арсеникумъ іодатумъ* 6 и *Аписъ* 3, поперемѣнно.—5) Нарывы, золотушныя сыпи—*Сульфуръ* 6 или *Гепаръ сульфуръ* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ бііодатусъ* 3.—6) Гноетеченіе изъ носа—*Кали бихромикумъ* 6.—7) Поносъ—*Сульфуръ* 6 поперемѣнно съ *Калькареа карбоника* 6, или *Ацидумъ фосфорикумъ* 3 поперемѣнно съ *Хининумъ танникумъ* 3.—8) Запоръ и обложенный языкъ—*Антимоніумъ крудумъ* 6.—9) Охриплость *Каустикумъ* 6.—Когда одна изъ указанныхъ болѣзней, послѣ кори, переходитъ въ хроническую форму, то подходящія лѣкарства давать въ рѣдкихъ пріемахъ утромъ и вечеромъ.

Костоѣда.

Воспаленіе и омертвѣніе кости.

Причины: Ушибъ, поврежденіе кости, раны, переломы, язвы, подагра, золотуха, сифилисъ и т. д.

Признаки: При сильнѣйшихъ боляхъ кожа начинаетъ краснѣть и припухать, послѣ чего образуется нарывъ, изъ котораго отдѣляется гной или сукровица дурного вида и сквернаго запаха; поверхность пораженной кости бываетъ мягкой, частицы же кости отдѣляются въ видѣ маленькихъ почернѣвшихъ кусочковъ или песку. Самое отверстіе нарыва представляется въ видѣ дырочки или узкаго канала, окруженнаго красноватымъ валикомъ. При благопріятныхъ условіяхъ гной становится все болѣе и болѣе доброкачественнымъ, и затѣмъ язва рубцуется (заживаетъ).

Лѣченіе: Язву слѣдуетъ тщательно обмывать тепловатою водою, къ которой прибавляютъ *Силиціевой воды* столовую ложку на полстакана. Больную часть тѣла нужно содержать въ покоѣ, не утруждая ея и оберегая отъ толчковъ, давленія, ушиба и т. д. Необходимо стараться о томъ, чтобы гной не задерживался, а правильно истекалъ изъ язвы. Пища должна быть питательная, но не обременительная и горячительная, и состоять изъ молока, яицъ, нѣжнаго жаренаго мяса, овощей, плодовъ. Необходимо избѣгать жирной, кислой

и приправленной острыми пряностями пищи. Въ видѣ питья употреблять яблочный чай. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ соблюдать чистоту тѣла и пользоваться свѣжимъ, чистымъ воздухомъ.

Внутрь: 1) *Силицеа* 6 и *Стафизагрія* 6, по 2 раза въ день по 5 капель. Средства эти слѣдуетъ принимать—первое утромъ и вечеромъ въ теченіе 8 дней, и послѣ каждыхъ 18 дней дѣлать перерывы, второе два раза въ день въ теченіе 3—4 недѣль. Затѣмъ принимать въ такомъ же порядкѣ *Фосфоръ* 6 и *Калькареа карбоника* 6.—2) При костоѣдѣ нижней челюсти *Дистусъ канадензисъ* 3 и *Фосфоръ* 6, 3 раза въ день по 5 капель, поперемѣнно черезъ день.—3) При костоѣдѣ носовыхъ костей: *Силицеа* 6 и *Аурумъ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли.—4) При костоѣдѣ у лицъ, страдающихъ туберкулезомъ (бугорчаткой), *Іодіумъ* 3 и *Гепаръ сульфурисъ* 3, по 2 раза въ день.—5) При выдѣленіи жидкаго, вонючаго гноя: *Асафетида* 6, 3 раза въ день по 3 капли.

Кошмаръ, ночное удушье.

Появляется оно всего чаще у полнокровныхъ и является большею частью слѣдствіемъ нравственныхъ потрясеній.—Во избѣжаніе этого не слѣдуетъ ложиться спать съ переполненнымъ желудкомъ; не должно употреблять трудно перевариваемой пищи; не нужно пить вечеромъ крѣпкаго чая, кофе и спиртныхъ напитковъ. Слѣдуетъ наблюдать за правильными испражненіями и дѣлать продолжительныя прогулки. Избѣгать лежанія на спинѣ во время сна.

Лѣченіе: 1) При кошмарѣ, которому сопутствуютъ приливы крови, жаръ и сердцебіеніе: *Аконитъ* 3, *Белладонна* 3.—2) При кошмарѣ, вслѣдствіе употребленія спиртныхъ напитковъ, обремененія желудка и т. п.: *Нуксъ вомика* 3, *Пульсатилла* 3.—3) При вздутіи живота газами: *Карбо-вегетабилисъ* 6, *Ликоподіумъ* 30, по 2 раза въ день по 3 капли или по 5 сухихъ крупинокъ.—4) Во время самаго приступа удушья ночью: *Опіумъ* 3, одинъ или два пріема по 3 капли въ рюмочкѣ холодной воды.

Крапивная лихорадка.

Причины: Употребленіе земляники, малины, раковъ, устрицъ и т. п.; желудочныя и нервныя разстройства.

Признаки: Сильно зудящіе, жгучіе прыщики и волдыри. Верхушки прыщиковъ красноватыя или бѣлыя, какъ послѣ обожженія крапивою. Передъ появленіемъ сыпи больной чувствуетъ безпокойство, страхъ, а иногда бываетъ и лихорадка.

Лѣченіе; а) При высыпи, сопряженной съ лихорадкою: 1) При большомъ возбужденіи (безпокойствѣ) и когда сыпь покрыта пузырьками: *Аконитъ* 3 и *Русъ* 3, поперемѣнно, черезъ 1 часъ по 2 капли или по 5 крупинокъ.—2) При поносѣ и когда высыпь усиливается отъ теплоты постели: *Дулькамара* 3, поперемѣнно съ *Аконитомъ* 3, черезъ 1-2 часа.—3) При ночномъ кашлѣ и когда высыпь сплошная и волдыри значительныхъ размѣровъ: *Аписъ* 3 и *Аконитъ* 3, поперемѣнно черезъ 1 часъ.—4) При боли въ сочлененіяхъ и отсутствіи аппетита: *Бріонія* 3 поперемѣнно съ *Аконитомъ* 3, черезъ 1 часъ.—5) При сильномъ зудѣ кожи и появленіи волдырей послѣ почесыванія, при продолжительномъ жженіи, сопряженномъ съ ознобомъ и чувствомъ холодѣнія вдоль позвоночника, рукъ и ногъ: *Мезереумъ* 3 и *Уртика* 3.—5) При большой слабости даютъ, какъ промежуточное средство, *Арсеникъ* 3, 20 капель на стаканъ отварной воды—выпивать глотками въ теченіе дня.

б) При затяжныхъ формахъ крапивной лихорадки: 1) Когда высыпь въ прохладномъ воздухѣ уменьшается: *Калькареа карбоника* 6, 3 раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ.—2) Если высыпь въ прохладной температурѣ усиливается: *Каустикумъ* 3, 3 раза въ день по 2 капли.—3) При недостаткѣ регулъ у женщинъ: *Пульсатилла* 3 или *Сепіа* 3, 3 раза въ день по 2 капли.—4) При обильныхъ регулахъ: *Белладонна* 3, 3 раза въ день по 3 капли.—5) При желудочныхъ разстройствахъ: *Антимоніумъ крудумъ* 6 и *Пульсатилла* 6, черезъ 3—4 часа поперемѣнно.

Избѣгать всякихъ пряностей (горчицы, перца, уксуса, хрѣна, меда) и соленыхъ кушаній. Пища должна быть растительная. Употребленіе водки, пива и чернаго кофе безусловно воспрещается. Полезны теплыя ванны, только съ большою предосторожностью отъ простуды. По выздоровленіи очень полезны, какъ укрѣпляющее средство, холодныя обтиранія по утрамъ.

Красныя кровяныя жилки на лицѣ.

Утромъ и вечеромъ въ теченіе нѣсколькихъ дней смазывать расширенные кровеносные сосуды помощью нѣжной кисточки *экстрактомъ Гамамелисъ* или растирать *мазью Гамамелисъ*.

Кровотеченія.

Всякое кровотеченіе, если оно очень сильно или продолжительно, можетъ быть опасно для жизни и требуетъ помощи врача.

1) Кровотеченія вслѣдствіе пораненія или поврежденія: Слѣдуетъ удалить всякую стѣсняющую одежду и положить больного такимъ образомъ, чтобы кровоточащая часть тѣла лежала нѣсколько выше другихъ его частей. Рана должна быть очищена нѣжною, мягкою губкою или, еще лучше, гигроскоспическою ватою и охлаждена холодными примочками. Если отъ этого кровотеченіе остановится, то въ такомъ случаѣ нужно постараться сперва соединить края раны между собою, посредствомъ надавливанія и зажиманія, а затѣмъ заклеить полоскою *арниковаго* или *календуловаго* пластыря и, покрывъ рану гигроскопическою ватою, завязать. Если кровотеченіе происходитъ изъ поврежденной артеріи, что узнается по алому цвѣту крови, выходящей изогнутою въ дугу струею и притомъ толчками, совпадающими съ біеніемъ пульса, то оно можетъ быть остановлено прижатіемъ кровоточащаго сосуда пальцемъ въ самой ранѣ или наложеніемъ на нее совершенно чистой серебряной или золотой пластинки

(напр., монеты), которою крѣпко и равномѣрно нажимаютъ рану въ продолженіе 1/2 часа. Затѣмъ накладываютъ на рану тугую чистую полотняную повязку. Другой способъ. Отыскавъ пальцами выше раны артерію, прикладываютъ къ этому мѣсту пробку, прикрѣпляютъ ее посредствомъ бинта такъ, чтобы она крѣпко держалась и надавливала бы на артерію равномѣрно, и оставляютъ эту повязку до тѣхъ поръ, пока кровотеченіе не прекратится. При этомъ не слѣдуетъ прекращать прикладыванія къ ранѣ холодныхъ примочекъ или льда. При большихъ ранахъ перетягиваютъ раненый членъ (конечность) повыше раны эластическимъ бинтомъ, подтяжкою или носовымъ платкомъ такъ сильно, чтобы кровь перестала сочиться. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ послать поскорѣе за врачемъ, а до его прихода даютъ больному внутрь черезъ каждые 1/2 часа, или чаще, *Арнику* 3 и *Гамамелисъ*×3, попеременно по 5 капель.

2) Кровотеченіе изъ носа. Втягивать въ носъ холодную воду, къ которой можно прибавить ложечку *экстракта Гамамелисъ* на 1/2 стакана. Положить подъ языкъ круглый кусочекъ протечной или пропускной бумаги и затѣмъ держать въ приподнятомъ положеніи руку, соотвѣтствующую той ноздрѣ, изъ которой течетъ кровь. Если отъ этого кровотеченіе не прекратится, то приложить къ носу сухой платокъ, который не нужно удалять до тѣхъ поръ, пока кровь не перестанетъ течь. Затѣмъ осторожно отнимаютъ платокъ отъ носа и оставляютъ запекшуюся въ носу кровь на нѣсколько времени, стараясь не сморкаться, такъ какъ отъ этого можетъ возобновиться кровотеченіе. Если этимъ способомъ не удастся достигнуть цѣли, то слѣдуетъ покрыть носъ толстымъ компрессомъ, смоченнымъ въ холодной ледяной водѣ, или же губкою, смоченною въ холодной водѣ. Иногда удается прекратить носовое кровотеченіе посредствомъ внезапнаго и неожиданнаго для больного проведенія по затылку губкою, смоченною въ холодной водѣ. Въ тяжелыхъ случаяхъ прибѣгать къ тампонаціи (закупоркѣ) носа помощью чистой ваты или корпіи, смоченной *экстрактомъ Гамамелиса*, а если и это не поможетъ, то необходимо обратиться за помощью къ врачу. Для устраненія склонности къ носовымъ кро-

вотеченіямъ нужно брать теплыя ванны съ послѣдующими дождевыми душами изъ холодной воды и сильнымъ растираніемъ тѣла, а также посовѣтовать движеніе (ходить, бѣгать, производить гимнастику) на чистомъ воздухѣ.

Лѣченіе: 1) При кровотеченіи изъ носа у дѣтей, когда кровь часто течетъ въ видѣ студенистой массы—*Феррумъ фосфорикумъ* 6 и *Гамамелисъ* 3, черезъ 1/2 часа по 3 капли, а если это происходитъ по ночамъ, то *Белладонна* 3.—2) При носовомъ кровотеченіи у полнокровныхъ: *Аконитъ* 3, *Белладонна* 3.—3) Вслѣдствіе разгоряченія—*Белладонна* 3, *Туя* 3.—4) Вслѣдствіе употребленія спиртныхъ напитковъ—*Нуксъ вомика* 3.—5) Вслѣдствіе механическихъ причинъ (ушиба, пораненія)—*Арника* 3 внутрь и *растворъ арники* снаружи; если это не поможетъ, то *Трилліумъ* 3, черезъ 15—20 минутъ по 3 капли.—6) Вслѣдствіе приподниманія тяжестей или утомленія тѣла движеніями: *Русъ* 3.—7) При истеченіи черной, клейкой, тягучей крови—*Крокусъ* 3.—8) У дѣтей, страдающихъ отъ глистовъ: *Цина* 3.—9) У страдающихъ геморроемъ: *Сепія* 6 и *Гамамелисъ* 3.—10) У беременныхъ: *Сепія* 6.—11) Вслѣдствіе нагибанія: *Феррумъ* 3, *Натрумъ муріатикумъ* 3.—12) При большой слабости: *Хина* 3 и *Секале корнутумъ* 3.—13) При тифѣ, скарлатинѣ, дифтеритѣ—*Натрумъ натрикумъ* 3, *Кали фосфорикумъ* 6 и *Ляхезисъ* 6.—Главными же средствами во всѣхъ случаяхъ кровотеченія являются *Арника* 3 и *Гамамелисъ*×3, которыя давать черезъ 10—15 минутъ по 5 капель, и снаружи *экстрактъ Гамамелисъ* съ водою втягивать въ носъ и дѣлать снаружи холодныя примочки.

Кровотеченіе изъ задняго прохода.

Причины: Происходитъ оно большею частью вслѣдствіе геморроя, но можетъ появляться и отъ другихъ причинъ, въ каковомъ случаѣ должно обратиться къ врачу.

Лѣченіе: Внутрь — *Гамамелисъ*×3, *Ацидумъ натрикумъ* 3, *Арсеникъ* 6, поочередно, черезъ 2 часа по 5 капель на чайную ложку воды. Въ задній проходъ вставлять свѣчи *Гамамелисъ* утромъ и вечеромъ. Можно также ввести ма-

ленькій клистиръ въ прямую кишку изъ раствора 20—30 капель тинктуры Гамамелисъ на полрюмки воды. При этомъ нужно стараться не поранить или не повредить прямую кишку и промывательное удерживать въ кишкѣ.

Кровотеченіе изъ кишекъ.

Оно бываетъ очень часто при брюшномъ тифѣ.

При темныхъ, въ видѣ кофейной гущи, испражненіяхъ, слѣдуетъ наложить на весь животъ холодные компрессы, которые часто мѣнять, какъ только начнутъ согрѣваться. Если кровь болѣе свѣтлаго цвѣта, то въ большинствѣ случаевъ отдѣленіе ея происходитъ вслѣдствіе геморроя, и тогда оно не опасно. Но если это кровотеченіе оказалось бы слишкомъ обильнымъ, то нужно привязать къ заднему проходу губку, смоченную въ холодной водѣ.

Лѣченіе: 1) При истеченіи крови изъ кишекъ съ болью живота и дурнымъ запахомъ изо рта: *Меркуріусъ коррозивусъ* 6.—2) При тифѣ: *Гамамелисъ* 1 *Карбо вегетабилисъ* 3, *Арсеникъ* 3, поочередно, каждый часъ по 5 капель или по костяной ложечкѣ, и компрессы изъ холодной воды на животъ.—3) При геморроидальныхъ кровотеченіяхъ: *Гамамелисъ* 1, *Миллефоліумъ* 3, *Коллинзонія*×3.—4) При кровоизліяніи во время геморроя: *Гамамелисъ* 1 и *Ипекакуана* 3, черезъ 1/2 часа по 5 капель.—5) При сильномъ весьма обильномъ кровотеченіи: *Нуксъ мосхата* 3.

Кровотеченія маточныя.

Причины: Выкидышъ, беременность, опухоли, изъязвленія слизистой оболочки матки, наружныя поврежденія матки, приливъ крови къ ней. Маточныя кровотеченія во время беременности могутъ вызвать выкидышъ, преждевременные роды.

Лѣченіе: Больная должна быть уложена въ постель и находиться въ горизонтальномъ положеніи. Ей слѣдуетъ избѣ-

гать всякихъ движеній. Вызывать испражневіе низомъ посредствомъ промывательныхъ (клистировъ). Все стѣсняющее въ одеждѣ (юбки, корсетъ, кушакъ и пр.) должно быть удалено. Пища легкая, питательная, холодная и не возбуждающая.

Для остановки кровотеченія давать внутрь *Гамамелисъ* 1 и *Гидрастисъ*×1, попеременно чрезъ 1 часъ по 5 капель; снаружи—во влагалище вводятся шарики (маточные суппозиторіи) изъ Гамамелисъ Θ.

1) При черноватой, тягучей, комковатой крови: *Крокусъ* 3.—2) Во время беременности: *Секале корнутумъ* 3, *Сабина* 3, *Арника* 3, *Ипекакуана* 3.—При угрожающемъ выкидышѣ во время 2-го или 3-го мѣсяца беременности, съ болями въ спинѣ: *Кали карбоникумъ* 3 и *Арника* 3, попеременно, черезъ 1-2 часа по 5 капель.—3) При кровотеченіи послѣ родовъ: *Гамамелисъ* 1 и *Кали карбоникумъ* 3, черезъ 2 часа.—4) Послѣ выкидыша: *Секале корнутумъ* 3, *Хина* 3, *Арсеникъ* 6.—5) При маточныхъ кровотеченіяхъ у здоровыхъ, полнокровныхъ женщинъ: *Нуксъ вомика* 3, *Гамамелисъ* 1.—6) У малокровныхъ *Феррумъ фосфорикумъ*×2.—7) У слабыхъ женщинъ: *Хина* 3.—8) При кровотеченіяхъ, усиливающихся отъ малѣйшаго движенія: *Сабина* 3.—При всякихъ кровотеченіяхъ—*Гамамелисъ* 1 или въ тинктурѣ, и *Гидрастисъ*×1, черезъ часъ по 5 капель, оказывали прекрасное дѣйствіе. Лѣкарства должно давать болѣе или менѣе часто, смотря по силѣ кровотеченія.

Кровотеченіе изъ пупка (у младенцевъ).

Примочки *Арники*×1, 20 капель на ½ стакана воды, и внутрь *Кроталусъ горридусъ* 30, черезъ 2 часа по 5 крупинокъ.

Кровохарканіе.

При туберкулезномъ изъязвленіи легкихъ.

Если кровотеченіе легочное, то больной ощущаетъ, что у него изъ-подъ ложечки поднимается кверху что-то теплое,

сладковатое, при чемъ появляется боль и жженіе въ груди. Вслѣдъ затѣмъ появляется кашель съ отхаркиваніемъ кровью.

Избѣгать: продолжительнаго громкаго разговора, пѣнія и подниманія большихъ тяжестей, вдыханія пыли, дыма, душевныхъ волненій и т. д.

Лѣченіе: 1) Если крови отдѣляется немного, то принимать *Гамамелисъ*×3, попеременно съ *Арникою* 30 и *Хина* 3, каждыя 5 или 10 минутъ по 3 капли; если послѣдуетъ улучшеніе, то давать лѣкарства рѣже.—2) При кровохарканіи у чахоточныхъ, а именно, когда оно сопровождается чувствомъ жженія въ груди: *Акалифа индика* 3, а иногда и *Миллефоліумъ* 3, черезъ ½—1 часъ по 5 капель въ ложечкѣ ледяной воды. Если подъ руками не имѣется лѣкарствъ, то даютъ больному одну или нѣсколько полныхъ ложекъ *поваренной соли*, которая иногда легко останавливаетъ кровотеченіе.—3) При сильномъ кровотеченіи изъ легкихъ заставляютъ больного проглатывать маленькіе кусочки льду, даютъ ему яичный бѣлокъ, сбитый съ сахаромъ, или соленую воду, или же Сельтерскую воду. Больного слѣдуетъ уложить въ постель, такъ чтобы голова и плечи были довольно высоко приподняты подушками, при чемъ, утѣшивъ и пріободривъ его, посовѣтовать избѣгать всякихъ тѣлесныхъ движеній и разговора. Больной долженъ получать только жидкую и притомъ охлажденную пищу, преимущественно молочную. Всякое теплое питье строго воспрещается. Въ комнатѣ должно быть тихо и прохладно, одѣяло легкое, но достаточно теплое; ноги слѣдуетъ также согрѣвать. Если погода позволяетъ, то открыть окна и вдыхать свѣжій (но не холодный) воздухъ. Перетянуть довольно туго полотенцемъ верхнюю часть (между плечомъ и локтемъ) лѣвой руки, а если это окажется недостаточнымъ, то и правое бедро; наложить на животъ компрессъ, смоченный въ холодной водѣ. Прекрасные результаты получены были отъ пріемовъ черезъ каждыя 10—15 минутъ по чайной ложкѣ *экстракта Гамамелисъ*, въ ½ стаканѣ воды. Растворъ этотъ давать до прекращенія истеченія крови, а затѣмъ еще нѣкоторое время по нѣсколько разъ въ день, для предотвращенія возвратовъ. Кромѣ того полезны: *Ипекакуана* 3, *Хина* 3, *Арника* 3, *Кали карбони-*

кумъ 6.—При сильномъ сердцебіеніи, волненіи крови—*Аконитъ* 3.—Послѣ паденія, сильнаго ушиба и т. д.—*Арника* 3; если при томъ появилась лихорадка, то *Арника* 3 поперемѣнно съ *Аконитомъ* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—При кровохарканіи вслѣдствіе задержки мѣсячныхъ очищеній: *Бріонія* 3, *Пульсатилла* 3, *Фосфоръ* 6.—При кровохарканіи съ тошнотою, и остающемся вкусѣ крови: *Ипекакуана* 3, черезъ часъ по пріему; со слабостью—*Гамамелисъ* 3, *Хина* 3.—При темномъ (венозномъ) кровохарканіи: *Гамамелисъ* 1, *Арника* 3.—При обильномъ кровотеченіи: *Трилліумъ* 3, черезъ 1/4—1/2 часа по пріему.—При упорномъ кровохарканіи: *Фосфоръ* 1, *Хина* 3, *Арсеникъ* 6, а также пить въ видѣ чая слабый *отваръ Милефолія* (тысячелистника).

Кровянистая моча, кровавое мочеиспусканіе.

Причины: Воспаленіе мочевого пузыря, воспаленіе мочеиспускательнаго канала (при трипперѣ), предстательной железы; заболѣванія почекъ; камни и песокъ въ пузырѣ; камни почекъ; цынга, корь, оспа, тифъ, чума, а также бываетъ при употребленіи шпанскихъ мушекъ, терпентиннаго масла, хинина.

Признаки: Окраска мочи въ розовый (цвѣтъ мясныхъ помоевъ), красный, бурый, темный, какъ портеръ, и даже черно-зеленый цвѣтъ. Кровотеченія изъ мочевого пузыря часто соединяются съ болями въ области пузыря, позывомъ къ мочеиспусканію и сильнымъ жиленіемъ во время мочеотдѣленія, при чемъ моча равномѣрно окрашена кровью и лишь послѣднія капли содержатъ чистую кровь. При кровотеченіяхъ изъ почекъ и мочеточниковъ, содержаніе крови въ мочѣ очень значительно и мочеиспусканіе сопровождается коликами, которыя большею частью происходятъ вслѣдствіе камней, при чемъ въ этомъ случаѣ бываетъ жестокая боль послѣ полнаго выдѣленія мочи. При кровотеченіи изъ мочеиспускательнаго канала лишь первыя капли мочи бываютъ окрашены кровью или она непрерывно льется изъ канала.

Лѣченіе: 1) При дергающихъ, жгучихъ боляхъ во время мочеиспусканія: *Кантарисъ* 3.—2) Вслѣдствіе насилія, пораненія, ушиба: *Арника* 3, *Русъ* 3.—3) Вслѣдствіе употребленія горячительныхъ, спиртныхъ напитковъ: *Нуксъ вомика* 3, *Арсеникъ* 6.—4) Вслѣдствіе продолжительнаго полового возбужденія, распутства: *Хина* 3.—5) У стариковъ: *Нуксъ вомика* 3.—6) У старухъ: *Пульсатилла* 3.—7) Вслѣдствіе скрывшихся сыпныхъ кожныхъ болѣзней: *Сульфуръ* 6, *Калькареа карбоника* 6.—8) При отдѣленіи крови каплями послѣ мочеиспусканія: *Мезереумъ* 3.—9) Вслѣдствіе болѣзни почекъ: *Кантарисъ* 3, *Коккусъ какти* 3 попеременно съ *Арникой* 3, *Ликоподіумъ* 6 и *Теребентина* 3.—При всякихъ кровотеченіяхъ изъ мочевого канала принимать *Гамамелисъ*×3.—Пріемъ лѣкарствъ во всѣхъ случаяхъ каждые 2 часа по 5 капель, учащая пріемы по мѣрѣ силы кровотеченія.

Кровяная опухоль головы у новорожденныхъ.

На головѣ новорожденныхъ появляется мягкая, безболѣзненная наполненная кровью опухоль, происходящая вслѣдствіе помятія головки во время родовъ; обыкновенно опухоль эта увеличивается до 8-го дня послѣ рожденія и затѣмъ постепенно опадаетъ. Для скорѣйшаго устраненія этой опухоли слѣдуетъ ежедневно 2—3 раза обмывать его слабымъ *растворомъ Арники*×1, 20 капель на стаканъ воды, и давать ребенку утромъ и вечеромъ по 1 каплѣ *Арника* 3, въ грудномъ молокѣ или отварной водѣ.

Кровавая рвота.

Слѣдствіе круглой или раковой язвы желудка.

Холодные компрессы на желудокъ. Пить воду со льдомъ или глотать маленькіе кусочки льда.

Лѣченіе: 1) Если извергаемая изъ желудка кровь черновата: *Ипекакуана* 3, черезъ 5—10 минутъ по 5 капель.—

2) При болѣзняхъ живота (кишечника) со рвотою кровью и пищею: *Нуксъ вомика* 3.—3) Вслѣдствіе паденія, ушиба и т. п.: *Арника* 3, по 5 капель черезъ 1/4—1/2 часа.—4) При слабости: *Хина* 3.—5) Вслѣдствіе простуды съ изверженіемъ свѣтлокрасной крови и съ судорожными явленіями: *Гіосціамусъ* 3.—При очень сильномъ изверженіи крови и вообще при всякомъ родѣ кровотеченій — *Гамамелисъ* ×1, 20 капель на 1/2 стакана воды, пить глотками каждыя 5 или 10 минутъ.

Крупъ.

Перепончатое воспаленіе слизистой оболочки гортани.

Причины: Простуда, чаще всего въ холодную, вѣтреную погоду, особливо при сѣверныхъ и сѣверо-западныхъ вѣтрахъ. Распространеніе дифтерита на гортань. Наблюдается также при кори, тифѣ и др.

Признаки: Эта воспалительная съ образованіемъ пленокъ болѣзнь гортани поражаетъ преимущественно дѣтей въ возрастѣ отъ 2 — 8 лѣтъ. Предвѣстники: хрипота, сухой, грубый, хриплый, лающій кашель съ лихорадкой. Иногда крупъ появляется внезапно, среди ночи, безъ всякихъ предвѣстниковъ. Дыхательное горло закупоривается постепенно клейкими, слизистами массами (пленками); дыханіе сильно затрудняется; лающій кашель дѣлается подъ конецъ беззвучнымъ и становится похожимъ на пѣніе молодого пѣтуха; ноздри находятся въ усиленномъ движеніи; вдыханіе воздуха совершается медленно, съ большими промежутками, и представляется въ видѣ глубокихъ, тяжкихъ вздоховъ; голова закидывается назадъ; ротъ открытъ; кашлемъ или рвотою извергаются бѣлыя, вязкія, иногда трубкообразныя массы (пленки); лицо становится багровымъ (синекраснымъ); появляется спячка; тѣло больного покрывается холоднымъ клейкимъ потомъ, и если не лѣчить надлежащими средствами, то больной умираетъ черезъ нѣсколько дней (на 3—5 день) отъ задушенія.

Лѣченіе: *Аконитъ* 3 поперемѣнно со *Спонгіей* 3, черезъ 1/4—1/2 часа по 3—5 капель на ложечку тепловатой воды;

давать до наступленія улучшенія, т.-е., пока кашель не сдѣлается болѣе рыхлымъ, мокрымъ. Если по истеченіи 12-ти часовъ не послѣдовало улучшенія и припадки удушья такъ же часты и сильны, то нужно давать такимъ же образомъ *Бромъ* 3 (въ свѣжемъ водномъ растворѣ) попеременно черезъ 1/4—1/2 часа съ *Іодіумомъ* 3, а по прекращеніи явленій, грозящихъ опасностью, слѣдуетъ снова давать *Спонгія*×3, но лишь черезъ 2—3 часа по 3 капли, до того времени, пока звукъ кашля не сдѣлается болѣе естественнымъ и не исчезнетъ хрипота. Какъ только свистящее дыханіе замѣнится болѣе влажными (слизистыми) хрипами, то слѣдуетъ давать *Спонгію* попеременно съ *Гепаръ сульфурисъ* 3, черезъ 2 часа по 3 капли и по костяной ложечкѣ. — Если всѣ эти средства не облегчаютъ кашля, то *Фосфоръ* 3, окажется весьма полезнымъ.—Лица, имѣющія у себя ингаляціонный аппаратъ или пульверизаторъ, могутъ дѣлать больному вдыханія паромъ *Брома* или *Іода*. На горло кладутъ *пластырь изъ Евфорбіи* (молочая), который можно пріобрѣсти въ любой аптекѣ; пластырь этотъ не снимаютъ до тѣхъ поръ пока кожа на горлѣ не покраснѣетъ или пока не образуется на ней пузырь. Если больному грозитъ опасность задушенія, то нужно посадить его въ очень теплую ванну (30° R.) и поливать сзади голову и спину холодною водою (20° R.). Это вызываетъ весьма часто отхаркиваніе клейкихъ крупозныхъ массъ, засѣвшихъ въ горлѣ. При этомъ слѣдуетъ растирать хорошенько шею и грудь. Можно также щекотать въ горлѣ бородкою пера, съ цѣлью вызвать рвоту. Только въ крайнемъ случаѣ даютъ больному черезъ каждую четверть часа по костяной ложечкѣ *Тартарусъ эметикусъ* 1-го растиранія, въ ложечкѣ теплой воды, до появленія рвоты. При рыхломъ, слизистомъ кашлѣ, остающемся въ теченіе нѣкотораго времени послѣ крупа, хорошо дѣйствуетъ *Гепаръ сульфурисъ* 3, черезъ каждые три часа по костяной ложечкѣ или въ такомъ количествѣ, сколько его помѣстится на кончикѣ перочиннаго ножика. Въ этихъ же случаяхъ можно посовѣтовать и *Фосфоръ* 8. При оставшейся послѣ крупа охриплости: нѣсколько пріемовъ въ день *Кали іодатумъ* 2. Послѣ крупа

ребенка слѣдуетъ въ теченіе еще нѣкотораго времени оберегать отъ холоднаго воздуха и закалять его ежедневными холодными обтираніями.

Ложный крупъ, хотя и выражается совсѣмъ подобными явленіями, тѣмъ не менѣе составляетъ вовсе не опасную болѣзнь гортани. При немъ наблюдается также хриплый, лающій кашель, появляющійся внезапно ночью, лихорадка и затруднительное дыханіе, которыя, однако, быстро проходятъ. Достаточно положить на горло согрѣвающій компрессъ, давать пить *теплое молоко* или *чай изъ липоваго цвѣта* съ жженымъ сахаромъ (леденцомъ) и кромѣ того *Аконитъ* 3 поперемѣнно, черезъ 1/2 часа, со *Спонгія* 3.

Лихорадка гастрическая, гастритъ.

Острое воспаленіе слизистой оболочки желудка.

Причины: Простуда; обремененіе желудка; употребленіе холодныхъ напитковъ при сильно разгоряченномъ тѣлѣ; гнѣвъ, досада, душевныя волненія и т. д.

Признаки: Жаръ, знобъ, дрожь, усталость, разбитость въ членахъ; головная боль; безсонница и безпокойный сонъ; давленіе и чувство переполненія въ подложечной впадинѣ; обложенный языкъ, отрыжка, отсутствіе аппетита, жажда, дурной запахъ изо рта; обыкновенно запоръ, но иногда и поносъ; моча большею частью темная, съ осадкомъ. Продолжительность болѣзни 8—14 дней.—Отъ этого вида лихорадки слѣдуетъ отличать другой видъ ея,—такъ называемую слизистую лихорадку, при которой появляется рвота, а съ испражненіями выдѣляется большое количество слизи. Эта болѣзнь затягивается надолго, и больные значительно теряютъ при ней силы.—Бываетъ еще третья форма этой болѣзни, извѣстная подъ названіемъ желчной лихорадки, характеризующейся сильнымъ жаромъ, частымъ бредомъ, горькою отрыжкою и рвотою желчью, болью въ области печени при давленіи, желтизною лица и глазъ, чрезвычайно темною мочею. По истеченіи 8—14 дней болѣзнь оканчивается поносами.

Лѣченіе: теплыя ванны; согрѣвающіе компрессы. Діэта: легкіе супы, вареные плоды, преимущественно разваренныя яблоки; рисовая вода; холодная вода не всегда переносится больными. Только послѣ полнаго очищенія языка отъ налета и появленія аппетита, можно осторожно перейти къ другой, легко перевариваемой пищѣ, иначе болѣзнь можетъ затянуться надолго.—1) При горькой отрыжкѣ, боли въ членахъ, запорѣ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, по 3 раза въ день по 5 капель, или *Гельземинумъ* 3 попеременно съ *Бріонія* 3.—2) При тошнотѣ, рвотѣ желчью, вздутіи живота: *Нуксъ вомика* 3, *Ипекакуана* 3.—3) При сильной жаждѣ, истощающихъ поносахъ, дурномъ запахѣ изо рта: *Арсеникъ* 6.—4) При густо обложенномъ языкѣ, головокруженіи, помраченіи сознанія, бредѣ, нервныхъ явленіяхъ, вонючихъ испражненіяхъ: *Баптизія* × 3. — 5) При желтизнѣ кожи, рвотѣ желчью, давленіи въ правомъ подреберіи, чувствительности желудка и слизистыхъ поносахъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—6) При слизистой лихорадкѣ: *Пульсатилла* 3, *Калькареа карбоника* 3, *Фосфоръ* 6.

Лихорадка при прорѣзываніи зубовъ у дѣтей.

Признаки: Лихорадочныя явленія усиливаются къ вечеру; у дѣтей появляются жажда, жаръ, короткое дыханіе, иногда вздрагиваніе во время сна и судороги.

Лѣченіе: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3 въ водѣ, черезъ часъ, попеременно, по 5 капель, а потомъ, когда лихорадка уменьшится, черезъ 2—3 часа. На третій день болѣзни дать утромъ и вечеромъ по 1 пріему *Калькареа карбоника* 30.

Лихорадка перемежающаяся или болотная. Малярія.

Болѣзнь вызывается болотными міазмами (злокачественными испареніями) и заключается въ періодически смѣняющихся приступахъ озноба и жара.

Признаки: Приступы лихорадки, повторяющіеся черезъ правильные промежутки времени, каждый день или черезъ день, черезъ два и т. д., и состоящіе въ чередованіи дрожи или озноба, жара и пота. Моча и послѣ приступа (пароксизма) кирпично-краснаго цвѣта. Во время приступа бываетъ иногда сильная головная боль, усталость и разбитость, рвота, колотье въ области селезенки и печени.

Лѣченіе: Для утоленія жажды пить, вмѣсто холодной воды, красное вино, разбавленное отварною водою. Воспрещается въ лихорадочной мѣстности пить сырую воду, оставаться на воздухѣ послѣ захода солнца, спать на открытомъ воздухѣ, на землѣ; избѣгать простуды, всякой жирной пищи, а также сырого молока и рыбы. Слѣдуетъ носить теплую одежду и въ хорошую солнечную погоду гулять и упражняться на чистомъ воздухѣ въ сухой мѣстности. Съ другой стороны, необходимо избѣгать влажнаго и испорченнаго воздуха.

Внутрь давать: Въ свѣжихъ случаяхъ обыкновенной перемежающейся лихорадки, бывающей черезъ день или каждый день, давать *хининъ* послѣ полнаго прекращенія пароксизма, взрослымъ отъ 3 до 5 гранъ, а дѣтямъ отъ 5 до 10 гранъ 1-го десятичнаго растиранія; и такимъ образомъ продолжать пріемы, ежедневно или черезъ день, смотря по типу лихорадки, въ теченіе 7 или 15 дней, даже и послѣ прекращенія пароксизмовъ.—1) При увеличеніи печени и селезенки, большой слабости, одутловатости лица, сильной жаждѣ: *Арсеникъ* 3 и *Аконитъ* × 3, каждые 2 часа по 5 капель попеременно.—2) При продолжительномъ ознобѣ, сильной головной боли, большой жаждѣ, сухости языка и отсутствіи аппетита: *Натрумъ муріатикумъ* 6 попеременно съ *Аписъ* 6, каждые 2 часа по 3 капли.—3) При ощущеніи давленія на желудокъ, при языкѣ, покрытомъ бѣлымъ налетомъ, запорѣ, раздражительности: *Нуксъ вомика* 3.—4) При колотіи въ боку, оставшемся послѣ излѣченія лихорадки: *Фосфоръ* 6 и *Бріонія* 3, по 2 раза въ день по 3 капли или 5 крупинокъ.—5) Если приступы возвѣщаются чувствомъ общаго нездоровья и разбитости, съ преобладающимъ желудочнымъ разстройствомъ, и сопро-

вождаются головною болью, невралгическою болью въ спинѣ и ногахъ, онѣмѣніемъ и сонливостью, при чемъ приложеніе внѣшней теплоты непріятно и вызываетъ дрожь: *Баптизія* 1 и *Бріонія*×3, черезъ 2 часа по 5 капель, и какъ питье — *Белладонна* 3, 20 капель на стаканъ воды, пить глотками. Кромѣ того, могутъ быть полезны: *Ипекакуана* 3, *Русъ* 3 и *Гельземинумъ* 3.

Лихорадка простудная.

Признаки: Жгучій жаръ съ предшествующимъ ознобомъ; ускоренный пульсъ; учащенное дыханіе; чувство разбитости въ членахъ; головная боль; темная, мутная моча. Лихорадка усиливается къ вечеру и уменьшается къ утру.

Лѣченіе: Больной долженъ лечь въ постель и не слишкомъ прикрываться теплыми одѣялами. Температура спальни не должна превышать 13 градусовъ Реомюра.

Діэта: Легкіе супы и вареные плоды (компоты); свѣжая вода или вода съ фруктовымъ сокомъ; лимонадъ. При поносѣ—слизистое питье. Нужно постараться вызвать потъ посредствомъ обертыванія больного въ мокрую, холодную простыню, поверхъ которой онъ укутывается въ большое шерстяное одѣяло. Паровая баня; теплыя ванны въ 28 градусовъ Реомюра.

Внутрь давать: Главнымъ средствомъ *Аконитъ* 3, въ частыхъ пріемахъ (по 5 капель на пріемъ, черезъ 1—2 часа). Если при этомъ боли въ членахъ: *Аконитъ* 3 попеременно съ *Бріоніей* 3 или *Русъ* 3, черезъ 1—2 часа по 5 капель; при красномъ, пылающемъ лицѣ,—какъ питье, *Белладонна* 3, по 30 капель на стаканъ.

Лицевая боль.

Невралгія личнаго нерва, tic douloureux.

Признаки: Нервная болѣзнь. Сильныя дергающія, сверлящія боли, большею частью надъ глазомъ, а иногда подъ

глазомъ. Боли то временно прекращаются, то возвращаются еще съ большею силою. Болѣзнь можетъ сдѣлаться длительною и въ такомъ случаѣ трудно излѣчивается.

Діэта: не употреблять ни кофе, ни спиртныхъ напитковъ.

Лѣченіе: Компрессы изъ горячей воды. Втираніе въ болѣзненныя мѣста *Тинктуры Аконита* или *Вербаскумъ* Θ.

Внутрь: 1) При лицевой боли, вслѣдствіе простуды, съ колющими, стрѣляющими, рвущими болями, краснымъ и горячимъ лицомъ, жаждою, безпокойствомъ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, черезъ 1—2 часа, попеременно, по 5 капель. Нерѣдко быстро помогаетъ попеременное употребленіе черезъ 1/2 часа по 5 капель *Аконита* 3 и *Арники* 3; если же боль исходитъ отъ испорченнаго зуба, то *Аконитъ* 3 и *Бріонія* 3.—2) При усиленіи боли отъ движенія и трясенія головою, при бьющихъ, какъ бы молотомъ, боляхъ и шумомъ въ ушахъ: *Феррумъ фосфорикумъ* 6 попеременно черезъ часъ съ *Магнезія фосфорика* 6.—3) При рвущихъ, сверлящихъ боляхъ, появляющихся въ *правой сторонѣ* лица, преимущественно ночью, и соединенныхъ со слезотеченіемъ: *Платина* 6 и *Камомилла* 3, черезъ 1/4—1/2 часа по 5 капель, а если эти боли уменьшаются отъ холода, то *Кальмія* 3.—5) При приливахъ крови къ головѣ, головокруженіи днемъ, усиленіи болей отъ холода, уменьшеніи ихъ отъ теплоты: *Гельземинумъ* 3 и *Страмоніумъ* 3.—6) При боляхъ въ лѣвой сторонѣ лица съ сердцебіеніемъ, при усиленіи ихъ отъ движенія и шума: *Спигелія* 6, *Колоцинтисъ* 6.—7) Кромѣ того рекомендуются: *Арсеникъ* 6, *Хина* 1, попеременно съ *Белладонна* 3, *Игнація* 3 или *Нуксъ вомика* 3. Въ застарѣлыхъ случаяхъ: *Силицеа* 6. Противъ невралгій, какъ болеутоляющее, очень хорошо дѣйствуетъ *Цинкумъ валеріаникумъ* 1.

Лишаи.

Подъ этимъ названіемъ подразумѣваютъ различныя кожныя болѣзни, которыя поражаютъ отдѣльныя части тѣла и бываютъ часто очень упорны. Одними внутренними сред-

ствами не всегда можно достигнуть ихъ излѣченія. Съ другой стороны, замазывать лишаи крѣпкими мазями, въ особенности ртутными, не слѣдуетъ.

Необходимо содержать тѣло въ большой чистотѣ, опрятности и не расчесывать кожу. Употреблять для мытья чистое *Арниковое мыло*. Еженедѣльно дѣлать нѣсколько теплыхъ ваннъ, при чемъ въ употребляемую для этого воду можно положить крахмалъ, отъ 2 до 4 фунтовъ на ванну. Смазывать, въ особенности зудящіе лишаи, мазью, приготовленною изъ 10 капель *Арсеникъ*×3 на 1 унцъ свѣжаго свиного сала или чистаго американскаго вазелина. Смазывать раза 3—4 въ день.

Діэта: Легкая, не возбуждающая, преимущественно растительная пища. Жирныя, кислыя, тяжелыя, приправленныя перцемъ, горчицею, корицею и т. п. кушанья воспрещаются. Яблочные мусы, компоты и т. п. очень полезны.

Лѣченіе: I) **Лишай бороды.** Съ цѣлью разрушенія грибковъ, смазываютъ пораженныя болѣзнью мѣста кисточкою, смоченною въ растворѣ *Меркуріусъ коррозивусъ* × 2, капель 15 на 10 столовыхъ ложекъ воды, или растворомъ *Фосфора* × 3, 1 часть на 10 частей *миндальнаго масла*. Внутрь принимать: *Арсеникъ* 3, *Графитъ* 3, одну недѣлю, по 2 раза въ день по 3 капли и по костяной ложечкѣ; другую недѣлю—*Гепаръ сульфурисъ* × 3 и *Меркуріусъ преципитатусъ руберъ* 3, такъ же.

II) **Пузырчатая сыпь:** *Графитъ* 3 и *Русъ* 3 или *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 и *Мезереумъ* 6, каждые 2 часа по 5 капель и по костяной ложечкѣ. Иногда *Дулькамара* 3 поперемѣнно съ *Клематисъ* 3 также хорошо помогаетъ. Пузырчатая сыпь у грудныхъ младенцевъ часто бываетъ очень упорна: *Ранункулюсъ бульбозусъ* 3 и *Меркуріусъ преципитатусъ руберъ* 3, по 2 — 3 раза въ день по 1 каплѣ и $^1/_2$ ложечки.

III) **Узелковый или простой лишай** (который не гноится и не мокнетъ и не превращается въ язвы): *Сульфуръ* 3, *Калькареа карбоника* 6 и *Силицеа* 6, поперемѣнно черезъ день одно за другимъ, утромъ и вечеромъ по 2 капли.

IV) **Отрубевидный лишай** (часто на головѣ). Обмывать голову 2 раза въ день теплою мыльною водою и втирать затѣмъ мазь, состоящую изъ 2 граммовъ *Сульфуръ* 1-го десятичнаго растиранія и 10 граммовъ *вазелина*. Внутрь: *Сульфуръ* 6, *Графитъ* 6, *Сепія* 6, *Туя* 3, каждое порознь, 2 раза въ день по 3 капли.

V) **Чешуйчатый лишай** (бѣлыя, перламутрово-блестящія кучки чешуекъ на покраснѣвшей и легко кровоточащей кожѣ). Смазывать пораженныя мѣста *сѣрнымъ спиртомъ*, состоящимъ изъ смѣси 1 грамма сѣрнаго цвѣта съ 10 граммами спирта. Внутрь: *Сульфуръ* 1, *Арсеникъ* 3, *Сепія* 3 и *Ацидумъ нитрикумъ* 3, каждое порознь, въ теченіе одной недѣли, утромъ и вечеромъ по 2 капли. При сильно зудящемъ чешуйчатомъ лишаѣ: по 1 пріему *Сульфуръ* 30 утромъ и *Меркуріусъ солюбилисъ* 30 вечеромъ, въ теченіе 8 дней, послѣ чего сдѣлать продолжительную паузу, а затѣмъ принимать *Калькареа карбоника* 30.

VI) **При лишаяхъ на лицѣ**: *Графитъ* 6, *Ледумъ* 3, *Сульфуръ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, каждое порознь.

VII) **При мокнущемъ лишаѣ** (экземѣ) на ушахъ: *Креозотъ* 3, *Графитъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель.

VIII) **При лишаяхъ на губѣ**: *Белладонна* 3, *Арсеникъ* 3, *Русъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.

IX) **При мокнущемъ лишаѣ на рукахъ**: *Графитъ* 6.

X) **При сухомъ лишаѣ на ладоняхъ**: *Каустикумъ* 3, *Калисульфурикумъ* 6.—Когда при этомъ образуются трещины кожи: *Калькареа флуорика* ×6 растиранія.

XI) **При лишаѣ на половыхъ частяхъ**: у женщинъ—*Сульфуръ* 3, *Ацидумъ нитрикумъ* 3, *Сепія* 3; у мужчинъ, на мошонкѣ съ зудомъ—*Аурумъ муріатикумъ* 3, *Гепаръ сульфурисъ* 3.—Лишай у задняго прохода: *Сепія* 3.

XII) **При кольцевидномъ или кольчатомъ лишаѣ**: *Сульфуръ* 3 и *Мезереумъ*×1, черезъ день, утромъ и вечеромъ по 3 капли въ ложечкѣ воды.

XIII) Если лишаи не проходятъ отъ означенныхъ здѣсь средствъ, то слѣдуетъ принимать въ теченіе продолжительнаго времени *Сульфуръ* 30, *Калькареа карбоника* 30 и *Ли-*

іоподіумъ 30, по 8 дней каждое, дѣлая послѣ 8-ми-дневнаго пріема каждаго изъ лѣкарствъ двухнедѣльную паузу.

XII) **Лишай опоясывающій** или **поясной** (herpes zoster).

Признаки: лихорадка; красное, воспаленное пятно на одной сторонѣ грудной клѣтки или области живота; на этомъ пятнѣ образуются сильно болящіе маленькіе пузырьки. Подобная же сыпь можетъ появиться и на другихъ частяхъ тѣла.

Лѣченіе: смазывать пораженныя мѣста *вазелиномъ* съ прибавленіемъ *Арсеникъ*×3 (10 капель на ложечку); тепловатыя мыльныя ванны; присыпать сыпь рисовою пудрою и покрыть ее гигроскопическою ватою.—При высыпаніи сыпи: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 поперемѣнно съ *Аписъ* 3, черезъ 2 часа по ложечкѣ и по 3 капли.—При жгучихъ болях: *Русъ* 3 поперемѣнно съ *Арсеникъ* 3, такъ же.—При глубокосидящихъ коркахъ (струпьяхъ): *Графитъ* 6, 4 раза въ день по 3 капли. Если струпья чешутся, то *Мезереумъ*×3, черезъ 2 часа по 3 капли.

Матки опухоли.

Необходимо врачебное изслѣдованіе половыхъ органовъ, такъ какъ иногда нельзя обойтись безъ операціи.

Лѣченіе: Утромъ и вечеромъ, въ теченіе продолжительнаго времени, давать *Калькареа карбоника* 6 и *Коніумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.

Мигрень.

Половинная головная боль.

Причины: Наслѣдственность, сидячая жизнь, умственное переутомленіе, злоупотребленіе чаемъ, кофе и спиртными напитками. Отъ желудка. Усиленіе припадка вызывается простудою, нервнымъ возбужденіемъ, досадою; у женщинъ—регулами и т. д.

Признаки: Болитъ половина головы, встрѣчается преимущественно у женщинъ и часто повторяется у нихъ черезъ

каждыя 4 недѣли; а у мужчинъ чаще, черезъ 8—14 дней. Часто приступы мигрени останавливаются на нѣсколько мѣсяцевъ и затѣмъ опять возвращаются. Предвѣстниками приступовъ бываютъ обыкновенно: зѣвота, дрожь, худое расположеніе духа. Давящія, сверлящія боли въ головѣ, большею частью односторонніе. Большая раздражительность къ слуховымъ и зрительнымъ впечатлѣніямъ. Больной охотно уединяется. Тошнота, рвота пищею или горькою зеленоватою жидкостью. Послѣ сна улучшеніе. Приступы длятся отъ 6 до 24 часовъ.

Двѣ формы: или больная половина лица—покраснѣвши, слегка припухши, глазъ красенъ, слезится, сосуды напряжены, переполнены кровью и бьются сильнѣе, чѣмъ на здоровой половинѣ; или, напротивъ, больная сторона блѣднѣе здоровой, сосуды съужены, кожа похолодѣвшая.

Вспомогательныя мѣры: Расположенные къ мигрени должны остерегаться простуды, умственнаго переутомленія, нравственныхъ волненій и погрѣшностей въ діэтѣ. Страдающіе приливами крови къ головѣ должны дѣлать побольше движенія и избѣгать горячительныхъ напитковъ. Пища должна быть легкая, нераздражающая. Для малокровныхъ полезны холодныя обтиранія. Лѣтомъ купанье или холодныя ванны. Легочная гимнастика (прогулки или умѣренныя восхожденія по горамъ и лѣстницамъ, при чемъ дѣлать глубокія вдыханія воздуха). Во время приступа: холодные компрессы на лобъ и виски, лежать въ полномъ покоѣ.

При первой, приливной формѣ мигрени показано примѣненіе: *Белладонна* 3 и *Глоноинъ* 3, попеременно; при второй отливной формѣ: *Гельземинъ* 3; при желудочной—*Нуксъ вомика* 6, *Пульсатилла* 3.

Лѣченіе: 1) Если боль идетъ отъ затылка и останавливается около одного глаза и при этомъ чувствуется слабость, тяжесть въ головѣ до безпамятства: *Гельземинъ* 30, утромъ и вечеромъ по 5 капель или 5 крупинокъ (принимать продолжительное время).—2) При лѣвосторонних колющихъ, рвущихъ боляхъ: *Спигелія* 6, черезъ 1—2 часа по 5 капель.—3) Если причиною болѣзни—испугъ, горе, нервное разстрой-

ство: *Игнація* 3, черезъ 1/2—1 час. по 5 капель.—4) При отсутствіи сна: *Белладонна* 3, 2 пріема на ночь по 5 капель черезъ 1/2 часа.—5) При запорѣ и геморроѣ—*Нуксъ вомика* 6, по 5 капель черезъ 2 часа.—6) При малокровіи: *Пульсатилла* 3 попеременно съ *Феррумъ карбоникумъ* 6.—7) Если замѣчается необыкновенная чувствительность головы, каждое движеніе и волненіе усиливаетъ боли, и боли начинаются съ самаго утра, то давать *Арника* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—8) Если боли вызваны разстройствомъ пищеваренія—*Ипекакуана* 3, черезъ 2 часа.—9) Когда мигрень появляется послѣ обѣда или вечеромъ: *Колоцинтисъ* 3, черезъ 2 часа.—10) У женщинъ, подверженныхъ женскимъ болѣзнямъ, страдающихъ тяжестью и вздутіемъ живота, съ желтовато-блѣднымъ лицомъ, красновато-желтыми пятнами на кожѣ и съ дурнымъ запахомъ отъ потѣнія ногъ и подъ мышками: *Сепія* 6, утромъ и вечеромъ по 3 капли.—11) При какъ бы роющихъ, стучащихъ болях, тошнотѣ, чувствѣ холода, рвотѣ съ утра—*Сангвинарія* 3 попеременно съ *Цимицифуга* 3, черезъ 2 часа по 3 капли.—12) При лѣченіи хронической формы мигрени даютъ: *Калькарея карбоника* 30 и *Сепіа* 30, въ рѣдкихъ пріемахъ (по 1 пріему черезъ день каждое), или *Никколумъ сульфурикумъ*×1 растираніе, утромъ и вечеромъ по 1 костяной ложечкѣ, и повторять пріемъ черезъ каждыя 2 недѣли. Это средство даютъ обыкновенно послѣ приступа мигрени и повторяютъ, какъ выше было сказано. Бобовый кофе безусловно воспрещается (можно пить только питательный гомеопатическій кофе, приготовляемый въ аптекѣ О-ва Врачей Гомеопатовъ). Иногда хорошо помогаетъ 1 пріемъ *Натрумъ муріатикумъ*: 1 костяная ложечка въ чайной ложкѣ воды.

Мозга воспаленіе.

а) Воспаленіе оболочекъ головнаго мозга. Должно лѣчить подъ руководствомъ врача.

Причины весьма различны: ударъ, ушибъ, паденіе на голову; сильное дѣйствіе жары на голову, напр., солнечныхъ

лучей; сильная простуда, прорѣзываніе зубовъ, костоѣда височныхъ костей (всего чаще внутренняго уха), рожа покрововъ головы. Она является также послѣдствіемъ тяжкихъ заболѣваній при тифѣ, острыхъ сыпяхъ, гнойномъ разложеніи крови и т. д.

Признаки: Сильная лихорадка; головная боль, чрезвычайная раздражительность зрѣнія и слуха, такъ что больной не выноситъ ни свѣта, ни малѣйшаго шума; безпокойство; дрожаніе; судороги, которыя наступаютъ все чаще и чаще; бредъ; потеря сознанія; параличъ отдѣльныхъ мышцъ; косоглазіе; неравномѣрность зрачковъ; безсонница, чередующаяся съ забытьемъ; рвота, которая бываетъ постояннымъ явленіемъ въ теченіе всей болѣзни, и потому представляется вѣрнымъ ея признакомъ; запоры; нерѣдко общій параличъ. Хорошими предвѣстниками считаются: спокойный, подкрѣпляющій сонъ и теплая испарина; а дурными—параличныя явленія.

Діэта: свѣжая вода; молоко, разбавленное водою; нежирный бульонъ; плоды.—Комната должна быть затемнена. Большое спокойствіе.

Лѣченіе: Сначала *холодные компрессы* на голову. *Завертыванія* всего тѣла въ согрѣвающій влажный компрессъ, съ цѣлью вызвать потъ.

Внутрь: 1) Вначалѣ: *Аконитъ* 3 поперемѣнно черезъ 1/2 часа по 5 капель съ *Белладонна* 3 или съ *Гельземиномъ* 3. Равнымъ образомъ бываетъ полезенъ *Аписъ* 3, преимущественно, когда воспаленіе это появилось при сыпныхъ болѣзняхъ. Съ другой стороны, проф. Кафка совѣтуетъ давать съ самаго начала болѣзни *Кали-іодатумъ* 2: отъ назначенія этого средства поперемѣнно съ *Гельземиномъ* 3 или *Аписомъ* 3 получались очень хорошіе результаты.—2) Если появится у больныхъ сонливость и полное безучастіе къ окружающему, а также если они иногда испускаютъ пронзительные крики (во 2-мъ періодѣ болѣзни): *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 1—2 часа по 5 капель. Въ томъ же періодѣ болѣзни бываютъ полезны: *Кали іодатумъ* 2 и *Калькареа фосфорика* 3, а затѣмъ—*Тар-*

тарусъ эметикусъ 3.—3) При появленіи судорогъ: *Гіосціамусъ* 3 и *Цинкумъ* 6, или *Страмоніумъ* 3 и *Купрумъ* 6, каждые 1|2—1 часъ по 3 капли.—4) Если болѣзнь произошла вслѣдствіе насилія, удара, ушиба и т. п.: *Арника* 3 попеременно съ *Тартарусъ эметикусъ* 6.—5) Вслѣдствіе солнечнаго жара: *Камфора* 1, черезъ каждыя 10 минутъ по 2—3 капли на сахарѣ, а потомъ: *Глоноинъ* 3. Прекрасное дѣйствіе въ этихъ случаяхъ оказываетъ также и *Гельземинумъ* 1.—6) При пузырчатой рожѣ: *Кантарисъ* 3, *Русъ* 3, черезъ 1 часъ по 5 капель; а при гладкой рожѣ: *Белладонна* 3, *Аписъ* 3.—7) Если болѣзнь вызвана прорѣзываніемъ зубовъ: *Аконитъ* 3 попеременно съ *Белладонною* 3, а также *Гельземинъ* 3, черезъ 1—2 часа поочередно; а при судорогахъ: вмѣсто *Аконита—Цинкумъ* 6.

б) **Воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга** (или **затылочная судорога**—эпидемическій церебро-спинальный менингитъ). Болѣзнь эта появляется почти всегда эпидемически и начинается сильнѣйшею головною болью, преимущественно въ задней части головы, рвотою, лихорадкою, часто съ потрясающимъ ознобомъ. Вскорѣ затѣмъ появляется боль въ затылкѣ и его неподвижность; боль въ спинѣ и крестцѣ, а также общее болѣзненное ощущеніе и потеря сознанія. Далѣе могутъ послѣдовать судороги ногъ и сведеніе челюстей, общія конвульсіи, тяжкія пораженія глазъ и ушей, кончающіяся слѣпотою и глухотою, параличъ рукъ и ногъ, сыпь, похожая на скарлатинную, опухоль суставовъ и, въ неблагопріятныхъ случаяхъ, апатія или бредъ, сонливое, безсознательное состояніе, сильное повышеніе температуры тѣла, похолодѣніе конечностей.

Лѣченіе: Сначала *Никотинъ*×4, а при дальнѣйшемъ развитіи болѣзни *Вератрумъ вириде* 3, попеременно съ *Арсеникумъ* 6. Давать лѣкарства черезъ 2 часа, а въ опасныхъ случаяхъ—черезъ 1/4—1/2 часа до улучшенія. Рекомендуется также при этой болѣзни и оцѣпенѣлости затылка *Атропинъ сульфурикумъ* 2, черезъ 10 минутъ по 1 каплѣ на пріемъ.

Мозга головного сотрясеніе.

Послѣдствіе удара, ушиба, паденія съ высоты и пр.

Покойное положеніе въ постели; избѣгать всякаго возбужденія и волненія. Клистиры изъ холодной воды. Компрессы на голову изъ раствора *Арники* въ холодной водѣ (1 : 10 ч.).

Внутрь: *Арника* 2, черезъ два часа по 5 капель или 5 крупинокъ.

Діэта: Молоко, бульонъ, супы съ крупою, овсянка, кашицы и т. д.

Мозоли.

Причины: слишкомъ узкая обувь; ходьба по неровной каменной мостовой и т. п.

Лѣченіе: носить совершенно свободную обувь. *Способъ Гейтцмана.* Послѣ теплой (въ 32—34°) ножной ванны, надавливаютъ двумя пальцами лѣвой руки кожу, окружающую мозоль, внизъ и внутрь, вслѣдствіе чего мозоль поднимается настолько вверхъ, что ее легко можно выдавить или вырѣзать вогнутыми ножницами, которыя слѣдуетъ при этомъ сильно нажать, для того чтобы онѣ могли поглубже захватить мозоль. Послѣ неоднократнаго повторенія такой операціи, мозоль, наконецъ, совсѣмъ исчезаетъ, безболѣзненно и безъ потери крови. *Другой способъ*: Взять изъ гомеопатической аптеки *Туйолинъ*, смазывать имъ ежедневно мозоль раза 3—4, посредствомъ кисточки, при чемъ слѣдуетъ дѣлать нѣсколько разъ въ недѣлю теплую ножную ванну. При аккуратномъ размягченіи мозоли и смазываніи ея, мозоль легко удаляется посредствомъ тупого ножика или даже пальцами.—Равнымъ образомъ можно удалить мозоль частымъ смазываніемъ его *концентрированною уксусною кислотою* (по рецепту врача), а также посредствомъ *мыльнаго пластыря*, намазаннаго на кусочкѣ бумаги, и затѣмъ прикладываемаго къ мозоли, которая отъ этого размягчается

и послѣ легко и безъ боли можетъ быть удалена.—Противъ сильныхъ болей, вызываемыхъ мозолями, помогаетъ ношеніе маленькихъ, накладываемыхъ на нихъ *кружечковъ*, которые можно пріобрѣсти въ аптекахъ или аптекарскихъ магазинахъ. Отъ болей въ мозоляхъ, появляющихся при каждой перемѣнѣ погоды, нужно принимать *Русъ* 3, черезъ 2 часа по каплѣ.

Молока обиліе.

Избытокъ молока у кормилицъ и матерей, по отнятіи младенца отъ груди, или у роженицъ, которымъ не дозволено кормленія грудью, устраняется легко, если давать аккуратно *Кали гидроіодикумъ* × 1, по 5 капель 3 раза въ день, при чемъ на груди положить согрѣвающій компрессъ и туго забинтовать.

Морская болѣзнь.

Морская болѣзнь есть довольно мучительное разстройство, но опасности въ большинствѣ случаевъ не представляетъ никакой. При большой продолжительности она можетъ развить разныя органическія страданія, какъ припуханіе печени и селезенки, гастрическую лихорадку и т. п. Нѣкоторые люди вовсе не подвержены морской болѣзни, другіе же, напротивъ, заболѣваютъ каждый разъ, какъ только ѣздятъ по морю. Болѣзнь заключается въ общемъ недомоганіи, позывахъ на рвоту, головной боли и головокруженіи и боязни смотрѣть на воду; вызывается качкою корабля или еще болѣе качкою парохода, соединенною съ толчками при движеніи его. У нѣкоторыхъ страданія продолжаются 2—3 часа, у другихъ же прекращаются только тогда, когда больной ступитъ опять на землю.

Самымъ лучшимъ предохранительнымъ средствомъ отъ морской болѣзни служитъ *Кокулюсъ* 3: оно всегда помогало людямъ, которые не были въ состояніи вынести качку,

въ особенности нѣжнымъ субъектамъ женскаго пола. Какъ можно больше быть на свѣжемъ воздухѣ, на палубѣ и по возможности помѣщаться на серединѣ палубы, гдѣ качка не такъ чувствительна. Какъ можно больше пересиливать себя и при наступленіи рвоты и проч. стараться ходить взадъ и впередъ. Прежде чѣмъ сѣсть на корабль, совѣтуютъ поѣсть, такъ какъ находящаяся въ желудкѣ пища значительно облегчаетъ рвоту.

Лѣченіе: 1) Очень сильное томленіе, тревога, водянистый поносъ, блѣдный цвѣтъ лица: *Арсеникъ* 6 черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа по 2 капли.—2) Рвота водою и слизью, жаръ и сжиманіе передней части головы, холодныя руки и ноги: *Петролеумъ* 3 и *Нуксъ-вомика* 3, поперемѣнно черезъ $^1/_2$ часа по 2—3 капли.—3) Сильныя головныя боли: *Сепія* 3, черезъ 1 часъ по 2 капли. Очень хорошимъ средствомъ отъ морской болѣзни служитъ *Глоноинъ* 1, одну каплю или 3—5 крупинокъ на языкъ во время приступа (но это средство отпускается только по рецепту врача).

Рекомендуется во время морскихъ путешествій положить на животъ пропускную бумагу, смоченную коньякомъ, ромомъ или просто водкою и забинтовать животъ настолько туго, чтобы это не мѣшало свободнымъ движеніямъ.

Мочевого пузыря воспаленіе.

Простое катарральное и заразное (трипперное).

Причины: Простуда, промоченіе ногъ, задержаніе мочи, употребленіе молодого пива и молодого вина, очень холоднаго (виноградnаго сусла), мочевые камни и т. д. Зараженіе гонококками.

Признаки: Лихорадка, тупая, давящая боль внизу живота въ области мочевого пузыря, имѣющая иногда судорожный характеръ и увеличивающаяся отъ давленія на нижнюю часть живота; безпрестанный позывъ къ мочеиспусканію съ отдѣленіемъ небольшого количества мочи; моча яркокраснаго цвѣта, даже кровяниста, а позднѣе содержитъ слизистый осадокъ. Воспаленіе мочевого пузыря излѣчи-

вается въ 8—14 дней или же принимаетъ хроническое (длительное) теченіе.

Діэта: Ячменный супъ, овсянка, молоко, миндальное молоко. Воспрещается: острая, пряная и соленая пища, спиртные напитки.

Вспомогательныя мѣры: Накладываютъ теплыя припарки или теплые компрессы на нижнюю часть живота; больного сажаютъ на нѣкоторое время на горшокъ, наполненный до половины горячею водою или горячимъ настоемъ ромашки. Точно также полезны полныя теплыя ванны (28°R) изъ простой воды или же съ сосновымъ экстрактомъ, въ которыхъ больной долженъ оставаться около ½ часа. При продолжительномъ задержаніи мочи врачъ долженъ ее выпустить посредствомъ катетера.

Лѣченіе: 1) При лихорадкѣ, судорогахъ въ мочевомъ пузырѣ, болѣзненномъ отдѣленіи мочи по каплямъ: *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Белладонна* 3, черезъ 1 часъ по 5 капель.—2) При кровянистой мочѣ: *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 3.—3) При тянущихъ жгучихъ боляхъ и безпрестанномъ позывѣ къ мочеиспусканію (жиленіи), при большой чувствительности области мочевого пузыря: *Кантарисъ* 3.—4) При рвотѣ, обморокахъ, холодѣніи рукъ и ногъ: *Арсеникъ* 6.—5) При мутной мочѣ, оставляющей на днѣ горшка тягучую слизь, при ощущеніи вмѣстѣ съ тѣмъ сильныхъ болей въ области пупка: *Кокоцинтисъ* 3.—6) При воспаленіи мочевого пузыря вслѣдствіе спиртныхъ напитковъ: *Нуксъ вомика* 3, *Арсеникъ* 6, *Пульсатилла* 3.—7) При воспаленіи мочеваго пузыря вслѣдствіе наложенія мушекъ (пластыря изъ шпанскихъ мухъ): *Камфора* 3.—8) Вслѣдствіе паденія, удара, пораненія и поврежденія мочевого пузыря, напр., катетеромъ: *Арника* 3, одна или поперемѣнно съ *Русомъ* 3. Лѣкарства давать черезъ 2 часа по 5 капель.—9) При трипперномъ заболѣваніи—*Кантарисъ* 3, *Теребентина* 6.

Въ хроническихъ (длительныхъ) случаяхъ боли не такъ сильны, моча мутная и содержитъ много осадковъ; въ случаѣ простуды легко является задержаніе мочи. При изъязвленіи мочевого пузыря моча дѣлается гнойною.

Діэта: Питательная пища, сырое скобленое мясо, яйца и т. д. Пить Вильдунгенскую минеральную воду источникъ Викторія.

Лѣченіе: *Дулькамара* 3, *Ликоподіумъ* 6, *Сульфуръ* 6, *Ува урзи* 1 (это послѣднее можно также пить въ видѣ чая). Затѣмъ *Теребентина* 3, когда съ мочею отдѣляется слизь, гной или кровь. Въ старческомъ возрастѣ при воспаленіи мочевого пузыря, соединенномъ съ его параличемъ: *Фосфоръ* 6, *Ацидумъ нитрикумъ* 6.

Во время холодной погоды слѣдуетъ носить шерстяной набрюшникъ.

Мочевого пузыря параличъ.

Причины: Болѣзнь эта является слѣдствіемъ старческой слабости и тяжкихъ заболѣваній, какъ, напр., тифа, спинной сухотки, можетъ, однако, быть вызвана и частымъ задерживаніемъ мочи въ теченіе продолжительнаго времени.

Признаки: Затрудненное мочеиспусканіе; моча не вытекаетъ сильной струей, но падаетъ отвѣсно внизъ отъ отверстія мочеиспускательнаго канала; отсутствіе позыва къ мочеиспусканію или отдѣленіе мочи по каплямъ (капаніе мочи); моча не вполнѣ выдѣляется изъ мочевого пузыря при мочеиспусканіи, а остается въ немъ въ болѣе или менѣе большомъ количествѣ.

Вспомогательныя мѣры: Мочу необходимо выпускать изъ мочевого пузыря посредствомъ катетера. Впрыскиванія или вливанія въ мочевой пузырь сперва теплой, а затѣмъ все болѣе и болѣе холодной воды, а также холодныя обтиранія области мочевого пузыря, холодные души, морскія купанья и т. п., очень полезны.

Лѣченіе: 1) Лицамъ старческаго возраста: *Фосфоръ* 6, 3 раза въ день по 5 капель.—2) При параличѣ жома (сжимающей мышцы) мочевого пузыря: *Белладонна* 3.—3) Лицамъ, злоупотребляющимъ спиртными напитками: *Нуксъ вомика* 3.—4) При сильныхъ боляхъ: *Кантарисъ* 6, *Гіосціа-*

мусъ 3, черезъ 1/2—1 часъ по 5 капель.—5) Въ застарѣлыхъ случаяхъ: *Сульфуръ* 6, *Каустикумъ* 6, *Цикута вироза* 6.

Мочевого пузыря судороги.

Причины: Появляются часто у женщинъ, вслѣдствіе душевныхъ потрясеній, отъ страха и, затѣмъ вслѣдствіе простуды, глистовъ и заболѣваній головного и спинного мозга.

Признаки: Сильныя, стягивающія боли въ шейкѣ мочевого пузыря; у нервныхъ, воспріимчивыхъ лицъ дрожаніе, обмороки и рвота; иногда отхожденіе мочи по каплямъ или задержаніе мочи. Приступъ длится лишь нѣсколько минутъ, но можетъ вскорѣ опять повториться. При этомъ нѣтъ лихорадки.

Вспомогательныя мѣры: Теплыя ванны, согрѣвающій компрессъ на область мочеваго пузыря; пить отварную воду въ большомъ количествѣ.

Лѣченіе: 1) При частыхъ позывахъ къ мочеиспусканію и выдѣленіи мочи по каплямъ: *Белладонна* 3 и *Гіосціамусъ* 3, черезъ 2 часа по 5 капель попеременно.—2) При судорогѣ мочевого пузыря вслѣдствіе промоченія тѣла: *Русъ* 3, *Камомилла* 3, попеременно.—3) Вслѣдствіе холоднаго или кислаго питья, душевныхъ волненій, полового возбужденія: *Нуксъ вомика* 3, *Пульсатилла* 3, черезъ 2—3 часа по 3 капли.—4) При отдѣленіи черезъ мочеиспускательный каналъ крови по каплямъ: *Кольхикумъ* 1, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—5) При натугахъ, жиленіи; *Пульсатилла* 3, *Магнезія фосфорика* 6.—6) При мочевыхъ камняхъ: *Нуксъ вомика* 3, *Литіумъ карбоникумъ* 1, *Клематисъ* 3, поочередно, по 2 раза въ день по костяной ложечкѣ, и пить отваръ изъ *барбариснаго корня*.—7) При глистахъ: *Цина* 3 *и лепешки сантониновыя* для изгнанія глистовъ.

Мочи ночное недержаніе.

Встрѣчается преимущественно у дѣтей и, хотя происходитъ иногда вслѣдствіе дурной привычки, тѣмъ не менѣе въ большинствѣ случаевъ является послѣдствіемъ слабости мочевого пузыря.

Вспомогательныя мѣры: Вечеромъ не нужно давать дѣтямъ жидкой пищи и воды, заставляя ихъ передъ сномъ помочиться и спать не на спинѣ, а на боку. Кромѣ того слѣдуетъ нѣсколько разъ будить ихъ ночью для того, чтобы привыкали вставать и своевременно помочиться. Очень полезно по утрамъ производить холодныя обтиранія тѣла. Кнейппъ совѣтуетъ ходить два раза въ день въ теченіе 3—5 минутъ въ холодной водѣ, такъ чтобы она достигала высоты икръ.

Лѣченіе: 1) При золотухѣ, частыхъ и напрасныхъ позывахъ къ мочеиспусканію, боязливомъ настроеніи духа: *Сепія* 6, 3 раза въ день по 5 капель.—2) При частомъ давленіи и напираніи на мочевой пузырь днемъ и непроизвольномъ мочеиспусканіи по каплямъ во время сидѣнія и ходьбы, причемъ наблюдается плаксивость и зябкость: *Пульсатилла* 3.—3) При частыхъ позывахъ къ мочеиспусканію, появляющихся днемъ, при мочѣ, становящейся мутною, при разстройствахъ, вызываемыхъ глистами, тревожномъ, неспокойномъ ночномъ снѣ съ судорожными подергиваніями и наклонностью кидаться во снѣ во всѣ стороны: *Цина* 3.—4) Въ длительныхъ случаяхъ, когда наблюдаются быстрые и частые позывы къ мочеиспусканію, соединенные съ колотьемъ въ мочеиспускательномъ каналѣ во время отдѣленія мочи, а также запоры или непроизвольныя испражненія: *Сульфуръ* 3 и *Нуксъ вомика* 3, поперемѣнно. Кромѣ того: *Хина* 3 и *Силицеа* 6, давать по утрамъ по 2 капли, черезъ день каждое.—5) Въ застарѣлыхъ случаяхъ: *Кали фосфорикумъ* 6.—6) При слабости волоконъ жома (сжимающей мышцы) мочевого пузыря: *Феррумъ фосфорикумъ* 6.—7) Въ старческомъ возрастѣ: *Іодіумъ* 3, ежедневно по 5 капель раза 2-3 въ день.

Мочеиспусканія затрудненія.

Причины: Простуда, перелой (трипперъ), употребленіе холоднаго пива, виноградnаго сусла или другихъ спиртныхъ напитковъ; болѣзни мочевого пузыря, мочеиспускательнаго канала и почекъ и др. Не употреблять поэтому домашнихъ средствъ, а обратиться къ врачу для изслѣдованія болѣзни.

Вспомогательныя мѣры: При простомъ воспаленіи мочевого пузыря: теплыя (въ 28—30° R) *ванны*, теплыя влажныя *припарки изъ льняного сѣмени*, согрѣвательные *компрессы*, а также мѣстныя полуванны.

Лѣченіе: 1) При частыхъ и тщетныхъ позывахъ къ мочеиспусканію: *Кантарисъ* 6, *Аконитъ* 3, по 3 капли черезъ 2 часа.—2) При жиленіи и частыхъ позывахъ къ мочеиспусканію, съ жженіемъ въ мочеиспускательномъ каналѣ и отдѣленіемъ каждый разъ скуднаго количества мочи: *Каннабисъ*×3 и *Каустикумъ* 6, поперемѣнно.—3) При отдѣленіи мочи по каплямъ: *Кантарисъ* 6, *Сульфуръ* 3.—4) При безпрестанномъ позывѣ къ мочеиспусканію съ отдѣленіемъ большого количества свѣтлой мочи: *Мурексъ пурпуреа* 3.—5) При жиленіи съ сильными судорожными или жгучими болями, при постоянномъ позывѣ къ мочеиспусканію и отдѣленіи мочи по каплямъ по прекращеніи мочеиспусканія, а также при опухоли ногъ, отдѣленіи слизи: *Пульсатилла*×3 и *Парейра брава* 1, по 3 капли черезъ 2 часа.—6) При задержаніи мочи: *Кантарисъ* 6, *Ликоподіумъ* 6; а если оно произошло вслѣдствіе употребленія спиртныхъ напитковъ: *Нуксъ вомика* 3, *Стафизагрія* 3.—7) При судорожномъ задержаніи мочи: *Магнезія фосфорика* 6.—8) При задержаніи мочи у дѣтей: *Белладонна* 3, *Кантарисъ* 6.—9) При болѣзненномъ мочеиспусканія: *Каннабисъ* 3, *Кантарисъ* 3.—10) При болѣхъ послѣ окончанія мочеиспусканія: *Кантарисъ* 6, *Колоцинтисъ* 6 и *Гепаръ сульфурисъ* 6.—11) При разстройствѣ въ мочеиспусканіи, вслѣдствіе удара, ушиба, паденія и т. д.: *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Арникою*, 3, черезъ 2—3 часа по 3 капли.—12) При кровянистой мочѣ: *Кантарисъ* 6 и

Арсеникъ 3 или *Пульсатилла* 3 и *Петролеумъ* 6, черезъ 1 часъ по 3 капли.—13) При жгучей мочѣ: *Арсеникъ* 3, *Кантарисъ* 6.—14) При мочѣ молочнаго цвѣта: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3.—15) При мочѣ, имѣющей видъ сыворотки, вслѣдствіе глистовъ: *Цина* 3.—16) При трудномъ мочеиспусканіи вслѣдствіе болѣзни почекъ: *Арсеникъ* 3, *Ликоподіумъ* 6 и *Гепаръ сульфурисъ* 3.—17) Непроизвольныя мочеиспусканія при кашлѣ: *Каустикумъ* 6, *Бріонія* 3, *Антимоніумъ крудумъ* 6.—При отхожденіи вѣтровъ: *Пульсатилла* 3; неожиданно днемъ: *Феррумъ сульфурикумъ* 6; ночью: *Сепія* 6.—18) Когда въ мочѣ содержится крупный, кирпичнаго цвѣта песокъ: *Бурса пасторисъ* 1.—19) При тягостномъ, мучительномъ жиленіи, обильномъ отхожденіи кожицъ, осадкѣ мочи, имѣющемъ цвѣтъ ржавчины, тупой боли въ крестцѣ, знобѣ въ спинѣ: выпивать по утрамъ стаканъ минеральной воды *Зальцбруннен Кроненквелле.*

Мышцъ воспаленіе.

1) При общемъ воспаленіи мышцъ: *Арника* 3, черезъ 2-3 часа по 2 капли.—2) При воспаленіи туловищныхъ и брюшныхъ мышцъ: *Цимицифуга рацемоза* 3, внутрь и снаружи втираніе изъ 10 капель *Цимицифуга* Θ на столовую ложку водки или прованскаго масла.—3) Колющія, тянущія боли въ грудныхъ стѣнкахъ (межреберныхъ мышцахъ): *Бріонія* 3.—4) Воспаленіе мышцъ грудобрюшной преграды: *Вератрумъ* 3.—5) Поясничная боль при воспаленіи поясничныхъ мышцъ (пострѣлъ): *Гельземинъ* 3 и *Русъ* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 5 капель или 5 крупинокъ.—6) Воспаленіе мышцъ вслѣдствіе разрыва мышечныхъ волоконъ: *Арника* 3, 4 раза въ день по 5 капель, и снаружи примочки изъ чайной ложки тинктуры Арники или Календулы на стаканъ воды.

Надсада.

Причины: Поднятіе тяжелыхъ предметовъ, непосильная ноша.

Лѣченіе: 1) Сильныя колющія боли, въ особенности въ крестцѣ; ухудшеніе при малѣйшемъ движеніи: *Русъ* 3 поперемѣнно съ *Бріонія* 3, каждые 1½—2 часа по 3 капли.— 2) Если при этомъ головныя боли, то *Белладонна* 3 или *Калькареа карбоника* 6, поперемѣнно съ *Бріонія* 3. Главное же средство при надсадѣ—*Арника* 3, 3 раза въ день по 3 капли, и растираніе болящихъ мѣстъ оподельдокомъ изъ Арники.

Наростъ костный (опухоль).

Самое лучшее правильный массажъ и внутреннее употребленіе *Калькареа карбоника* 6, *Силицеа* 6 и *Русъ* 3, поочередно, каждый день одно средство, 2 раза по 5 капель или 5 крупинокъ, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль.

Нарывы.

При нарывѣ на рукахъ или ногахъ необходимо дать покой больному члену. Если нарывы воспалены и очень болѣзненны, то дѣлать холодные компрессы. Для ускоренія созрѣванія нарыва можно посовѣтовать теплыя припарки изъ льняного сѣмени или изъ булки съ молокомъ или медовыя лепешки. Если послѣ вскрытія нарыва онъ не заживаетъ и края его тверды, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ теплымъ, влажнымъ компрессамъ. Если выдѣляющійся изъ гнойника гной имѣетъ дурной запахъ, то промывать его слабымъ растворомъ *Марганцовокислаго кали*. Растворъ этотъ легко приготовить дома, распустивъ въ стаканѣ прокипяченой воды нѣсколько кристалликовъ этой соли. Для промыванія язвъ употребляется также растворъ нѣсколь-

кихъ капель 1-го десятичнаго разведенія *Руса*, либо *Арники* въ чашкѣ воды. Для смягченія язвы смазываютъ ее *Календуловою мазью*. Если нарывъ долго не вскрывается, то слѣдуетъ обратиться къ врачу.

Лѣченіе: 1) При болѣзненныхъ нарывахъ: *Гепаръ сульфурисъ* 3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ.—2) При болѣзненныхъ жгучихъ нарывахъ: *Арсеникъ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, поперемѣнно, черезъ 1—2 часа.—3) При гангренозныхъ язвахъ: *Арсеникъ* 3, черезъ 1 часъ по 5 капель, и снаружи мазь изъ *Арсеника* со свинымъ саломъ.—4) При гнойныхъ язвахъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 и *Силицеа* 6.—5) При свищахъ: *Силицеа* 6 и *Фосфоръ* 6, а если заживленіе затягивается, то промыванія *силиціевой водой*. — 6) При злокачественныхъ нарывахъ, отдѣляющихъ сукровицу: *Ляхезисъ* 6.—7) При легко кровоточащихъ язвахъ: *Арсеникъ* 3, *Ацидумъ нитрикумъ* 3.—8) При нарывахъ съ твердыми краями: *Силицеа* 30, *Меркуріусъ солюбилисъ* 3.—9) При нарывахъ съ твердыми краями и обильнымъ отдѣленіемъ гноя: *Графитъ* 6. При разрастающихся грануляціяхъ (зернистости), дикомъ мясѣ: *Ацидумъ нитрикумъ* 3, *Арсеникъ* 3. Если язвы имѣютъ твердые края, то накладываютъ на нихъ холстинку, пропитанную въ смѣси равныхъ частей *экстракта Гамамелисъ* и теплой воды, а поверхъ холстинки полотняный компрессъ. Когда края язвы станутъ мягкими и плоскими, то слѣдуетъ прикладывать *Гамамелисъ мазь*, а внутрь отъ 10 до 15 капель *экстракта Гамамелисъ*.—Затѣмъ при язвахъ съ водянисто-гнойнымъ отдѣленіемъ: *Кали іодатумъ* 1, *Арсеникъ іодатумъ* 3 и *Силицеа* 6, поочередно, по 2 раза въ день по 3 капли. Точно такъ же въ длительныхъ случаяхъ совѣтуютъ давать *Ляхезисъ* 6. Весьма хорошимъ очищающимъ язвы и заживляющимъ средствомъ служитъ мазь, приготовленная изъ 20 капель *Арсеника*×3 на 2 ложки ланолина или чистаго свиного сала, или мазь изъ 20 капель *Меркуріусъ коррозивусъ*×3 на 2 ложки жирового вещества или прованскаго масла.

Насморкъ.

Острый и хроническій.

Причины: Простуда, промачиваніе ногъ, быстрое охлажденіе, сквознякъ при разгоряченномъ тѣлѣ, вдыханіе пыли, различныхъ газовъ и т. п.

Признаки: Тяжесть головы, носъ заложенъ, частое чиханіе и сухость въ носу, а затѣмъ отдѣленіе водянистой слизи въ большомъ количествѣ. Потеря аппетита, обонянія и полное отупѣніе головы. Черезъ нѣсколько дней выдѣленія густыя и обильныя. Продолжается 10—14 дней и дольше, если не остерегаться простуды.

Предупрежденіе: Чтобы уберечься отъ заболѣванія насморкомъ, нужно закалить свой организмъ регулярными ежедневными обмываніями холодною водою или ваннами. У кого ноги постоянно холодныя, тому полезно дѣлать на ночь горячія ножныя ванны (до 36° R.), въ теченіе шести минутъ, а утромъ растирать ноги тряпкою, намоченною въ холодной водѣ.

Вспомогательныя мѣры. Когда насморкъ только начинается, его легко можно остановить самымъ простымъ средствомъ: въ чашку кипятка налить 1—2 чайныхъ ложки камфорнаго спирта и выдѣляющіеся изъ чашки пары втягивать носомъ; если этого сдѣлать нельзя, то можно нюхать и просто камфорный спиртъ. Тепло одѣваться. Въ холодную суровую погоду сидѣть дома. Губы, носъ и носовыя отверстія смазывать *мазью отъ насморка* и нюхать *Анемонъ.*

Лѣченіе: 1) Вначалѣ *Аконитъ* 3 и *Нуксъ вомика* 3, черезъ 1—2 часа поперемѣнно по 3 капли.—2) При ѣдкомъ отдѣленіи водянистой жидкости—*Гельземинъ* 3 и *Арсеникъ* 3, поперемѣнно.—4) Если истеченія слизисты—*Меркуріусъ солюбилисъ* 3, по ложечкѣ черезъ два часа.—5) Когда носъ воспаленъ и образуются даже ранки—*Гельземинъ* 3 и *Гепаръ сульфурисъ* 3, поперемѣнно.—6) Если глаза воспалены

и слезятся—*Евфразія* 3.—7) Потеря обонянія и вкуса—*Пульсатилла* 3.—8) Головныя боли и запоры—*Белладонна* 3 и *Нуксъ вомика* 3, попеременно.—8) Если катарръ переходитъ на гортань и дыхательное горло, то—*Іодіумъ* 3, *Броміумъ* 3 или *Спонгія* 3.—10) Сухой насморкъ у дѣтей: *Нуксъ вомика* 3 и *Меркуріусъ іодатусъ* 6, черезъ день каждое, 3—4 раза въ день по 2 капли или 5 крупинокъ. При ухудшеніи на воздухѣ: *Дулькамара* 3; при ухудшеніи вечеромъ: *Карбо вегетабилисъ* 6. При выдѣленіи изъ носа водянистой жидкости: *Камомилла* 3. Лѣкарство давать черезъ 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.—11) Хроническій насморкъ встрѣчается большею частью у золотушныхъ и туберкулезныхъ: а) если поражены заднія стѣнки носовой полости, *Сульфуръ* 6 или 30, утромъ и вечеромъ по 5 капель или 5 крупинокъ; б) при выдѣленіи плотныхъ, трубкообразныхъ кровянистыхъ массъ: *Силицеа* 6 или 30; в) при разъѣдающемъ лишаѣ на ноздряхъ: *Туя* 30, утромъ и вечеромъ по 3 капли или 5 крупинокъ; г) при зловонномъ насморкѣ: смѣшать 2 капли *Іодіумъ* въ $^1/_2$ чашкѣ кипятка, втягивать носомъ выдѣляющіяся пары и принимать внутрь *Кали бихромикумъ* 3 и *Аурумъ муріатикумъ* 4, по 2 раза въ день по 5 капель.—12) Насморкъ у малокровныхъ дѣвушекъ: *Феррумъ іодатумъ* 3.—13) Такъ называемая сѣнная лихорадка представляетъ также воспаленіе слизистыхъ оболочекъ носа: *Нафталинъ*×2, по костяной ложечкѣ 3—4 раза въ день. Также совѣтуютъ *Гельземинъ* 3 (весною) и *Силицеа* 6 (лѣтомъ), 3 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ.

Нервовъ слабость. Неврастенія.

При ослабленіи нервовъ, вслѣдствіе переутомленія, отъ умственныхъ занятій или слабости, и истощеніи послѣ болѣзни, очень полезно принимать *Авена сатива* Θ, по 5 капель въ ложечкѣ горячей воды, раза 4 въ день. Полезно также *Ацидумъ фосфорикумъ* 3 или *Фосфоръ* 3.

Нестерпимый голодъ.

Причины: Болѣзненная раздражительность желудочныхъ нервовъ; глисты, истерія, малокровіе, беременность.

Лица, страдающія этимъ недугомъ, должны всегда имѣть при себѣ кусочекъ хлѣба, для немедленнаго утоленія своего голода.

Лѣченіе: 1) При неудержимомъ позывѣ къ пищѣ: *Фитолакка* × 1, 3 раза въ день по 5 капель, или лепешки изъ *Фукусъ фитолакка*. Затѣмъ: *Калькареа карбоника* 6, *Іодіумъ* 3, *Ликоподіумъ* 6, *Силицеа* 6.—2) Если при этомъ запоръ и отрыжка: *Нуксъ вомика* 3.—3) Если же поносъ и рвота: *Вератрумъ* 3.—4) Вслѣдствіе глистовъ: *Меркуріусъ сомобилисъ* 6, *Цина* × 1, и *Сабадилла* 3, по 2 раза въ день по 2 капли.—5) У беременныхъ: *Нуксъ вомика* 6, *Коніумъ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли. Послѣ тяжкой болѣзни *Хина* 3, 3 раза въ день по 3 капли.

Ногти вросшіе.

Причины: Узкая обувь. Неправильное обрѣзываніе ногтей.

Признаки: Боль въ ногтевомъ суставѣ. Чувство, какъ будто обувь мала и ноготь большого пальца упирается въ сапогъ. Это зависитъ отъ затвердѣнія прилегающихъ къ краямъ ногтя частей.

Вспомогательныя мѣры: Докторъ Герингъ совѣтуетъ слѣдующее: толстымъ обломкомъ стеклышка соскоблить середину больного ногтя насколько возможно тонко; ноготь нужно часто подрѣзывать, но не закругленно, какъ обыкновенно, выпуклостью впередъ, а напротивъ, углубляя разрѣзъ къ серединѣ ногтя, такъ чтобы ноготь получилъ серпообразный видъ; по сторонамъ же, гдѣ ноготь загибается и вростаетъ, его обрѣзать совсѣмъ не слѣдуетъ. Каждую недѣлю 2 раза дѣлать ножную ванну изъ отвара льня-

ного сѣмени и подрѣзать ноготь, какъ указано выше. Боковыя верхушки выросшаго ногтя подрѣзать понемногу. По истеченіи одного года даютъ ногтю опять правильный ростъ, но никогда больше не обрѣзаютъ глубоко боковыя загибающіяся части его; а въ томъ мѣстѣ, гдѣ ноготь приходитъ въ соприкосновеніе съ мясомъ, подкладываютъ подъ ноготь небольшой валикъ изъ гигроскопической ваты для воспрепятствованія его вростанію.

Лѣченіе: Если ногтевая подушка изъязвлена и болѣзненна, то давать внутрь *Силицеа* 6 и *Гепаръ сульфурисъ* 6, черезъ день утромъ и вечеромъ.

Ногтоѣда.

Признаки: Колющія, сверлящія боли на кончикѣ пальца или подъ ногтемъ. Затѣмъ палецъ припухаетъ и становится очень чувствительнымъ къ дотрогиванію. Наступаетъ лихорадочное состояніе и безсонница и воспаленіе переходитъ въ нагноеніе. По вскрытіи нарыва и удаленіи гноя всякая боль прекращается. Если при этомъ поражается кость, то можетъ образоваться костоѣда, вслѣдствіе которой иногда приходится отнять палецъ. При ногтоѣдѣ же сходитъ только ноготь, который опять отростаетъ.

Лѣченіе: Развитіе нарыва можно иногда остановить, если въ самомъ началѣ опустить палецъ въ возможно горячую воду и принимать черезъ ½ часа по 2 капли *Белладонну* 3. Если не удается остановить процессъ нарыванія, то дѣлать припарки изъ льняного сѣмени. Можно также дѣлать мыльныя ванны или приложить медовую лепешку. Своевременный разрѣзъ, сдѣланный врачемъ, сокращаетъ страданія и предотвращаетъ отъ возможнаго зараженія кости. 1) Вначалѣ давать *Калькареа флуорика* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ; если опухоль въ теченіе сутокъ не всасывается обратно, то давать *Гепаръ сульфурисъ* 3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ до вскрытія нарыва, а затѣмъ *Силицеа* 6.—2) Если на кончикѣ пальца образуются пу-

зыри, причиняющіе жгучую и пульсирующую боль, то давать *Аписъ* 3 и *Белладонна* 3, черезъ 1 часъ по 3 капли.— 3) Если палецъ темнѣетъ и становится синимъ, то *Ляхезисъ* 6 и *Арсеникъ* 3 попеременно, черезъ 1 часъ по 5 капель, и снаружи примочка изъ *Арсеникъ*×2, 20 капель на стаканъ воды. По вскрытіи нарыва дѣлать согрѣвающіе компрессы, пока не выйдетъ весь гной, а затѣмъ прикладывать *Календуловую мазь.*

Ножной потъ.

Его не слѣдуетъ насильственно останавливать посредствомъ мазей, вяжущихъ средствъ и т. п., но надо регулярно въ теченіе продолжительнаго времени обмывать ноги 2—3 раза въ день смоченнымъ въ холодной водѣ полотенцемъ и затѣмъ осушать посредствомъ сильнаго тренія жесткимъ полотенцемъ. Еще лучше дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ холодная вода съ примѣсью на чашку воды 50 капель *Ацидумъ нитрикумъ*×1. Послѣ обмыванія слѣдуетъ гулять въ теченіе ½ часа. Такое же благотворное дѣйствіе могутъ оказать *ножныя паровыя ванны*, которыя надо повторять ежедневно. Зловоніе можно уменьшить посредствомъ присыпанія ногъ *салициловымъ порошкомъ*: вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ смазывать тѣ мѣста, которыя особенно сильно потѣютъ, смѣсью *салициловой кислоты съ жировой мазью.* Внезапно скрывшійся ножной потъ необходимо снова вызвать *теплыми ваннами*, а еще лучше завертываніемъ обнаженныхъ ногъ въ тонкую клеенку, которая вслѣдствіе теплоты, выдѣляющейся изъ ногъ, становится мягкою и плотно пристаетъ ко всѣмъ ихъ частямъ. Поверхъ этого надѣваютъ чулки и оставляютъ ихъ на ногахъ въ теченіе 12—48 часовъ. По прошествіи этого времени, а иногда и ранѣе, когда ноги сдѣлаются теплыми и влажными, снимаютъ съ нихъ клеенку, промываютъ въ горячей (теплой) водѣ и, по осушеніи, надѣваютъ на нихъ шерстяные чулки, а поверхъ чулокъ опять тонкую гуттаперчевую ткань и просторную обувь.

Лѣченіе: *Ацидумъ нитрикумъ* 2, *Русъ* 3, *Сепія* 6, *Барита ацетика* 6. Противъ различныхъ страданій, вызванныхъ внезапнымъ скрытіемъ ножнаго пота: *Русъ* 3, *Силицеа* 3, *Арсеникъ* 3.

Обморокъ.

Причины: Душевныя волненія, жара, вредныя испаренія, испорченный воздухъ, узкія платья, физическое переутомленіе.

Вспомогательныя мѣры: Разстегнуть, развязать и расшнуровать всѣ стянутыя части платья; положить больного горизонтально, такъ, чтобы голова была немного опущена ниже туловища и ногъ, послѣднія нѣсколько приподнять; озаботиться о чистомъ, свѣжемъ воздухѣ и вливать больному въ ротъ понемногу чистой свѣжей холодной воды; лицо вспрыскивать холодною водою, а равно положить на затылокъ и на область сердца холодный компрессъ; если отъ этого не послѣдуетъ улучшенія и больной начнетъ холодѣть, то давать нюхать камфорный спиртъ или уксусъ. Если по приведеніи въ чувство у больного появится рвота, то ее не останавливать, а равно не будить, если больной уснетъ.

Лѣченіе: Если обморокъ явился слѣдствіемъ: 1) душевныхъ волненій: а) радости—*Коффеа* 3; б) испуга—*Аконитъ* 3 и *Опіумъ* 3; в) горя—*Игнація* 3; г) отвращенія при видѣ раны, порѣза, крови и т. п.—*Ипекакуана* 3; 2) потери крови—*Хина*×3, *Карбо вегетабилисъ*, *Вератрумъ* 3 и вино понемногу; 3) умственнаго переутомленія—*Нуксъ вомика* 3; 4) беременности—*Нуксъ вомика* 3, *Ляхезисъ* 6, *Глоноинъ* 3; 5) приливовъ крови къ головѣ—*Белладонна* 3 и *Аконитъ* 3; 6) блѣдной немочи и малокровія—*Феррумъ* 2, *Хина*×3, *Пульсатилла* 3; 7) жары—*Ипекакуана* 3, *Карбо вегетабилисъ* 6; 8) истеричности у женщинъ—*Игнація* 3, *Мосхусъ* 6, *Нуксъ мосхата* 6. 9) При холодной кожѣ и холодномъ потѣ и когда бываютъ частые возвраты—*Вера-*

трумъ 3.—Лѣкарства принимаются черезъ 2 часа по 5 капель на пріемъ, а гдѣ два лѣкарства, то черезъ 2 часа попеременно, тоже по 5 капель.

Обопрѣлость у маленькихъ дѣтей.

Ежедневно купать дѣтей въ тепловатой водѣ или промывать пораженныя мѣста гигроскопическою ватою. Затѣмъ слѣдуетъ смазывать на ночь обопрѣлости *Гидрастисъ*—глицериномъ, 1:10, а днемъ нѣсколько разъ присыпать рисовою пудрою. Употреблять въ этихъ случаяхъ также и *Ликоподіумъ* въ порошкѣ.

Лѣченіе: *Камомилла* 3, въ теченіе четырехъ дней по одному пріему въ день, или *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, по одному или по два пріема въ день, и нѣсколько пріемовъ *Гепаръ сульфурисъ* 6 въ промежуткахъ.

Одышка и удушье (Астма бронхіальная).

Болѣзнь вызывается внезапнымъ съуженіемъ мелкихъ и капиллярныхъ бронховъ.

Причины весьма различны: наслѣдственность; усиленное напряженіе дыхательныхъ органовъ въ теченіе долгаго времени (напр., у пѣвцовъ, учителей, проповѣдниковъ, офицеровъ); страданія носа; душевныя волненія. У дѣтей: корь, коклюшъ, бронхитъ; сильныя душевныя возбужденія.

Признаки: Приступы удушья наступаютъ внезапно или имъ предшествуютъ предвѣстники, состоящіе въ общемъ недомоганіи, особомъ ощущеніи въ гортани и подъ ложечкою, зѣвотѣ, насморкѣ съ частымъ чиханіемъ и сильномъ отдѣленіи слизи. Настоящій приступъ начинается большею частью ночью и выражается чувствомъ сильной тоски и страха, болью въ груди, недостаткомъ воздуха, удушьемъ. Вдыханіе и выдыханіе сопровождается громкимъ свистящимъ звукомъ, ноздри быстро движутся, лицо становится

синеватымъ и выражаетъ страхъ. Приступы эти могутъ быть болѣе или менѣе продолжительны и кончаются выдѣленіемъ тягучей слизи или испусканіемъ водянистой мочи.

Вспомогательныя мѣры: Свѣжій, влажный и теплый воздухъ. Ежедневныя обтиранія тѣла холодной водой. Совѣтуютъ брать вечеромъ передъ сномъ теплую *ножную ванну*. Хорошо также дѣйствуютъ поясныя ванны или полуванны. Поливаніе спины или груди водою изъ дождевого душа, а равно теплыя ручныя и ножныя ванны; вдыханіе горячихъ паровъ скипидарнаго масла.

Лѣченіе: 1) При эмфиземѣ легкихъ (расширеніи легочныхъ пузырьковъ), соединенной съ чувствомъ боязни, чрезвычайнымъ удушьемъ, значительною жаждою и большою слабостью: *Арсеникъ* 3, утромъ и вечеромъ по 5 капель; а также довольно быстро облегчаетъ приступы одышки и эмфиземы легкихъ порошокъ *Нафталина* 2-го десятичнаго растиранія, по костяной ложечкѣ каждыя $^1/_4$ часа, во время приступовъ.—2) При приливѣ крови къ головѣ, недостаткѣ воздуха, сухомъ кашлѣ, преимущественно у женщинъ и дѣтей: *Белладонна* 3, черезъ 1—2 часа по 5 капель.—3) При судорожной астмѣ, преимущественно у дѣтей, приступахъ удушья, синеватомъ лицѣ, хрипахъ въ груди: *Купрумъ ацетикумъ* 3 и *Ацидумъ гидроціаникумъ* 6, черезъ $^1/_2$ часа по 2 капли.—4) При судорожной астмѣ съ ночными приступами удушья, влажныхъ хрипахъ въ груди, чувствѣ стягиванія или сжатія горла: *Ипекакуана* 3 и *Арсеникъ* 3 или *Вератрумъ* 3, черезъ 1 часъ по 5 капель попеременно.—При удушіи у истерическихъ женщинъ: *Кокулюсъ* 3 и *Игнація* 3, попеременно.—6) При разстройствахъ живота, скопленіи вѣтровъ, у лицъ, употребляющихъ много кофе или страдающихъ геморроемъ: *Нуксъ вомика* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 3, черезъ 1—3 часа по 5 капель или по костяной ложечкѣ.—7) При удушіи вслѣдствіе болѣзни сердца: *Арсеникъ* 3 и *Кактусъ* 1, по 3 капли черезъ 1—2 часа.—8) При осложненіи удушья катарромъ бронховъ принимать попеременно—одинъ день *Арсеникъ* 3, а другой—*Ликоподіумъ* 30.—9) Наконецъ, хорошіе результаты были при астмѣ

отъ *Кали іодатумъ*×1, который слѣдуетъ принимать три раза въ день по 10 капель въ молокѣ.

Удушье у дѣтей: Внезапные ночные приступы удушья со свистящимъ, пилящимъ звукомъ при дыханіи и отчасти хриплымъ кашлемъ. Нерѣдко приступъ этотъ возобновляется въ слѣдующую ночь и чаще всего бываетъ у дѣтей при прорѣзываніи зубовъ. Онъ бываетъ рѣдко у дѣтей, имѣющихъ болѣе 3 лѣтъ. При этомъ не бываетъ ни лихорадки, какъ при крупѣ, ни закидыванія головы назадъ.

Лѣченіе: Сначала *Белладонна* 6, по одному пріему послѣ каждаго приступа.—Если лицо ребенка синѣетъ, руки и ноги холодѣютъ и появляются влажные хрипы въ груди: *Ипекакуана* 3 и *Ацидумъ гидроціаникумъ* 6, по 2 капли на рюмочку воды,—пить глотками попеременно. При холодной блѣдной кожѣ и холодномъ потѣ, если предыдущія средства не доставили облегченія: *Вератрумъ* 6 и *Арсеникъ* 6.—Если во время крика ребенокъ задыхается: *Игнація* 6, черезъ 5 минутъ по 2 капли въ 1/2 ложечкѣ воды.

Ожоги.

Вспомогательныя мѣры. Свѣже обожженное мѣсто, пока еще нѣтъ пузырей, облить тинктурой *Уртика* или смѣшать таковую пополамъ съ водою и примачивать. Если захватить этимъ средствомъ ожогъ до образованія пузырей, то послѣднихъ не будетъ, и ожогъ скоро проходитъ. Также хорошо тотчасъ послѣ ожога опустить обожженное мѣсто въ насыщенный растворъ простой соды или примачивать этимъ растворомъ обожженную часть. Если же пузыри уже образовались, то ихъ надо прорѣзать и осторожно удалить ножницами всю кожицу, оставшуюся отъ пузыря. Затѣмъ приготовить мазь изъ 1/2 фунта прованскаго масла съ двумя чайными ложками тинктуры *Календулы*, прибавить туда капель 30—40 *Меркур. корр.*×3 и, смочивъ этимъ слой гигроскопической ваты, наложить на больное мѣсто. Каждые 2 часа нужно мѣнять. Какъ домашнее средство, хорошо также смѣшать столовую ложку сливочнаго

не соленаго масла и 1 яичный желтокъ и этимъ прикладывать къ обожженному мѣсту, намазавъ на полотняную тряпочку. При этомъ давать внутрь *Уртика* 6 и *Белладонна* 6, черезъ 1 часъ по 3 капли поперемѣнно. Прекраснымъ средствомъ служитъ также мазь, приготовленная изъ 1 ч. *Тимола* на 16 ч. *Вазелина*. Будучи намазана тотчасъ послѣ ожога, она препятствуетъ образованію пузырей, унимаетъ боль и скоро заживляетъ обожженное мѣсто. Мазь эту, а равно *Уртику*, слѣдуетъ всегда имѣть у себя дома, тѣмъ болѣе что онѣ сохраняются очень долго, не подвергаясь порчѣ.

Лѣченіе: Внутрь давать *Уртика* 6 и *Белладонна* 6, или *Арника* 3 и *Белладонна* 6, черезъ $^1/_2$ часа по 3 капли вначалѣ, а затѣмъ каждые 2 часа. При наступленіи лихорадки: *Аконитъ* 3 и *Арника* 3, поперемѣнно черезъ 1—2 часа. При сильныхъ боляхъ *Арсеникъ* 3, черезъ $^1/_4$ часа по 3 капли пріема 2—3. При нагноеніи *Гепаръ сульфурисъ* 3, нѣсколько разъ въ день по костяной ложечкѣ.

Озноблені̀е.

Причины: Ношеніе узкой обуви во время сырой холодной погоды; занятіе ручною работою или рукодѣліемъ въ нетопленой комнатѣ. Отогрѣваніе холодныхъ рукъ и ногъ у печки.

Признаки: Краснота; опухоль; болѣзненность озябленныхъ частей, преимущественно въ теплотѣ. Пораженныя части опухаютъ, трескаются и образуютъ трудно заживающія язвы. Можетъ даже послѣдовать омертвѣніе (гангрена) кожи или конечности, при чемъ онѣ тогда чернѣютъ.

Лѣченіе: Можно предохранять себя отъ озябленія, если втирать *оливковое масло*, *вазелинъ* или иное жирное вещество въ руки и ноги, носить шерстяные напульсники и теплыя перчатки, а также шерстяные чулки и просторную обувь. Свѣже появившіяся озноблины растирать снѣгомъ и обмывать почаще пораженныя части въ теплой (25° Р.) водѣ. Покраснѣвшія мѣста натирать *оподельдокомъ*

изъ Арники. При холодныхъ рухахъ и ногахъ взять горячую (36° R.) ручную и ножную ванну въ теченіе 6 минутъ; затѣмъ погрузить руки и ноги на нѣсколько секундъ въ холодную воду и, наконецъ, хорошенько растирать. При о з н о б л и н а х ъ и т р е щ и н а х ъ на рукахъ: смазывать ихъ ежедневно 1 или 2 раза мазью изъ 15 граммовъ *вазелина* и 5,0 *Ацидумъ нитрикумъ* × 2 дѣленія. Точно такъ же хорошо дѣйствуетъ *мазь Гамамелисъ.* В н у т р ь: *Ацидумъ нитрикумъ* 1, *Петролеумъ* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли, а если перешло въ нагноеніе, то *Силицеа* 3 и *Арсеникъ* 6, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ и по 3 капли.

Онанизмъ. Рукоблудіе.

Онанизмомъ занимаются мальчики и юноши, дѣвочки и дѣвицы, и потому родители должны строго слѣдить за своими дѣтьми съ ихъ ранняго возраста. Прежде всего слѣдить за тѣмъ, чтобы дѣти не дотрогивались руками къ половымъ частямъ; пріучать ихъ спать такъ, чтобы руки лежали сверхъ одѣяла, а не подъ нимъ; постель должна быть твердая и покрывало легкое. Запрещать, въ особенности дѣвочкамъ, садиться верхомъ на качалки, съѣзжать верхомъ по периламъ лѣстницъ, а также частое лазаніе по деревьямъ, шестамъ и т. п. Дѣти не должны долго валяться въ постели до или послѣ сна, не оставаться подолгу въ отхожихъ мѣстахъ и не читать романовъ, сильно дѣйствующихъ на раздраженіе ихъ фантазіи. Оберегать ихъ отъ сообщества съ нравственно испорченными дѣтьми. Гимнастика, купаніе, ежедневныя холодныя обмыванія очень полезны. Пища должна быть питательная, легкая. Избѣгать пряностей, чернаго крѣпкаго кофе и чая, а также спиртныхъ напитковъ. Какъ только родители замѣтятъ за ребенкомъ этотъ порокъ, они должны немедленно принять самыя энергичныя мѣры для устраненія его. Мѣры эти должны состоять, главнымъ образомъ, въ усовѣщеваніи ребенка, въ разъясненіи ему губительныхъ послѣдствій этого порока и, если нужно, даже въ наказаніяхъ. Чѣмъ раньше остановить

эту позорную привычку у дѣтей, тѣмъ легче они отвыкаютъ и забываютъ ее.

Лѣченіе: При запорахъ ежедневно или черезъ день употреблять прохладные клистиры. При существованіи мелкихъ глистовъ прежде всего изгнать глисты. 1) Лучшее средство для устраненія половыхъ возбужденій, это *Камфора* 3, по 2 капли 3 раза въ день.—2) Малокровнымъ дѣвочкамъ—*Платина* 6, по 2 пріема въ день.—3) Малокровнымъ мальчикамъ—*Калькареа карбоника* 6, по 2 раза въ день по 2 капли. Противъ послѣдствій онанизма *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, *Хина* 3 и *Нуксъ вомика* 3, поочередно, по 1 недѣлѣ каждаго, 3 раза въ день по 3 капли; продолжать мѣсяца три.

Операціи.

Для облегченія боли при какихъ бы то ни было операціяхъ рекомендуется ускоренное дыханіе. Нужно разстегнуть одежду на груди и шеѣ и дѣлать во время операціи скорыя, глубокія вдыханія—отъ 90 до 100 въ минуту. Внутрь: *Арника* 3, черезъ 2 часа по 2 капли послѣ операціи; и затѣмъ рѣже — 2—3 раза въ день.

Оспа.

Причины: Зараженіе гноемъ изъ оспенныхъ пузырьковъ (пустулъ).

Признаки: Сильныя боли и потягиванія въ крестцѣ. Красные узелки подъ кожею, сперва на лбу, а потомъ на всемъ тѣлѣ, которые распухаютъ и наполняются жидкостью, сначала серозною, а потомъ гнойною; въ серединѣ углубленіе. На 6-й день окружность оспеннаго пузырька краснѣетъ и наполняющая его жидкость превращается въ гной. Температура высокая, повышающаяся на 6—7 день еще

болѣе и понижающаяся на 10 день, когда оспины начинаютъ подсыхать. Онѣ образуютъ темнобурыя корки, которыя отпадаютъ и оставляютъ послѣ болѣзни болѣе или менѣе глубокія оспины.

Предупрежденіе: Не ходить въ домъ, гдѣ есть оспенный больной. Въ комнатѣ больного ставить тарелки съ растворомъ марганцовокислаго кали и виннокаменной кислоты.

Уходъ: Комната больного должна быть прохладная (12—14° Р.) и воздухъ чистый. Если возможно, то держать постоянно открытою форточку. Окна должны быть затянуты темною матеріею, такъ какъ дневной свѣтъ раздражаетъ воспаленные глаза. Пуховики на постели должны быть удалены, и покрывать больного можно только слегка. Во время лихорадки *пища* должна быть самая легкая: молоко, жидкій бульонъ или супъ. *Питье*—чистая вода или вода съ вареньемъ. Когда лихорадка прошла, то пищу должно давать питательную: крѣпкій бульонъ, яйца всмятку, бѣлое мясо (курица, индѣйка и т. п.), дичь. Для уменьшенія раздражительности кожи образовавшіяся корки смазываютъ маковымъ масломъ или глицериномъ, смѣшаннымъ съ *Туей* (1 часть тинктуры Туи на 8 частей глицерина).

Лѣченіе: Въ началѣ болѣзни при бурной лихорадкѣ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно черезъ 1 часъ по 3 капли.—2) При воспаленіи горла, слюнотеченіи, боли глазныхъ вѣкъ: *Белладонна* 3 и *Меркуріусъ коррозивусъ* 3, также поперемѣнно.—3) При сильномъ нагноеніи оспинъ: *Меркуріусъ сомобилисъ* 3, по костяной ложечкѣ черезъ 1—2 часа.—4) Черная оспа: *Секале корнутумъ* 2.—5) Оспа съ омертвѣніемъ оспинъ: *Арсеникъ* 3, каждые ½ часа по 2—3 капли.—6) При тифозномъ состояніи *Арсеникъ* 3, *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, *Лахезисъ*, *Тартарусъ эметикусъ* 3.—7) При слабой дѣятельности сердца: *Аммоніумъ карбоникумъ* 1, каждые ½—1 часъ по 3 капли, и токайское вино.—8) При запорахъ—клизмы изъ мыльной воды.

Оспопрививаніе.

Дѣтей, которымъ привита оспа, нужно держать такъ же, какъ обыкновенно, не измѣняя ихъ режима и не запрещая выносить ихъ на воздухъ въ хорошую погоду. Рукава платья не должны быть узки, чтобы треніемъ не раздражать мѣсто прививки. Послѣ прививки слѣдуетъ давать дѣтямъ нѣсколько дней подрядъ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, по 2 капли или по 5 крупинокъ утромъ и вечеромъ. Если мѣсто прививки изъязвляется, то нужно давать внутрь *Туя* 30, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ, и прикладывать чистыя тряпочки, намазанныя календуловымъ вазелиномъ или чистымъ свинымъ саломъ. Если опухаетъ вся рука, то ее нужно носить на повязкѣ; при рожистомъ воспаленіи: *Аписъ* 3 и *Арсеникъ* 3, поперемѣнно, каждые 2 часа по 2 капли или 5 крупинокъ.

Оспа вѣтреная.

Признаки: Мелкіе прозрачные пузырьки, высыпающіе преимущественно на лицѣ и на рукахъ, которые въ теченіе 1 дня размягчаются, лопаются и подсыхаютъ темноватыми корками. Лихорадка незначительна. Продолжительность 10—14 дней.

Лѣченіе: Держать дѣтей въ комнатѣ и давать легкую, преимущественно жидкую пищу—молоко, супы, компоты и т. п. При жарѣ: *Белладонна* 3, каждые 2 часа по 2 капли. При сильномъ зудѣ кожи: *Сульфуръ* 3, три раза въ день по 2 капли.

Отрыжка.

Причины: Отрыжка появляется часто вслѣдствіе употребленія большого количества пива, кофе, лука, острыхъ

пряныхъ и жирныхъ кушаній и т. п., а также отъ куренія табаку.

Вспомогательныя мѣры: Употреблять невозбуждающую пищу, обливать утромъ и вечеромъ область желудка и животъ холодною водою и затѣмъ хорошенько растирать кожу; лѣтомъ купаться въ рѣкѣ; при вздутіи живота и боляхъ положить согрѣвающій компрессъ на животъ; дѣлать продолжительныя прогулки, стараясь при этомъ глубоко вдыхать свѣжій воздухъ; дѣлать комнатную гимнастику; каждое утро выпивать маленькими глотками 1—2 стакана свѣжей воды.

Лѣченіе: 1) Принимать въ теченіе продолжительнаго времени послѣ ѣды *Пульсатилла* 3.—2) При горькой отрыжкѣ: *Бріонія* 3, *Нуксъ вомика* 3, *Пульсатилла* 3, *Хина* 3.—3) При кислой отрыжкѣ: *Калькареа карбоника* 6, *Нуксъ вомика* 3, *Карбо вегетабилисъ*×3, *Ацидумъ сульфурикумъ* 3, *Натрумъ фосфорикумъ* 6.—4) При отрыжкѣ съ позывомъ на рвоту: *Вератрумъ* 3.—5) При гнилой, тухлой отрыжкѣ: *Гепаръ сульфурисъ* 6, *Тартарусъ эметикусъ* 3.—6) При судорожной: *Нуксъ вомика* 3, *Ликоподіумъ* 3, *Фосфоръ* 3, *Кока* 30.—7) При отрыжкѣ съ чувствомъ жженія: *Арсеникумъ* 3, *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, *Пульсатилла* 3.—8) При громкой отрыжкѣ: *Вератрумъ* 3, *Платина* 6.—9) При водянистой отрыжкѣ: *Ликоподіумъ* 3.—Давать лѣкарства черезъ 1—2 часа по 5 капель или 5 крупинокъ, а порошки по костяной ложечкѣ, по одному средству заразъ и, въ случаѣ безуспѣшности его, переходить ко второму.

Падучая болѣзнь, эпилепсія.

Функціональная болѣзнь нервной системы. Наслѣдственна. У дѣтей пьяницъ.

Причины: Дурное питаніе, золотуха, пьянство, душевныя волненія, особенно испугъ; половыя излишества, преимущественно рукоблудіе; заболѣваніе мозга и т. д.; иногда наслѣдственность

Признаки: Предвѣстниками приступа падучей бываютъ: безпокойство, возбужденіе, чувство давленія на голову, головокруженіе; дрожаніе и судороги въ отдѣльныхъ мышцахъ, сердцебіеніе и т. д. Больной пронзительно вскрикиваетъ, теряетъ сознаніе и падаетъ; появляются судороги; большіе пальцы плотно втянуты въ ладонь; изъ рта выступаетъ пѣна; лицо сине-красное (багровое); судороги постепенно прекращаются и наступаетъ разслабленіе всего организма. Съ теченіемъ времени память больного притупляется, и послѣ частыхъ приступовъ развивается у него подъ конецъ слабоуміе.

Лѣченіе: Нужно спокойно выждать окончанія приступа и лишь освободить больного отъ обременяющей и стягивающей его одежды. Разгибаніе втянутаго въ ладонь большого пальца и крѣпкое держаніе больного во время припадка вредно. Діэта должна быть чисто растительная, такъ что не только мясо, но и бульонъ и другіе мясные отвары строго воспрещаются. Изготовлять кушанья лучше на растительномъ (горчичномъ, напр.), чѣмъ на коровьемъ маслѣ. Необходимо избѣгать возбуждающихъ и спиртныхъ напитковъ. Всякія душевныя возбужденія, преимущественно половыя, чрезвычайно вредны. Полезно молочное или виноградное лѣченіе. По утрамъ, когда больной находится еще въ постели, вытиранія тѣла холодноватою водою, а также и тепловатыя ванны въ 26° Р., часто бываютъ весьма полезны. По прекращеніи припадковъ хорошо дѣйствуютъ рѣчныя и морскія купанья.

Внутрь: 1) Давать *Игнація*×3 и *Аурумъ* 6 поперемѣнно черезъ 1—2 часа по 5 капель. Рекомендуется также давать черезъ каждые три дня по одному пріему утромъ *Белладонна* 30 и вечеромъ *Купрумъ* 30. Если эти два средства послѣ продолжительнаго употребленія не окажутъ пользы, то принимать утромъ и вечеромъ въ теченіе 8-ми дней *Рана буфо* 6, а затѣмъ 30, дѣлая послѣ каждыхъ 8-ми дней двухнедѣльную паузу. Это лѣченіе слѣдуетъ продолжать довольно долго.—2) Если падучая произошла вслѣдствіе душевнаго возбужденія, испуга: *Опій* 30 поперемѣнно съ *Белладонна* 30, а также *Игнація* 30.—3) Если припадку пред-

шествуютъ отрыжка и вздутіе живота, а во время припадка бываетъ скопленіе слизи или пѣны во рту и горлѣ, послѣ же припадка появляется глубокій сонъ: *Ляхезисъ* 30, 2 раза въ день по 5 капель.—4) При падучей у лицъ золотушныхъ, дурно упитанныхъ, преимущественно когда припадки появляются ночью: *Калькарея карбоника* 30.—5) Если припадки очень продолжительны и послѣ нихъ бываютъ: сонливость, упадокъ силъ, землистый цвѣтъ лица, запоры, колики: *Плюмбумъ* 30.—6) Кромѣ того бываютъ еще полезны: *Аурумъ броматумъ* 3, *Кали фосфорикумъ* 30, *Силицеа* 30 (при возвратахъ припадковъ во время полнолунія), *Кураре* 3 попеременно съ *Магнезія фосфорика* 6, а также *Энанте кроката* 1, въ особенности, когда припадки появляются во время сна.

Параличъ двигательный.

Причины: Простуда, ревматизмъ, механическія поврежденія, опухоли, а также послѣдствія пораженія головнаго и спиннаго мозга, кровоизліянія въ мозгу (апоплексіи) и т. п.

Признаки: При параличѣ нервовъ пораженная часть становится нечувствительною; ощущеніе ползанія мурашекъ, онѣмѣнія и одеревянѣнія. При апоплексіи одна сторона тѣла, рука, нога и т. д. бываетъ поражена параличемъ.

Лѣченіе: 1) При параличѣ вслѣдствіе ревматизма хорошо дѣйствуютъ *теплыя ванны*. Иногда помогаетъ и *электричество*. Кромѣ того, принимать внутрь *Авена* три раза въ день по 5 капель въ горячей водѣ.—2) При параличѣ послѣ удара: *Арника* 3 и *Белладонна* 3, по 3 раза въ день по 5 капель. Если эти средства не помогутъ, то *Русъ*×3 и *Цинкъ* 6 въ теченіе продолжительнаго времени, по 2 раза въ день по 3 капли.—3) При параличѣ личнаго нерва: *Каустикумъ* 3, *Белладонна* 3.—4) При параличѣ вѣкъ: *Спигелія* 3, *Сульфуръ* 6, въ теченіе долгаго времени.—5) При параличѣ языка: *Белладонна* 3, *Барита карбоника* 6, *Купрумъ* 6.—6) При параличѣ верхнихъ конечностей: *Ферруммъ* 6, *Нуксъ вомика* 3, *Русъ* 3.—7) При параличѣ нижнихъ конечностей: *Нуксъ вомика* 3, *Плюмбумъ* 6, *Секале корнутумъ* 3, *Русъ* 3.—8) При

параличѣ мочевого пузыря: *Стрихнинъ нитрикумъ* 6, *Белладонна* 3, *Феррумъ фосфорикумъ* 6.—9) При ревматическомъ параличѣ тазобедреннаго сустава: *Ледумъ* 3, *Колоцинтъ* 6.—10) При параличѣ суставовъ, руки и ноги: *Рута* 3.—11) При параличѣ вслѣдствіе ревматизма: *Бріонія* 3, *Арника* 3, *Русъ* 3.—12) При параличѣ вслѣдствіе промоченія разгоряченнаго тѣла: *Русъ* 3.—13) При параличѣ, происшедшемъ отъ пораженія головного или спинного мозга: *Секале корнутумъ* 3, *Плюмбумъ* 6 или *Цинкумъ* 6, *Белладонна* 3, по 2 раза въ день по 3 капли.—14) При параличѣ вслѣдствіе механическихъ поврежденій: *Арника* 3, *Русъ* 3, а если необходимо вызвать полное всасываніе выпота: *Кали іодатумъ* 2.—15) При старческомъ параличѣ: *Барита карбоника* 6.—16) При дѣтскомъ параличѣ: *Нуксъ вомика* 30 попеременно съ *Фосфоръ* 30.—17) При грозящемъ параличѣ легкихъ: *Тартарусъ эметикусъ* 3 и *Фосфоръ* 3.—18) При истерическомъ параличѣ: прикладывать къ парализованнымъ частямъ цинковыя пластинки.

Парши.

Признаки: Образованіе на головѣ круглыхъ, желтыхъ корокъ, съ небольшимъ углубленіемъ въ центрѣ каждой, которыя сидятъ либо отдѣльно одна отъ другой, либо сливаются между собою, покрывая иногда всю голову.

Лѣченіе: Слѣдуетъ остричь волосы какъ можно покороче; а тѣ изъ нихъ, которые потеряли свой блескъ, должны быть удалены съ помощью щипчиковъ. Затѣмъ, размягчивъ корни теплымъ масломъ или вазелиномъ, обмываютъ голову два раза въ день *арниковымъ мыломъ*. Послѣ этого втираютъ въ волосистую кожу растворъ, состоящій изъ 5 граммовъ *Ацидумъ карболикумъ*×1 въ 40 граммахъ *глицерина*, 40 граммъ *спирта* и 250 граммъ *воды*. Такое очищеніе головы отъ паршей нужно производить въ теченіе долгаго времени.

Внутрь: *Калькареа карбоника* 6, *Силицеа* 6, *Сульфуръ* 6, *Графитъ* 6, *Арсеникумъ іодатумъ* 5, утромъ и вечеромъ по одному пріему въ теченіе 5 дней, съ перерывами въ

8—14 дней, послѣ каждаго лѣкарства, которыя давать каждое отдѣльно.

Обыкновенныя сыпи на головѣ. При сухой сыпи: *Гепаръ сульфурисъ* 3; при мокнущей: *Русъ* 3; при вонючей: *Стафизагрія*.

Переломъ кости.

Признаки: Шумъ тренія одной кости объ другую на мѣстѣ перелома, при смѣщеніи отломковъ; боль; невозможность двигать переломленнымъ членомъ; мѣсто перелома утолщено, вслѣдствіе образованія въ немъ воспаленія.

Вспомогательныя мѣры до прихода врача: Прежде всего надо придать переломленному члену покойное положеніе; затѣмъ дѣлаютъ временную повязку, которая всего проще приготовляется слѣдующимъ образомъ: берутъ два бруска или двѣ планки или дощечки, или же два прута, длина которыхъ должна соотвѣтствовать длинѣ переломленной кости, затѣмъ кладутъ каждый изъ нихъ на концевые края нѣсколько разъ сложеннаго полотенца или холстины, которую и навертываютъ съ обоихъ концовъ ея на эти лубки до тѣхъ поръ, пока разстояніе между ними окажется лишь настолько велико, чтобы была возможность помѣстить тамъ переломленный членъ. Потомъ холстина эта прикрѣпляется къ помянутымъ планшеткамъ или лубкамъ помощью шнурковъ, или гвоздей, вслѣдствіе чего образуется желобокъ съ мягкою подкладкою и съ крѣпкими боковыми краями. Наконецъ, этотъ желобокъ тихо и осторожно подсовывается подъ переломленную конечность, при чемъ къ обѣимъ сторонамъ ея прикрѣпляется веревками еще по шинѣ. Положенный затѣмъ на носилки больной не ощущаетъ особенной боли и вмѣстѣ съ тѣмъ устраняется возможность смѣщенія переломленныхъ частей. При переломахъ же плечевой кости слѣдуетъ наложить сперва временную повязку, а затѣмъ взять руку на перевязь. Съ цѣлью уменьшенія воспаленія можно прикладывать къ пораженному мѣсту примочки изъ холодной воды съ тинктурою

Симфитумъ или съ *Арникой*, 1 ч. тинктуры на 20 ч. воды. Куреніе табаку оказываетъ вредное дѣйствіе на переломы, такъ какъ оно препятствуетъ образованію костной мозоли. Лѣченіе переломовъ идетъ значительно быстрѣе, если пострадавшій принимаетъ внутрь *Симфитумъ* 3 и *Арника* 3, по три раза въ день по 5 капель.

Печени болѣзни.

Воспаленіе печени.

Причины: Продолжительное давленіе на печень, какъ это бываетъ отъ корсета, отъ тугого стягиванія таліи ремнемъ или повязками отъ юбокъ; согнутое положеніе тѣла, къ которому часто прибѣгаютъ сапожники и швеи; злоупотребленіе спиртными напитками; невоздержность, распутство; лѣнивый образъ жизни; досада, печаль, горе, заботы; чрезмѣрная умственная дѣятельность; скрывшійся ножной потъ; задержанныя мѣсячныя очищенія; болѣзни желудка.

Предохранительныя мѣры. Абсолютное воздержаніе отъ спиртныхъ напитковъ; умѣренный образъ жизни; частое и довольно продолжительное движеніе на воздухѣ. Избѣгать: пучащихъ, трудноваримыхъ или разгорячающихъ кушаній и возбуждающихъ напитковъ. Всего лучше употреблять въ пищу: яблочный мусъ и компотъ, молодыя овощи, каши, спаржу, морковь, кисловатые плоды, чернику, бруснику, землянику, вишни, виноградъ, салаты. Вегетаріанскій образъ жизни. При этомъ обращать вниманіе на правильность испражненій. Массажъ въ застарѣлыхъ случаяхъ.

Признаки: Боль въ правомъ подреберіи; разстройство дыханія; часто боль въ правомъ плечѣ и въ правой рукѣ; разстройство пищеваренія; желтоватый цвѣтъ лица и глазного бѣлка; травянисто-зеленая рвота.

Лѣченіе: 1) при сильной лихорадкѣ *Аконитъ* 3 попеременно съ *Белладонною* 3, каждые $1^1/_2$—2 часа по 5 капель.—2) Если появятся чувствительность при давленіи на

область печени и колющія жгучія боли въ ней: *Бріонія* 3, раза 4 въ день по 3 капли.—3) При одутловатости лица, горькомъ вкусѣ во рту, твердой опухоли печени, рвотѣ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Нуксъ вомика* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—4) Для того же чтобы вызвать всасываніе оставшихся выпотовъ: *Сульфуръ* 6.

Опухоль печени.

Признаки: Чувство давленія и полноты подъ ложечкою, иногда и сильныя боли въ ней; зеленоватая рвота; слабая лихорадка; печень увеличена и чувствительна къ давленію.

Лѣченіе: 1) *Нуксъ вомика* 3, а затѣмъ *Натрумъ муріатикумъ* 6, *Ликоподіумъ* 6, *Сульфуръ* 30, по 3 раза въ день каждаго порознь по 3 капли; пьяницамъ же сверхъ того: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Фосфоръ* 6.—2) Женщинамъ: *Сепія* 6, два раза въ день по 3 капли.—3) Вслѣдствіе гнѣва: *Камомилла* 3.—4) Вслѣдствіе ушиба, удара и т. п. *Арника* 3.—5) При остановкѣ мѣсячныхъ очищеній: *Пульсатилла* 3 и *Сепія* 6.—6) При перемежающейся лихорадкѣ: *Хина* 1, *Арсеникъ* 3.—7) Въ застарѣлыхъ случаяхъ: *Гидрастисъ* 6, *Сульфуръ* 6. Во всѣхъ случаяхъ давать лѣкарства по 2—3 раза въ день по 5 капель.

Ожирѣніе печени.

Вегетаріанскій образъ жизни и много движенія.

Лѣченіе: *Нуксъ вомика* 3, *Натрумъ муріатикумъ* 6, *Ликоподіумъ* 6, *Калькареа карбоника* 6, *Келидоніумъ* 2, *Фосфоръ* 3,—каждое порознь, по 2 раза въ день по 5 капель. При ожирѣніи печени, какъ послѣдствіи пьянства: *Капсикумъ* 3 попеременно съ *Арсеникумъ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли.

Застойная печень.

Лѣченіе: *Кардуусъ маріанусъ* 2, попеременно съ *Натрумъ муріатикумъ* 3 или съ *Нуксъ вомика* 3, черезъ 3—4

часа по 5 капель. Также *Подофиллюмъ пельтатумъ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, *Келидоніумъ* 3.

Печеночныя пятна, ложныя, кожныя.

Причины: Недостаточный уходъ за кожею.

Признаки: Желтобурыя пятна, преимущественно на туловищѣ, гдѣ они занимаютъ иногда половину живота, груди, спины и затылка.

Лѣченіе: Основательное лѣченіе мыльными ваннами, обмываніями и обтираніями по указанію врача и принимать *Арсеникумъ* 6 и *Сепія* 6 продолжительное время, по 2 раза въ день по 5 капель.

Пищеваренія слабость.

Причины: Трудноваримыя острыя кушанья. Безмѣрное питье воды. Злоупотребленіе спиртными напитками, а также кофе, чаемъ, виномъ. Является также слѣдствіемъ другихъ болѣзней.

Признаки: Давленіе въ области живота и пученіе. Малый аппетитъ. Желаніе острой пищи. Частая отрыжка и иногда рвота послѣ ѣды. Исхуданіе.

Вспомогательныя мѣры: Строгая діэта. Ѣсть только удобоваримую пищу: молоко, молочные супы, бульонъ, сыворотку, яйца всмятку, молодую баранину, цыплятъ жареныхъ, бѣлую рыбу, яблочный мусъ и т. п. Запрещается: бобы, стручки, свѣже выпеченный хлѣбъ, пироги, жареное мясо, острые сыры и вообще неудобоваримое. Пищу должно тщательно пережевывать и ѣсть небольшими порціями, чтобы не переполнять желудка. На ночь лучше всего чашка хорошаго бульона и кусокъ нежирнаго мяса. Для лучшаго сваренія пищи полезно передъ ѣдою, за 1/4 часа, принять 5 капель *Ацидумъ муріатикумъ* × 1 въ ложкѣ сахарной воды. По утрамъ холодныя обтиранія. Ежедневныя прогулки на свѣжемъ воздухѣ. Очень полезно лѣченіе виноградомъ.

Лѣченіе: 1) Д-ръ Яръ совѣтуетъ принимать *Гепаръ сульфурисъ* 6, по 2 капли натощакъ, ежедневно.—2) При вялости пищеваренія и пученіи живота: *Нуксъ вомика* 3, передъ обѣдомъ (за ½ часа) 3 капли, и *Хина* 3, послѣ обѣда 3 капли.—3) При сонливости послѣ ѣды: *Нуксъ вомика* 3 передъ ѣдой, а *Ликоподіумъ* 6 послѣ ѣды.—4) Слабое пищевареніе, сопряженное съ отрыжкой и запахомъ изо рта: *Нуксъ вомика* 3 и *Графитъ* 6.—5) Слабое пищевареніе у стариковъ: *Нуксъ мосхата* 6.—6) Продолжительная вялость пищеваренія, обнаруживающаяся горькою отрыжкою, запорами, пученіемъ, слизистою или желчною рвотою, отсутствіемъ аппетита, бѣлымъ языкомъ: *Антимоніумъ крудумъ* 3, а также *Фосфоръ* 30, *Натрумъ муріатикумъ* 30, *Папаіотинъ* 3.

Пищевода воспаленіе.

Лѣченіе: 1) Если оно явилось слѣдствіемъ пораненія острымъ предметомъ: *Арника* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.—2) Отъ ожога: *Кантарисъ* 3.—3) При съуженіи пищепріемника: *Баптизія* 3.

Плевы подреберной воспаленіе, плевритъ.

Причины: Простуда, паденіе на грудь, ударъ въ грудь, раны груди, переломъ реберъ, воспаленіе легкихъ, легочная чахотка, омертвѣніе и нарывъ легкихъ, сочленовный ревматизмъ, скарлатина, корь, брюшной тифъ и т. д.

Признаки: Приступы озноба съ лихорадкою, колотье въ боку при дыханіи, одышка, кашель, головная боль, отсутствіе аппетита; иногда ломота, скопленіе жидкости въ грудной полости.

Лѣченіе: Согрѣвающіе компрессы на грудь, которые нужно перемѣнять 2—3 раза въ теченіе 24 часовъ. **Внутрь**: 1) *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Бріоніею* 3, принимать че-

резъ часъ по 5 капель, пока не прекратится колотье.—2) Для всасыванія выпота: *Сульфуръ* 3, попеременно черезъ день съ *Арсеникумъ іодатумъ* 3 или *Антимоніумъ арсенікозумъ* 2.—3) Въ длительныхъ случаяхъ: *Гепаръ сульфурисъ* 3 и *Кали іодатумъ* 1, по 3 раза въ день по 5 капель и по костяной ложечкѣ. Кромѣ того, для скорѣйшаго всасыванія выпотовъ очень полезенъ правильный ежедневный массажъ бока.

Пляска Св. Витта.

Причины: Общее ослабленіе организма. Блѣдная немочь. Переутомленіе отъ умственныхъ занятій. Душевныя волненія. Онанизмъ. Болѣзнь эта часто бываетъ наслѣдственною. Родители алкоголики.

Признаки: Болѣзнь развивается мало-по-малу, не сразу. Начинается съ общей усталости и раздражительности, затѣмъ неувѣренное движеніе въ рукахъ, подергиваніе личныхъ мускуловъ, непроизвольное движеніе губами, отрывистый разговоръ съ заиканіемъ; больной вывертываетъ верхнія конечности и руки и движеніе ногъ становится неувѣреннымъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ больной становится тупымъ, неспособнымъ мыслить и запоминать. Встрѣчается чаще всего у женщинъ и дѣвочекъ и въ возрастѣ отъ 6—20 лѣтъ.

Вспомогательныя мѣры: Обтирать спину комнатною водою 16°, мало-по-малу переходя къ совсѣмъ холодной. Полезны также холодные души спины. Лѣтомъ купанье въ рѣкѣ въ теченіе 3 минутъ. Пища должна быть очень питательная и легко переваримая. Если ребенокъ золотушный, то давать ежедневно утромъ и вечеромъ по столовой ложкѣ рыбьяго жира. Всего остраго, какъ уксусъ, перецъ, горчица, всякихъ соленій и маринадовъ избѣгать, а равно и всякихъ душевныхъ волненій и раздраженій.

Лѣченіе: 1) *Игнація* 6, и *Аурумъ* 6, попеременно, или *Купрумъ* 6, *Магнезія фосфорика* 6 *Цинкумъ сульфурикумъ* 30, *Агарикусъ мускаріусъ* 6, каждое порознь, по 2 раза въ день

по 5 капель, а во время припадковъ каждые 1/4 часа.—2) Когда все тѣло участвуетъ въ подергиваніяхъ: *Страмоніумъ* 6.—3) При гримасахъ, похожихъ на судорожный смѣхъ или плачъ: *Белладонна* 6, черезъ 2 часа по 5 капель.—4) Малокровнымъ дѣвочкамъ, въ особенности въ періодъ развитія: *Пульсатилла* 6.—5) Если болѣзнь является послѣдствіемъ онанизма: *Платина* 6, одинъ—два пріема въ день по 5 капель. Въ послѣднее время съ успѣхомъ дается *Аурумъ броматумъ* 3, по костяной ложечкѣ 3 раза въ день, также *Калабаръ* 3, *Каннабисъ* 3. Наибольшій успѣхъ даютъ: *Игнація*×3, *Аурумъ* 6, *Каннабисъ* 3, и у женскаго пола *Платина* 6.

Подагра.

Отложеніе извести въ суставахъ ногъ; (рукъ—хираграа).

Причины: Роскошная жизнь; обильный исключительно мясной столъ; употребленіе въ большомъ количествѣ крѣпкаго чернаго кофе, шампанскаго, вина, пива, и т. п., при недостаточномъ движеніи; дурное, сырое помѣщеніе; нездоровая пища; простуды; промоченіе; наслѣдственное предрасположеніе.

Признаки: Отсутствіе аппетита; разстройства пищеваренія; стѣсненіе въ груди; одышка; сердцебіеніе; моча, оставляющая значительный осадокъ щавелевокислой извести; сильная боль въ суставѣ большого пальца ноги, на которомъ образуется красная, напряженная опухоль. Со временемъ эти приступы болѣзни возвращаются. Мало-по-малу болѣзнь поражаетъ всѣ суставы. Послѣ частыхъ приступовъ въ суставахъ остаются твердые узлы отложившейся извести, которая пропитываетъ всѣ ткани суставовъ, отчего они становятся неподвижными и искривленными. Въ тяжелыхъ случаяхъ больной не въ состояніи пошевелить ни однимъ членомъ безъ того, чтобы не вызвать сильныхъ болей. Подагра появляется большею частью у мужчинъ между 30—40 годами жизни.

Лѣченіе: Вегетаріанскій образъ жизни, т.-е. употребленіе исключительно растительной пищи (молоко, яйца,

овощи, плоды). Избѣгать: мяса, особенно дичи, а также водки, пива, вина и кофе; чай разрѣшается, но не крѣпкій и предпочтительнѣе съ молокомъ. Въ качествѣ напитка, можно дозволить также чистую воду или съ прибавленіемъ плодовыхъ соковъ. Какъ народное средство, совѣтуютъ больныя ноги класть въ обваренную кипяткомъ, а затѣмъ выжатую сѣнную труху, которая, будучи разложена на кускѣ холста, должна образовать родъ хорошо покрывающей ногу повязки. Повязку эту нужно замѣнять черезъ два часа новою. Кромѣ того, бываютъ очень полезны теплыя ванны, принимаемыя черезъ каждые 2—3 дня, преимущественно же паровыя ванны изъ отвара сѣнной трухи. Затѣмъ движенія на чистомъ воздухѣ, комнатная гимнастика, массажъ пораженныхъ подагрою частей тѣла, чистый, свѣжій воздухъ въ жиломъ помѣщеніи. Также хорошо прикладывать къ болящимъ ногамъ мѣшечки, наполненные *нагрѣтою смѣсью пшеничныхъ отрубей съ молотымъ дикимъ каштаномъ* (конскимъ каштаномъ). Смѣсь эту нужно отъ времени до времени замѣнять новою. Равнымъ образомъ хорошо дѣйствуютъ *горячія песочныя ванны*, а также прикладываніе къ болѣзненнымъ членамъ *чистой ваты*. Пить ежедневно 1—2 бутылки минеральной воды *Оберзальцбруннен*ъ.

Внутрь: 1) При лихорадкѣ и умѣренной опухоли: *Аконитъ* 3 попеременно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, каждые 2—3 часа по 5 капель или 5 крупинокъ.—2) При рожистой опухоли и жестокихъ боляхъ; *Белладонна* 3 попеременно съ *Аписъ* 3 или *Сабина* 3.—3) Если боли переходятъ на другіе суставы, а также при темной мочѣ: *Кольхикумъ* 3.—4) При боляхъ въ ногахъ, которыя затрудняютъ походку: *Феррумъ пикриникумъ* 3, 3 раза въ день по 5 капель.—5) Кромѣ того, *Литіумъ* 1, *Бріонія* 3, *Пульсатилла* 3, *Арсеникумъ* 3. Если отъ нихъ не послѣдуетъ улучшенія, то давать *Сульфуръ* 6, по одному пріему въ день.

Въ длительныхъ случаяхъ: 1) При отложеніяхъ извести въ суставахъ: *Кали іодатумъ* 1, три раза въ день по 5 капель на ложечку воды. Средство это нужно употреблять долго, дѣлая по временамъ остановку на 8—14 дней. Часто приходится усилить дозу, а именно: давать

утромъ и вечеромъ по 10—20 капель раствора 1 части *Кали іодатумъ* въ 50 частяхъ воды (1:50).—2) При подагрическихъ узлахъ: *Калькареа корбоника* 6, *Силицеа* 6, *Ликоподіумъ* 3, по одному пріему въ теченіе 3—4 дней, затѣмъ дѣлать перерывъ въ 8—14 дней.

Подергиванія у маленькихъ дѣтей.

Причины: Употребленіе кормилицею спиртныхъ напитковъ или ромашки въ значительномъ количествѣ; страхъ, испугъ. Подергиванія могутъ перейти легко въ конвульсіи и судороги.

Лѣченіе: 1) *Камомилла* 3 и *Игнація* 6, по 1—2 капли раза 4 въ день.—2) Если подергиванія вызваны глистами: *Цина*×3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, по 2 раза въ день по 2 капли.—3) Если же подергиванія переходятъ въ конвульсіи: *Белладонна* 3, черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа по 2 капли.

Полипы.

Разращенія слизистой оболочки въ носу и др. полостяхъ.

Внутрь давать *Кали хлорикумъ* 3 и *Теукріумъ* 1, по 2 раза въ день по 3 капли или 5 крупинокъ поперемѣнно. Снаружи кисточкою смазывать полипы *Эссенціею Теукріума*, чистою или смѣшанною пополамъ съ глицериномъ. Если полипы глубокіе, неудобные для смазыванія, то нужно дѣлать растворъ *Теукріумъ глицерина*, столовую ложку на стаканъ воды, и втягивать въ носъ раза 3 въ день. Рекомендуется также употребленіе внутрь: *Аурумъ* 6, *Калькареа карбоника* 6, *Коніумъ* 6, а при кровоточивыхъ полипахъ *Фосфоръ* 6 и *Туя* 6.

Полипъ носовой.

Втягиванія въ носъ *Теукріумъ глицерина* (1 часть на 5 частей воды) ежедневно раза 3—4, или смазываніе наростовъ

чистою эссенціею посредствомъ кисточки. Также хорошо нюхать порошокъ противъ носового полипа.

Лѣченіе: 1) При слизистомъ полипѣ—*Калькареа карбоника* 6, по 1 разу въ день утромъ 2 капли; если это не помогаетъ, то *Сульфуръ* 6 и *Кали бихромикумъ* 3, черезъ день поперемѣнно, по 2 раза въ день.—2) При мясистомъ полипѣ: *Силицеа* 6, *Фосфоръ* 6 и *Кали бихромикумъ* 3, поперемѣнно.—3) При заостренныхъ полипахъ: *Туя* 30, принимать продолжительное время.

Поносъ.

Катарръ слизистой оболочки желудочно-кишечнаго канала.

Причины: Простуда, зараженіе, погрѣшности въ пищѣ или питьѣ, употребленіе неспѣлыхъ плодовъ, дурного молока, молодого пива, холодныхъ жидкостей при разгоряченномъ тѣлѣ; прорѣзываніе зубовъ и раздраженіе глистовъ у дѣтей и т. п.

Вспомогательныя мѣры: Остерегаться всякихъ сильныхъ лѣкарственныхъ средствъ и соблюдать самую строгую діэту. Употреблять въ пищу только тепловатыя кушанья, состоящія изъ ячменной и овсяной кашки, и пить слизистые отвары изъ риса, салепа и т. п. Хлѣбъ разрѣшается только бѣлый, но сухой, черствый. Запрещается: варенье, молоко, холодная вода и чистая сахарная вода. На желудокъ согрѣвающіе компрессы или прикладыванія согрѣтыхъ подушекъ, фланели и т. п., а затѣмъ носить шерстяной бинтъ.

Лѣченіе: поносъ у взрослыхъ: 1) Послѣ простуды: *Дулькамара* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, *Арсеникъ* 6.—2) Послѣ погрѣшностей въ діэтѣ, когда языкъ обложенъ: *Антимоніумъ крудумъ* 6, *Ипекакуана* 3, *Пульсатилла* 3, *Бріонія* 3.—3) Послѣ употребленія неспѣлыхъ плодовъ: *Арсеникъ* 6, *Хина* 3.—4) Послѣ гнѣва, непріятности, досады: *Колоцинтисъ* 3, *Камомилла* 3.—5) Послѣ страха, испуга *Арсеникъ* 6, *Вератрумъ* 3, *Опіумъ* 6.—6) Чтобы предотвратить поносъ послѣ испуга, нужно принять 1—2 пріема

Гельземинумъ 3.—6) Послѣ питья холоднаго: *Арсеникъ* 6, *Пульсатилла* 3.—7) При поносѣ съ кровью: *Меркуріусъ коррозивусъ* 6, *Креозотъ* 3.—8) Съ жиленіемъ, натугою, тошнотою, изъязвленіемъ задняго прохода: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—9) Когда отдѣленія безболѣзненны и внезапны: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3.—10) Если испражненія являются послѣ каждой ѣды: *Бромъ* 3.—11) Слизистый кровянистый поносъ, особенно ночью: *Колоцинтисъ* 3, *Кольхикумъ* 3, *Пульсатилла* 3.—12) Поносъ со рвотой: *Ипекакуана* 3, *Арсеникъ* 6, *Вератрумъ* 3.—13) Скудныя испражненія, но частыя, особенно утромъ и къ вечеру: *Русъ* 6.—14) Когда испражненія состоятъ изъ смѣшанныхъ (жидкихъ и твердыхъ) отдѣленій: *Антимоніумъ крудумъ* 6.

Продолжительные поносы: *Калькареа карбоника* 6 или *Калькареа ацетика* 3, поперемѣнно съ *Ацидумъ фосфорикумъ* 6; или *Сульфуръ* 6 поперемѣнно съ *Хининумъ таникумъ* 3.

Поносъ у дѣтей. Никогда не слѣдуетъ запускать дѣтскаго поноса, успокаивая себя тѣмъ, что онъ происходитъ вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ и что его не надо задерживать.

Лѣченіе: 1) При водянистыхъ, вонючихъ, зеленыхъ или похожихъ на рубленыя яйца испражненіяхъ, которыя вызываютъ боли, отъ которыхъ ребенокъ кричитъ и корчится: *Камомилла* 3.—2) При зеленыхъ, какъ трава, испражненіяхъ, соединенныхъ съ тошнотою, рвотою, коликою: *Ипекакуана* 3.—3) При частыхъ, зеленыхъ, слизистыхъ или кровянистыхъ испражненіяхъ съ жиленьемъ, ухудшающихся ночью: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—4) При водянистыхъ желтыхъ или зеленыхъ испражненіяхъ, которыя съ силою извергаются чаще всего во время питья или немедленно послѣ питья: *Кротонъ* 6.—4) При обильныхъ, водянистыхъ испражненіяхъ, соединенныхъ часто съ жаждою и рвотою, съ изнуреннымъ видомъ ребенка, иногда съ сильными болями и холоднымъ потомъ на лбу: *Вератрумъ* 6.—6) При испражненіяхъ, которыя имѣютъ кислый запахъ, водянисты или перемѣшаны съ комочками свернувшагося молока, при чемъ появляется у ребенка также рвота, какъ это бываетъ не-

рѣдко при отнятіи ребенка отъ груди и вообще вслѣдствіе перемѣны пищи: *Калькареа ацетика* 3 или же *Натрумъ фосфорикумъ* 6.—7) Если послѣ кратковременнаго поноса наблюдаются большой упадокъ силъ, лицо ребенка становится старческимъ и морщинистымъ, кожа больного суха, а испражненія повторяются очень часто: *Калькареа фосфорика* 3.—8) При густыхъ или водянистыхъ, темнаго цвѣта испражненіяхъ, которыя вызываютъ жженіе, очень вонючи и соединены съ жаждою и безпокойствомъ, со рвотою или безъ нея: *Арсеникъ* 6.—9) При водянистыхъ, часто обильныхъ испражненіяхъ, языкѣ, покрытомъ бѣлымъ налетомъ, зеленой рвотѣ, которая появляется вскорѣ послѣ кормленія грудью: *Антимоніумъ крудумъ* 6.—10) При зеленыхъ, водянистыхъ, пѣнистыхъ и кислыхъ испражненіяхъ, перемѣшанныхъ нерѣдко съ кусочками свернувшагося молока, и также кислой рвотѣ съ коликою въ животѣ: *Реумъ* 3, *Магнезія карбоника* 6.—11) При водянистыхъ желтоватыхъ и зеленоватыхъ испражненіяхъ, которыя извергаются безъ боли, но быстро и съ силою и не ослабляютъ ребенка, а также при лѣтнемъ поносѣ: *Секале корнутумъ* 3.—12) При темныхъ, жидкихъ, вонючихъ испражненіяхъ, въ которыхъ содержатся кожистые лоскутки, отходящіе съ сильными вѣтрами и отрыжкою, а также и коликѣ: *Аргентумъ нитрикумъ* 3.—13) При поносѣ, сопровождаемомъ выпаденіемъ прямой кишки при внезапныхъ безболѣзненныхъ, водянистыхъ, вонючихъ испражненіяхъ: *Подофилумъ* 3.—14) Испражненія водянисты или слизистыя зеленоватыя, у нервныхъ дѣтей или во время прорѣзыванія зубовъ, а также при сильной жарѣ лѣтомъ: *Кастореумъ* 3.—15) Поносъ безболѣзненный, съ урчаніемъ; ребенокъ имѣетъ старческій видъ: *Фосфоръ* 6.—16) Испражненія съ кислымъ запахомъ, боли въ животѣ, вызывающія корчи, безъ лихорадки: *Феррумъ фосфорикумъ* 6.

При длительномъ поносѣ: *Калькареа карбоника* 6 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, поперемѣнно, или *Сульфуръ* 6 и *Калькареа ацетика* 3, черезъ день поперемѣнно. Если послѣ поноса со рвотою поносъ не прекращается, то давать: *Калькареа кар-*

боника 6 или 30. Если ребенокъ очень слабъ, то ставить 1—2 раза въ день клистиры изъ теплой овсянки съ прибавленіемъ 10 капель *Хина* Θ. При поносѣ съ лихорадкою слѣдуетъ давать *Аконитъ* 3 или *Белладонна* 3 попеременно съ однимъ изъ вышеуказанныхъ средствъ.

Пострѣлъ или боль въ крестцѣ.

Причины: Простуда, надсада, надрывъ.

Признаки: внезапная сильная боль въ крестцѣ, недозволяющая согнуться, разогнуться или встать съ мѣста.

Лѣченіе: Спокойное положеніе тѣла, горячіе компрессы на крестецъ, паровая ванна или баня, массажъ, втиранія изъ 1 части *тинктуры Русъ* съ 10 частями водки или смѣсью *Арникового масла* съ нѣсколькими каплями тинктуры *Белладонна*.

Внутрь: *Нуксъ вомика* 3 попеременно съ *Русъ* 3 или *Арника* 3, черезъ 1—2 часа по 5 капель. Кромѣ того, очень рекомендуютъ *Секале корнутумъ* 3 и *Каустикумъ*.

Потливость.

Нужно какъ можно меньше употреблять жидкостей и часто обтираться холодною водою. Если потѣютъ ноги, то полезно дѣлать ножныя ванны и посыпать ихъ порошкомъ отъ ножнаго пота.

Лѣченіе: 1) Ночные поты: *Пилокарпинъ* 6 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 1, по 2 раза въ день по 5 капель.—2) Дневные поты: *Самбукусъ*×3, 2 раза въ день по 5 капель.—Подмышечный потъ: *Сепія* 6, 2 раза въ день по 5 капель.

См. **Ножной потъ**.

Почекъ воспаленіе.

Причины: Простуда, ушибъ, мѣстныя поврежденія, почечные камни, страданія сердца, алкоголизмъ, сифилисъ и пр.

Признаки: Боль подъ ребрами сзади у самаго позвоночника. Лихорадка. Потрясающій ознобъ. Рвота, усиливающаяся по мѣрѣ усиленія боли. Частые позывы къ мочеиспусканію, но уменьшеніе количества мочи. Моча содержитъ бѣлокъ и примѣсь крови. При существованіи нарывовъ и вскрытіи таковыхъ, моча гнойная. При улучшеніи является обильный потъ и отдѣляется значительное количество густой, слизисто-гнойной, дающей большой осадокъ мочи. Дурными предвѣстниками служатъ: частые потрясающіе ознобы, сильная лихорадка и полное задержаніе мочи.

Вспомогательныя мѣры: Посадить больного въ теплую ванну 27—28° Реомюра на $^1/_2$ часа, затѣмъ закутать въ теплыя шерстяныя одѣяла и положить въ постель, чтобы онъ хорошенько потѣлъ. Эту манипуляцію продолжать до полнаго выздоровленія. При головной боли и тошнотѣ не слѣдуетъ брать ваннъ. Больной долженъ ежедневно выпивать $^1/_4$ литра (2—3 стакана) горячей воды. Также очень полезны согрѣвающіе компрессы (влажная простыня, клеенка и шерстяное одѣяло), въ которые больной завертывается съ руками и ногами на 4—6 часовъ. Такія завертыванія нужно повторять ежедневно въ теченіе 6—8 дней. Запрещается: вино, пиво, кофе, спаржа, щавель, горчица, лукъ, петрушка и вообще всѣ мочегонныя средства. Разрѣшается: молоко, яйца всмятку, бульонъ, жаркое изъ курицы или молодой баранины, яблочный мусъ, При лихорадочныхъ формахъ: только молоко, жидкій бульонъ или супъ. Также разрѣшаются газированные напитки, какъ сельтерская, содовая и т. п.

Лѣченіе: 1) въ началѣ болѣзни, если причиною служитъ простуда, при лихорадкѣ, сильныхъ боляхъ, приливахъ крови къ головѣ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, попеременно черезъ $1^1/_2$—2 часа по 5 капель или по 5 крупинокъ.—2) При отдѣленіи мочи каплями съ колющими бо-

лями, распространяющимися до мочевого пузыря: *Аконитъ* 3 и *Кантарисъ* 6, попеременно черезъ 1—2 часа.—3) Алкоголикамъ даютъ еще кромѣ того *Нуксъ вомика* 3, два-три пріема въ день по 5 капель.—4) Если по прекращеніи лихорадки остались давящія боли, позывы къ мочеиспусканію при незначительномъ отдѣленіи кровавой мочи, то давать *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ два часа по костяной ложечкѣ. 5) При почечномъ воспаленіи отъ ушиба, удара и т. п. лучшимъ средствомъ является *Арника* 3 вперемежку съ *Аконитомъ* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.

Почечные камни (колики).

Лѣченіе: Внутрь принимать *Ликоподіумъ* 6, четыре раза въ день по 5 капель, и пить минеральную воду *Оберзальцбруннен*ъ 1—2 бут. въ день. Весьма дѣйствительно *Литіумъ* 1 три раза въ день по костяной ложечкѣ.

Приливъ крови къ головѣ.

Причины: Спиртные напитки; чрезмѣрное физическое или умственное напряженіе, или душевное возбужденіе; душный, спертый воздухъ; жаръ; слишкомъ узкая одежда; упорные запоры. Появляется всего чаще у полнокровныхъ.

Признаки: головная боль, головокруженіе, краснота лица, шумъ въ ушахъ, мерцаніе предъ глазами, душевное безпокойство, затрудненное дыханіе.

Вспомогательныя мѣры: Регулированіе (упорядоченіе) образа жизни больного. Выпивать ежедневно утромъ по глоткамъ стаканъ свѣжей воды; носить свободную, не стѣсняющую дыханіе одежду; избѣгать спиртныхъ и горячительныхъ напитковъ и всякихъ волненій, возбужденій и напряженій. При запорахъ ставить ежедневно промывательныя (клистиры) изъ холодной воды и стараться посредствомъ соотвѣтствующей пищи привести въ порядокъ пищеварительные органы и добиться правильныхъ испражненій. По

утрамъ ежедневно обтираніе тѣла холодною водою или холодный душъ; теплыя ножныя ванны; головная паровая ванна съ послѣдующимъ поливаніемъ ея холодною водою и растираніемъ.

Лѣченіе: 1) При полномъ и твердомъ пульсѣ, ускоренномъ при усиленномъ біеніи сердца: *Аконитъ* 3, *Гельземинумъ* 3.—2) При краснотѣ лица: *Белладонна* 3.—3) Во время регулъ: *Крокусъ* 3.—4) Вслѣдствіе спиртныхъ напитковъ: *Нуксъ вомика* 3, *Белладонна* 3.—5) При сопутствующихъ запорахъ: *Нуксъ вомика* 6, *Бріонія* 6, *Опій* 12, а если эти запоры продолжительны, то *Сульфуръ* 30.—6) При скопленіи вѣтровъ, запорѣ съ образованіемъ кислотъ въ желудкѣ: *Карбо вегетабилисъ* 6 и *Ликоподіумъ* 6.—7) Вслѣдствіе половой невоздержности, распутства: *Фосфоръ* 6.

Пролежни.

Омертвѣніе кожи и подкожной клѣтчатки, вслѣдствіе продолжительнаго нахожденія въ постели у истощенныхъ больныхъ; появляются нерѣдко на спинѣ или ягодицахъ очень болѣзненныя изъязвленныя мѣста, переходящія часто въ омертвѣніе.

Для предупрежденія пролежней слѣдуетъ ставить подъ кровать больного *тазъ со свѣжею водою*, которую часто перемѣнять. Подъ самого же больного слѣдуетъ подкладывать мягкую шкуру оленя или дикой козы (шерстью внизъ), либо воздушныя или наполненныя водою подушки, при чемъ почаще мѣнять положеніе больного. Покраснѣвшія мѣста надо обмывать воднымъ *растворомъ арники* (30 капель тинктуры на чашку воды); точно такъ же хорошо смазывать ихъ *смѣсью яичнаго бѣлка со спиртомъ* (1 часть бѣлка на 4 части спирта) или смазывать пролежни *вазелиномъ* или *мазью* изъ *Гамамелиса*. Если покажется омертвѣніе, то на пораженныя мѣста накладывать ветошки, смоченныя воднымъ *растворомъ креозота* (1 : 100), которыя прикрѣпляютъ помощью липкаго пластыря; либо смазываютъ *камфарнымъ спиртомъ* или *смѣсью 1 ложки краснаго вина*

съ 2 каплями камфарнаго спирта; частыя обмыванія настоемъ ромашки; ванны.

Внутрь: *Хина* 3 и *Арсеникъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ. При кровотеченіи изъ пролежней: *Секале корнутумъ* 3, *Миллефоліумъ* 3, *Гамамелисъ* 3.

Просовидная потница.

Высыпаніе по всему тѣлу свѣтлыхъ узелковъ и пузырьковъ, величиною въ крупную песчинку; стѣсненіе въ груди лихорадка и обильный, иногда съ сильнымъ запахомъ потъ.

Лѣченіе: При сильномъ жженіи смазывать сыпь *кокосовымъ масломъ*, *мазью изъ какао* или чистымъ саломъ. Помѣщеніе для такого больного должно быть не жаркое, а прохладное, 15—16 градусовъ. Давать при лихорадочныхъ явленіяхъ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3; при стѣсненіи и боли въ груди и подъ ложечкой: *Кактусъ* 3; при сильномъ потѣ: *Яборанди* 3; при внезапномъ скрытіи сыпи: *Сульфуръ* 6 или *Гепаръ* 6, *Бріонія* 3, *Аписъ* 3.—Лѣкарства давать по 3 раза въ день поперемѣнно по 5 капель.

Раны.

При маленькихъ рѣзанныхъ ранахъ или механическихъ поврежденіяхъ нужно соединить края раны и налѣпить на нихъ *арниковый пластырь*. Большія же раны должны быть прежде всего основательно очищены гигроскопическою ватою, а попавшія туда постороннія тѣла тщательно удалены. Для того чтобы удалить изъ раны грязь, гной и т. п., слѣдуетъ промыть ее нѣсколько разъ гигроскопическою ватою, намоченною въ растворѣ *Меркуріусъ коррозивусъ* × 3, 20 капель на стаканъ воды. Затѣмъ соединить, насколько возможно, края раны такъ, чтобы она сама и края раны остались нѣсколько покрыты кровью. Послѣ этого наложить на нее *Боллевскую повязку*, для чего смачиваютъ чистую ги-

гроскопическую вату въ *Арникѣ* или *Календулѣ* *) такъ, чтобы съ нея капало, и накладываютъ ее на рану; поверхъ этого кладутъ пластъ сухой ваты, который стягиваютъ полосками липкаго пластыря. Затѣмъ покрываютъ эту повязку опять ватою или салициловою ватою и все это прикрѣпляютъ бинтомъ. Такую повязку оставляютъ до тѣхъ поръ, пока не заживетъ рана; только въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣдуетъ нагноеніе (что, однако, весьма рѣдко бываетъ), нужно перемѣнить повязку. Этотъ способъ лѣченія ранъ гораздо успѣшнѣе Листер'овскаго. Злокачественный гной очень жидокъ, вонючъ и мѣшаетъ заживленію ранъ, дно же раны, по очищеніи ея отъ такого гноя, не розоватаго цвѣта, а грязнаго, свѣтло-краснаго или сальнаго цвѣта. Доброкачественный же гной похожъ на сливки, густой и не имѣетъ зловоннаго запаха.

Лѣченіе: Для предупрежденія рожистаго воспаленія ранъ давать *Белладонна* 3 и *Графитъ* 6, черезъ 2 часа по 5 капель. Заживленію всякихъ ранъ вообще способствуетъ *Арника* 3, принимаемая черезъ 2 часа. При сильной лихорадкѣ: *Аконитъ* 3 попеременно съ *Арника* 3, черезъ 2 часа по 5 капель. При нагноеніи принимать, въ видѣ промежуточнаго средства, по два раза въ день *Гепаръ сульфурисъ* 3, одно или попеременно съ *Силицеа* 6. При образованіи дикаго мяса давать ежедневно по одному пріему *Силицеа* 6 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и прикладывать масло изъ 10 капель *Меркуріусъ коррозивусъ*×3 на *1 унцію прованскаго масла.* При образованіи рожи: *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3, по 3 раза въ день каждое, попеременно по 3 капли.

Ракъ желудка.

Причины: Наслѣдственность. Горячіе напитки. Чрезмѣрное употребленіе спиртныхъ напитковъ. У женщинъ въ климактерическомъ періодѣ.

---

*) *Календула*—при свѣжихъ, рѣзанныхъ, кровоточащихъ ранахъ; *Арника*—при ушибленныхъ ранахъ.

Признаки: Отсутствіе аппетита. Давленіе въ желудкѣ. Жгучія, грызущія боли въ подложечной области, распространяющіяся къ пупку и въ лопатки. Рвота *кофейной гущей*; изжога. Кислая отрыжка. Ухудшеніе послѣ ѣды. Слюнотеченіе. Иногда рвота съ примѣсью крови темнаго цвѣта. Запоры, переходящіе въ поносы. Быстрое исхуданіе. Желтоватый, землистый цвѣтъ лица.

Діэта: Питательная пища: молоко, бульонъ, нѣжное жареное мясо. Всѣ пищевыя средства должны быть употребляемы въ жидкомъ или мелко измельченномъ видѣ. При рвотѣ, въ особенности кровавой, глотать кусочки льда. При упорныхъ запорахъ дѣлать ежедневные клистиры.

Лѣченіе: 1) *Нуксъ вомика* 3 попеременно съ *Арсеникумъ іодатумъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель.—2) Если причиною былъ ушибъ или паденіе, то *Коніумъ* 3 попеременно съ *Кондуранго* 2 или съ *Гидрастисъ* 3.—3) При съуженіи пищевода—*Баптизія* 3, черезъ 2 часа по 5 капель.

Наибольшее облегченіе даетъ *Кондуранго* 1.

Ракъ.

Причины: Ударъ, толчокъ, прищемленіе и т. п. Наслѣдственное предрасположеніе. Губной ракъ можетъ произойти вслѣдствіе кусанія губъ. Всего чаще ракъ появляется на женскихъ грудяхъ.

Признаки рака грудныхъ железъ: Сначала образуется на одной изъ грудей маленькая, кругленькая, безболѣзненная опухоль. Мало-по-малу опухоль эта начинаетъ разрастаться и становится бугристою. Изъ соска сочится водянисто-кровянистая жидкость. Боли дѣлаются постоянными и колющими. Подкрыльцовыя железы опухаютъ. Лицо становится блѣднымъ, сѣрожелтымъ, а самъ больной худѣетъ. Наконецъ, образуется на пораженномъ мѣстѣ пузырекъ или трещина, изъ которой и образуется язва. Отдѣленіе ея зловонно, и часто бываютъ кровотеченія.

Лѣченіе: Опухоль слѣдуетъ какъ можно скорѣе вырѣзать, такъ какъ запаздываніе въ данномъ случаѣ можетъ

быть весьма пагубнымъ. Діэта должна быть не возбуждающая, но укрѣпляющая и преимущественно растительная. Слѣдуетъ пить *сокъ ложечной травы* (Cochlearia) или *жерухи* (водяного кресса) и на рану прикладывать раздавленную *бруснику*.—Принимать по 2 раза въ день 5 капель *тинктуры Кондуранго*, а позднѣе *Кондуранго* 1.

а) **При ракѣ грудной железы:** *Силицеа* 6, утромъ и вечеромъ; *Гидрастисъ* 1 попеременно съ *Фитолакка*×3, по 2 раза въ день по 5 капель, а также и *Коніумъ* 3. — Затѣмъ слѣдуетъ принимать въ теченіе продолжительнаго времени *Калькареа карбоника* 6, даже послѣ изчезновенія опухоли (узелковъ).

б) **При ракѣ матки:** *Гидрастисъ* 1 попеременно съ *Коніумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель, и утромъ и вечеромъ спринцованія изъ *Коніумъ* Θ, чайную ложку на кружку воды.

в) **При ракѣ желудка:** См. выше, стр. 192.

г) **При ракѣ печени:** *Тапсія африкана* 6, три раза въ день по 5 капель (средство, недавно вошедшее въ употребленіе) и *Арсеникъ* 3, утромъ и вечеромъ.

д) **При ракѣ носа:** *Аурумъ муріатикумъ натронатумъ* 3, утромъ и вечеромъ по 5 капель.

е) **При ракѣ на губахъ:** *Коніумъ* 3 и *Ацидумъ нитрикумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.

ж) **При ракѣ языка:** *Арника* 3, *Коніумъ* 3, *Арсеникъ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, *Вибурнумъ прунифоліумъ* 3.

з) **При ракѣ прямой кишки:** *Алюмина* 6 и *Коніумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.

Рвота.

Наблюдается при самыхъ разнообразныхъ заболѣваніяхъ.

Причины: Обремененіе желудка; отравленія; болѣзни желудка; сотрясенія и другія болѣзни головного мозга; мигрень. Затѣмъ рвота появляется въ началѣ заболѣваній острыми заразительными болѣзнями (оспа, скарлатина и др.).

Вспомогательныя мѣры: При тошнотѣ не слѣдуетъ никогда употреблять рвотныхъ, такъ какъ они всегда вредно дѣйствуютъ на организмъ, а надо стараться вызвать рвоту питьемъ теплой воды или молока, или посредствомъ щекотанія зѣва бородкою пера. При обремененіи желудка нужно воздерживаться отъ всякой пищи, кромѣ сухой булки и слизистыхъ отваровъ. На желудокъ наложить согрѣвательный компрессъ и глотать кусочки льду.

Лѣченіе: 1) При разстройствѣ желудка и густо обложенномъ языкѣ: *Ипекакуана* 3 и *Антимоніумъ крудумъ* 6, черезъ 1—2 часа по 5 капель въ ложечкѣ холодной воды.— 2) При рвотѣ, вслѣдствіе употребленія въ пищу жирныхъ веществъ, пироговъ, пирожковъ и т. п.: *Пульсатилла* 3, каждые 1—2 часа по 5 капель.—3) Вслѣдствіе спиртныхъ напитковъ: *Нуксъ вомика* 3. — 4) Вслѣдствіе холоднаго питья: *Арсеникъ* 6.—5) При нервной рвотѣ: *Игнація* 3, черезъ $^1/_2$ часа по 3 капли пріема 2—3, а затѣмъ рѣже.—6) При рвотѣ вслѣдствіе удара, ушиба, паденія и т. д.: *Арника* 3, *Аконитъ* 3, *Белладонна* 3. — 7) Вслѣдствіе ѣзды, морского путешествія, качанія и т. п. *Кокулюсъ* 3, *Арсеникъ* 6.—8) При беременности: *Ипекакуана* 3, *Нуксъ вомика* 3, *Сепія* 6 (принимать утромъ натощакъ) по 5 капель.—9) При малокровіи: *Феррумъ фосфорикумъ* 6.—10) При блѣдной немочи: *Пульсатилла* 3, утромъ и вечеромъ.—11) Вслѣдствіе гнѣва: *Нуксъ вомика* 3 и *Камомилла* 3, по 3 капли черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа попеременно.—12) Вслѣдствіе испуга: *Игнація* 3 и *Аконитъ* 3, черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа по 3 капли, нѣсколько пріемовъ.

У дѣтей: 1) Рвота молокомъ у грудныхъ дѣтей: *Ипекакуана* 3, *Этуза цинапіумъ* 3, черезъ 2 часа по 1 каплѣ.— 2) Рвота съ болью живота: *Камомилла* 3, черезъ 1 часъ по 1 каплѣ.—3) Рвота съ запоромъ: *Нуксъ вомика* 3.—4) Рвота съ поносомъ: *Вератрумъ* 6, *Арсеникъ* 6.—5) Вслѣдствіе слабительныхъ: *Арсеникъ* 6, *Хина* 3, черезъ 2 часа попеременно по 1 каплѣ. Лѣкарства давать въ небольшомъ количествѣ грудного молока или отварной воды.

„Кровавая рвота“ см. стр. 131.

Ревматизмъ мышечный.

Причины: Простуда, сквознякъ, промоченіе и быстрое охлажденіе потнаго тѣла.

Признаки: Тянущія рвущія боли въ мускулахъ. Боли эти бываютъ мѣстныя, общія или переходящія. Ознобъ, повышеніе температуры тѣла.

Предохранительныя мѣры: Самымъ лучшимъ предохранительнымъ средствомъ отъ простуды служатъ ежедневныя холодныя обтиранія тѣла и купанія.

Вспомогательныя мѣры: Согрѣвающіе влажные компрессы на пораженные члены или на все тѣло. Паровыя ванны на отдѣльные члены или общія, для потѣнія. Теплыя ванны съ послѣдующимъ прохладнымъ душемъ. Массажъ болящихъ частей. Втиранія въ болящія мѣста теплаго масла, смѣшаннаго съ *тинктурою Русъ* или *Аконитинъ спиртомъ*, а также *ополдельдоки:* изъ *Бріоніи* и *Руса*—при суставномъ ревматизмѣ; изъ *Ледумъ*—при мышечномъ ревматизмѣ; изъ *Кольхикумъ*—при ревматизмѣ съ большою чувствительностью при дотрогиваніи: въ этихъ случаяхъ нельзя втирать, а только смазывать разогрѣтымъ *ополдельдокомъ* или мазью *Кольхикумъ*.

Лѣченіе: 1) При ревматизмѣ съ лихорадочнымъ состояніемъ, безсонницею: *Аконитъ* 3 и *Русъ**) 3 поперемѣнно, черезъ 1 часъ по 5 капель, а также часто помогаетъ *Бріонія**) 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3.—2) При колотіи и сильной боли въ сочлененіяхъ, въ особенности ночью и при дотрогиваніи: *Аконитъ* 3 и *Кольхикумъ* 3, поперемѣнно, каждый часъ по 5 капель.—3) Невыносимыя боли въ плечахъ, спинѣ и во всѣхъ суставахъ, вслѣдствіе сквозняка или простуды, или случайнаго промачиванія всего тѣла въ холодную сырую погоду—*Феррумъ фосфорикумъ*×6, по костяной ложечкѣ каждые два часа, а утромъ и вечеромъ по 5 капель *Аконитъ* 1.—4) Боль въ спинѣ, въ особенности при вставаніи и нагибаніи: *Бріонія* 3 и *Каустикумъ* 3, по-

---

*) *Русъ*—при мышечномъ ревматизмѣ; *Бріонія*—при суставномъ.

перемѣнно черезъ 3 часа.—5) Боли въ рукахъ и пальцахъ: *Калькареа карбоника* 6, *Каустикумъ* 6, *Ликоподіумъ* 6.—6) Боли въ бедренномъ суставѣ: *Колоцинтисъ* 3, *Русъ* 4, *Арсеникъ* 6.—7) Боли въ колѣняхъ: *Бріонія* 3, *Каустикумъ* 3, *Хина* 3.—8) При боляхъ, переходящихъ на сердце: *Спигелія* 3, *Арсеникъ* 6, *Бріонія* 3, *Аконитъ* 3.

Хроническій ревматизмъ или запущенныя формы.—1) При тянущихъ, рвущихъ боляхъ съ чувствомъ паралитической слабости, ухудшеніи ночью въ постели, улучшеніи днемъ: *Русъ* 3 и *Дулькамара* 3, поперемѣнно, по 2 раза въ день.—2) Колющія боли, ухудшающіяся отъ движенія и на холодѣ: *Бріонія* 3.—3) Жгучія боли ночью, улучшающіяся отъ тепла и движенія: *Арсеникъ* 3, 3 раза въ день по 5 капель.—4) Летучія боли, переходящія съ одного мѣста въ другое, ухудшающіяся къ ночи и улучшающіяся на воздухѣ: *Пульсатилла* 3.—5) Опухшіе болѣзненные суставы, когда боль не прекращается, несмотря на потѣніе: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—6) При уменьшенномъ мочеотдѣленіи, съ темною коричнево-красною мочею съ кирпичнымъ осадкомъ и сильнымъ запахомъ: *Ацидумъ бензоикумъ* 3, раза 3—4 въ день по 5 капель. Кромѣ того, въ хроническихъ случаяхъ ревматизма показуются иногда *Рододендронъ* 3, *Ледумъ* 3, *Калькареа карбоника*.

Ревматизмъ сочленовный.

Причины: Простуда, промоченіе тѣла, ногъ и т. п.

Признаки: Потрясающій ознобъ; сильная лихорадка; боль въ сочлененіяхъ, которыя представляются опухшими и нѣсколько покраснѣвшими. Боли переходятъ отъ одного сустава на другой; моча выдѣляется въ значительномъ количествѣ и оставляетъ темный осадокъ; ослабляющіе поты, безсонница; отсутствіе аппетита съ сильно обложеннымъ языкомъ. Болѣзнь часто поражаетъ сердце и плевру, при чемъ появляется затрудненное дыханіе, сердцебіеніе, колотье въ сердечной области. Болѣзнь длится 3—6 недѣль. Возвраты ея часты.

Вспомогательныя мѣры: Положить больного на твердый матрацъ и покрывать его легкимъ одѣяломъ. Согрѣвающіе компрессы на всѣ больные суставы. Смазывать болящія мѣста мазью изъ 1 части *Кольхикумъ* на 2 столовыхъ ложки *вазелина* или *прованскаго масла.* Когда чувствительность кожи уменьшится, то можно растирать эти мѣста тою же мазью или *оподельдокомъ Русъ.* Молочная діэта. Ежедневно пить по двѣ бутылки минеральной воды *Оберзальцбруннен*ъ.

Лѣченіе: 1) Въ началѣ болѣзни: *Аконитъ* 3 попеременно съ *Бріоніей* 3, каждые два часа по 5 капель въ ложечкѣ воды.—2) При сильныхъ, имѣющихъ кислый запахъ потахъ, покраснѣвшихъ и болѣзненныхъ сочлененіяхъ, преимущественно вечеромъ и ночью: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 попеременно съ *Феррумъ фосфорикумъ* 3, черезъ два часа по костяной ложечкѣ.—3) Въ нѣкоторыхъ острыхъ случаяхъ бываютъ полезны ежечасные пріемы *Натрумъ салициликумъ*×1, по костяной ложечкѣ или на кончикѣ перочиннаго ножа.—4) При воспаленіи околосердечной сумки: *Спигелія* 3, *Сцилла маритима* 1, черезъ 2 часа по 3 капли.—5) При плевритѣ: *Кали іодатумъ* 2. *Арсеникъ іодатумъ* 3.—Съ цѣлью удаленія послѣднихъ остатковъ болѣзни: *Іодъ* 3 или *Кали іодатумъ* 2, черезъ 3 часа по 3 капли на пріемъ.

Длительный ревматизмъ сочлененій протекаетъ безъ лихорадки и выражается тупостью и одеревенѣлостью въ одномъ или нѣсколькихъ сочлененіяхъ, съ болѣе или менѣе значительными болями, которыя усиливаются при каждой перемѣнѣ погоды; при этомъ опуханіе и измѣненіе формы суставовъ.

Лѣченіе: 1) При дергающихъ, тянущихъ боляхъ съ ощущеніемъ параличной слабости и ухудшеніемъ ночью въ постели: *Русъ* 3, три раза въ день по 5 капель на пріемъ.—2) При болѣзненныхъ, опухшихъ суставахъ и обильномъ потѣ, который не приноситъ облегченія: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, по костяной ложечкѣ 3 раза въ день.—3) При колющихъ боляхъ, которыя усиливаются отъ движенія и холода, и опухоли суставовъ: *Бріонія* 3 и *Феррумъ фосфори-*

кумъ 3, по 2 раза въ день по 3 капли и по костяной ложечкѣ.—4) Кромѣ того показуются *Дулькамара* 6 и *Ледумъ* 3, если ревматическія страданія произошли отъ купанія, промоченія ногъ и вообще отъ сильной простуды. Вмѣстѣ съ тѣмъ полезно растирать болящія мѣста *Аконитиновымъ спиртомъ* или *Аконитиновымъ масломъ*.

Регулъ разстройство.

а) Регулы часто открываются съ трудомъ у дѣвушекъ очень малокровныхъ и слабыхъ. Въ такомъ случаѣ имъ слѣдуетъ давать *Пульсатилла* 3, *Графитъ* 6, *Кали карбоникумъ* 6, каждое порознь, въ теченіе двухъ недѣль, одно вслѣдъ за другимъ, утромъ и вечеромъ по 2 капли. Молочная пища, яйца и мясо. Обтираніе тѣла водою по утрамъ, гулянье на свѣжемъ воздухѣ и Гензелевскія капли—10 капель въ ½ рюмкѣ сахарной воды, 2 раза въ день, очень укрѣпляютъ организмъ.

б) Скудныя регулы: тоже въ зависимости отъ малокровія и блѣдной немочи, иногда же и отъ разныхъ женскихъ болѣзней, поэтому требуютъ врачебной помощи.

Лѣченіе: 1) У полнокровныхъ, здоровыхъ женщинъ и дѣвицъ: *Сепія* 6 и *Белладонна* 3, по 2 раза въ день по 5 капель. — 2) У блѣдныхъ, малокровныхъ особъ: *Пульсатилла* 3 и *Хина* 3, поперемѣнно по 2 раза въ день.

в) Остановка регулъ: Причиною могутъ быть: блѣдная немочь, золотуха, чахотка, болѣзни матки, потеря крови, простуда, испугъ.

Вспомогательныя мѣры: горячія ножныя ванны на ночь; согрѣвающій компрессъ на нижнюю часть живота къ ночи; молочная пища; Гензелевскія капли.

Лѣченіе: 1) При малокровіи и блѣдной немочи: *Пульсатилла* 3 и *Сульфуръ* 3, утромъ и вечеромъ по 3 капли, поперемѣнно черезъ день. Кромѣ того, *Феррумъ карбони-*

кумъ 2 поперемѣнно съ *Калькареа фосфорика* 6.—2) Послѣ испуга: *Опіумъ* 3 и *Аконитъ* 3.—3) Послѣ гнѣва: *Аконитъ* 3, *Камомилла* 3.—4) Послѣ простуды *Аконитъ* 3: поперемѣнно съ *Пульсатилла* 3 или съ *Сепія* 6 или съ *Камомилла* 3.—5) При бѣляхъ и чувствѣ тяжести внизу живота: *Пульсатилла* 3 или *Сепія* 3, три раза въ день по 2 капли.—6) При золотушномъ состояніи, когда являются сыпи, лишаи и т. п. *Графитъ* 3, по ложечкѣ черезъ три дня по 1 пріему.—7) Нервнымъ особамъ, страдающимъ сердцебіеніями и стѣсненіемъ въ груди и скоро мѣняющимся въ лицѣ: *Кали карбоникумъ* 6 (какъ одно изъ наиболѣе дѣйствительныхъ).—8) Для слабыхъ, блѣдныхъ, меланхоличныхъ рекомендуется *Натрумъ муріатикумъ* 3, утромъ и вечеромъ по 3 капли. При кровотеченіяхъ изъ носа вмѣсто регулъ: *Бріонія* 3, *Белладонна* 3.

г) Болѣзненныя регулы: бываютъ при позднемъ наступленіи или продолжительномъ задержаніи регулъ, а также при блѣдной немочи и болѣзняхъ матки. Въ этихъ случаяхъ необходимо обращаться къ спеціалисту врачу.

Вспомогательныя мѣры: спокойно лежать въ постели; теплыя припарки на животъ или сухія горячія салфетки или бутылки съ горячею водою на нижнюю часть живота значительно умаляютъ боли. Также полезны сидячія теплыя ванны.

Лѣченіе: 1) Сильныя боли предъ регулами въ маткѣ или по направленію крестца: *Камомилла* 3.—2) При колякахъ въ маткѣ отъ приливовъ крови: *Белладонна* 3.—3) Колики съ давящими болями, запоромъ и позывами на низъ и къ мочеиспусканію: *Нуксъ вомика* 3.—4) Тяжесть въ животѣ предъ регулами съ ознобомъ, потягиваніемъ членовъ, зѣвотою: *Пульсатилла* 3,—5) Колющія боли, давленіе въ груди, краснота лица, сердцебіеніе, головныя боли: *Кали карбоникумъ* 6; также *Аписъ* 3.—6) Скудныя регулы съ колющими болями въ маткѣ, которыя распространяются къ мочевому пузырю и къ животу и сопровождаются судорогами въ икрахъ: *Вибурнумъ опулюсъ* 3.—Кромѣ того, бываютъ полезны: *Кактусъ* 3, *Магнезія фосфорика* 6, *Цимицифуга* 3, *Секале корнутумъ* 3, *Гельземинумъ* 3. Лѣкарства

давать во всѣхъ описанныхъ случаяхъ каждые 1½—2 часа по 2—3 капли въ чайной ложечкѣ воды.

д) Судороги: 1) Судороги въ груди съ удушьемъ, жаромъ въ головѣ и приливами къ половымъ частямъ: *Купрумъ* 6.—2) Приливы къ головѣ: *Белладонна* 3, *Гіосціамусъ* 3.—3) Истеричный смѣхъ или плачъ: *Игнація* 3.—4) Судороги, съ урчаніемъ въ животѣ, давленіемъ въ маткѣ, маточномъ рукавѣ и прямой кишкѣ: *Цинкумъ* 6.—Когда болѣзненныя регулы прекратятся, нужно принимать одну недѣлю *Калькареа карбоника* 6 или *Калькареа фосфорика* 6, утромъ по 3 капли или 5 крупинокъ.

е) Слишкомъ сильныя или продолжительныя регулы: требуютъ спокойнаго лежанія въ постели съ немного приподнятыми ногами. Одежда должна быть свободная. Иногда полезно глотать маленькіе кусочки льда.

Лѣченіе: 1) У здоровыхъ, но вспыльчивыхъ, упрямыхъ, строптивыхъ женщинъ: *Нуксъ вомика* 3.—2) Если сильныя регулы происходятъ отъ подниманія тяжелыхъ предметовъ, отъ тяжелой ноши, долгаго стоянія на ногахъ или усиленный ходьбы: *Арника* 3 и *Бріонія* 3, поперемѣнно черезъ 2 часа по 2 капли.—2) При ослабленіи матки: *Секале корнутумъ* 3.—4) У страдающихъ болѣзнями легкихъ: *Фосфоръ* 6, *Карбо вегетабилисъ* 3, *Ипекакуана* 3.—5) При болѣзняхъ сердца: *Натрумъ муріатикумъ* 6, *Кали карбоникумъ* 6.—6) Долго длящіяся регулы у слабыхъ женщинъ съ водянистою кровью: *Хина* 3.—7) Если регулы повторяются черезъ каждые 14 дней и очень обильны: *Платина* 6, *Кали карбоникумъ* 6, *Ацидумъ нитрикумъ* 6.—8) Если регулы бываютъ несвоевременно: *Калькареа карбоника* 6, *Калькареа фосфорика* 6.—9) При темныхъ, похожихъ на деготь выдѣленіяхъ, въ особенности въ климактерическомъ періодѣ: *Крокусъ* 3.—10) При сильно пахнущихъ регулахъ: *Креозотъ* 3, *Коллинзонія* 3.—11) Часто повторяющіяся регулы, но скудныя, въ переходномъ возрастѣ: *Сепія* 6.—12) Очень сильныя кровотеченія, сопровождаемыя большою слабостью, обмороками, холодѣніемъ кожи: *Секале корнутумъ* 2.—Во всѣхъ случаяхъ принимать лѣкарства въ промежуткахъ между регулами, два—три раза въ день.

При сильныхъ маточныхъ кровотеченіяхъ показуется примѣненіе внутрь *Гамамелисъ* 3×и мѣстно—вкладываніе во влагалище шариковъ съ *Гамамелисъ*×1.

Родильная горячка.

Болѣзнь послѣродового періода вслѣдствіе занесенія заразы.

Причины: Зараженіе, зараженіе крови, задержаніе послѣда и т. д.

Признаки: Потрясающій ознобъ, высокая температура, болѣзненность нижней части живота съ наклонностью къ поносу; отсутствіе или неправильное отдѣленіе послѣродового очищенія, которое становится гнойнымъ, сукровичнымъ, вонючимъ; желтый, какъ воскъ, цвѣтъ лица, холодная кожа, спячка. Болѣзнь появляется большею частью между 3—10 днемъ послѣ родовъ.

Лѣченіе: Главная задача заключается въ предотвращеніи этой болѣзни. Для достиженія этого, повивальная бабка должна соблюдать самую строгую чистоту; остричь ногти очень коротко, и передъ родами и каждымъ освидѣтельствованіемъ роженицы обмывать руки 2% *растворомъ карболовой кислоты* или *растворомъ сулемы* (1 : 2000). Равнымъ образомъ всѣ инструменты, употребляемые при этомъ, должны быть тщательно дезинфецированы. Передъ наступленіемъ родовъ повивальная бабка должна надѣть свѣжее, совершенно чистое платье. Комнату родильницы слѣдуетъ тщательно провѣтривать, стараясь поддерживать въ ней чистый, умѣренно теплый воздухъ. Немедленно послѣ родовъ необходимо перемѣнить съ осторожностью бѣлье родильницы, какъ носильное, такъ и постельное, и, въ видахъ предохраненія ея отъ горячки, дать ей нѣсколько пріемовъ черезъ 1 часъ по 3 капли *Секале корнутумъ* 3 поперемѣнно съ *Арника* 1. Въ случаѣ появленія лихорадки и болѣзненности въ нижней части живота, нужно наложить на него компрессъ.

При сильныхъ головныхъ болѣхъ, дѣлать на голову холодные компрессы. Тщательно подмывать и проспринцовывать влагалище и наружныя половыя части *тинктурою Ледумъ* или смѣсью равныхъ частей *тинктуры Ледумъ* съ *тинктурою Гиперикумъ* въ количествѣ двухъ ложекъ на кружку воды.

Діэта: Молоко, бульонъ, яйца всмятку, яблочный муссъ, лимонадъ; немного вина, разбавленнаго водою; глотать маленькіе кусочки льда.

Внутрь: 1) Сначала *Аконитъ* 3 поперемѣнно черезъ 1/2 часа съ *Белладонна* 3 или, какъ только появятся боли и лихорадка, *Арника* 1, черезъ 2 часа по 5 капель на пріемъ.—2) При болѣзненности нижней части живота, соединенной съ поносомъ: *Белладонна* 3, поперемѣнно съ *Секале* 3, черезъ 1—2 часа по 5 капель. Кромѣ того, при воспаленіи матки: *Ацидумъ нитрикумъ* 3, а затѣмъ *Ляписъ Альбусъ* 3 поперемѣнно съ *Кали бихромикумъ* 3 и *Сепія* 3, черезъ 2 часа по 5 капель и по костяной ложечкѣ.—3) Съ цѣлью способствовать всасыванію выпота, вызваннаго предшествовавшимъ процессомъ: *Кали іодатумъ* 2, *Сульфуръ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.—3) При бѣлой опухоли бедра (phlegmasia alba dolens): *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, два-три дня, а затѣмъ *Аписъ* 3 и *Арсеникъ* 3, по 3 раза въ день по 3 капли.—5) При потрясающемъ ознобѣ и высокой лихорадкѣ: *Русъ* 3, *Хининъ арсеникозумъ*×3, черезъ 2 часа по 5 капель, или *Арсеникъ* 3, поперемѣнно съ *Хина*×2.—6) При остановкѣ послѣродовыхъ очищеній: *Пульсатилла* 3 поперемѣнно съ *Белладонною* 3, затѣмъ, когда они возстановятся: *Гепаръ сульфурисъ* 3 поперемѣнно съ *Белладонною* 3.—7) При зловонныхъ послѣродовыхъ очищеніяхъ: *Креозотъ* 3, *Секале* 3 и впрыскиванія раствора сулемы 1:5000 или указаннаго выше *раствора Ледумъ Θ* и *Гиперикумъ Θ*.—8) Если остались гніющіе остатки послѣда, то необходимо ихъ своевременно удалить выскабливаніемъ и давать: *Ацидумъ нитрикумъ* 3 и *Арсеникъ* 3, черезъ 1 1/2—2 часа по 3 капли.—9) При явленіяхъ зараженія крови: *Арсеникъ* 3 и *Креозотъ* 3.—10) При маточныхъ кровотеченіяхъ: *Гамамелисъ*×3 и *Хина* 3, если же они

слишкомъ продолжительны и зловонны: *Секале корнутумъ* 3 и *Арсеникъ* 6.—11) При судорогахъ: *Белладонна* 6, *Камомилла* 3.—12) При геморроѣ: *Сульфуръ* 3, *Нуксъ вомика* 3.—13) При зубной боли: *Сепія* 6, *Пульсатилла* 6, *Белладонна* 3.

Вообще, при появленіи маточныхъ болѣзней не слѣдуетъ полагаться на совѣты повивальной бабки, а нужно немедленно обратиться къ врачу.

Родимчикъ. Эклампсія.

Эта чрезвычайно опасная для жизни болѣзнь дѣтей обнаруживается, подобно падучей, судорогами съ потерею сознанія, но отличается отъ послѣдней происхожденіемъ, крайне острымъ теченіемъ (лишь нѣсколько дней), съ короткими, свободными отъ судорогъ, промежутками. Судороги у беременныхъ и родильницъ носятъ наименованіе „эклампсія“ и вызываются отравленіемъ крови мочею.

1) Дѣтскій родимчикъ появляется у раздражительныхъ дѣтей, вслѣдствіе разстройства желудка, при прорѣзываніи зубовъ, отъ глистовъ, испуга, при кормленіи грудью послѣ приступа гнѣва или досады у матери или кормилицы, и т. п.

Лѣченіе: Удобное положеніе. Освобожденіе отъ стѣсняющей одежды. Прикрытіе легкимъ одѣяломъ. Чистый, свѣжій воздухъ. Теплая ванна (28° Р.). Холодные клистиры.

Внутрь: 1) При лихорадкѣ, сухомъ жарѣ: *Аконитъ* 3.—2) При прорѣзываніи зубовъ съ приливомъ крови къ головѣ, внезапномъ пробужденіи отъ сна съ бредомъ: *Цинкумъ* 6, поперемѣнно съ *Белладонна* 3, или *Гельземинумъ* 3, черезъ 2 часа по 2 капли.—3) При судорожныхъ подергиваніяхъ во время сна, краснотѣ одной щеки, а также, если родимчикъ произошелъ послѣ кормленія грудью женщины, которая была сильно разгнѣвана: *Камомилла* 3.—4) При родимчикѣ вслѣдствіе испуга, страха или вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ, когда при этомъ выходитъ пѣна изо рта, ножки то притягиваются къ животу, то выпрямляются: *Игнація* 6, *Опіумъ* 6.—5) При рвотѣ или тошнотѣ, а также поносѣ:

Ипекакуана 3.—6) При глистахъ, твердомъ животѣ: *Цина* 3, *Цинкумъ* 6.

2) Эклампсія беременныхъ и родильницъ. Теплыя ванны. *Игнація*×3, *Аурумъ* 6, *Белладонна* 3.

Роды и страданія родильнаго періода.

Когда женщина почувствуетъ приближеніе родовъ, т.-е., когда пройдутъ воды и начнутся схватки вслѣдствіе движенія ребенка въ чревѣ, то нужно тотчасъ же очистить желудокъ (поставить промывательное) и уложить больную въ постель. При родахъ роженица должна лечь на спину. Послѣ родовъ слѣдуетъ удалить все то бѣлье, которое подкладывалось подъ роженицу, и замѣнить его чистыми, сухими, согрѣтыми подстилками. Если по истеченіи часа не послѣдуетъ отдѣленія послѣда (дѣтскаго мѣста), то нужно массировать матку и дать роженицѣ подходящее средство (по назначенію врача). Когда родильница нѣсколько отдохнетъ, необходимо удалить всѣ простыни и замѣнить ихъ свѣжими, чистыми и хорошо согрѣтыми. Затѣмъ покрыть животъ шерстянымъ платкомъ, а грудь тонкою фланелью, послѣ чего роженицѣ необходимо полное спокойствіе. Въ теченіе 8 дней роженица должна почти постоянно оставаться въ горизонтальномъ положеніи, послѣ чего она можетъ ежедневно оставлять постель на короткое время. Ранѣе 3—4 недѣль лѣтомъ и шести недѣль зимою она не должна выходить изъ дому, иначе могутъ явиться дурныя послѣдствія. Въ первые дни родильнаго періода пища роженицы должна состоять изъ ячменнаго супа, овсянки, молочнаго супа или легкаго бульона. Какъ питье, ей слѣдуетъ давать не слишкомъ холодную воду, слабый чай съ молокомъ, гомеопатическій кофе и т. п. На 3—4 день роженица получаетъ болѣе питательную, но удобоваримую пищу, какъ, напр., супъ изъ телятины, различныя молочныя кушанья, кашицы, яйца всмятку, овощи, зрѣлые плоды и т. п. По истеченіи 3 недѣль родильница можетъ начать вести прежній свой образъ жизни.

Запоры устраняются промывательными (клистирами) и употребленіемъ въ пищу достаточнаго количества плодовъ. Нужно избѣгать сильнаго напряженія и жиленія при испражненіи. Комната родильницы не должна быть сильно натоплена, температура ея не должна превышать 16° Реом., и роженицу не слѣдуетъ слишкомъ тепло укутывать. Нужно наблюдать за осторожнымъ провѣтриваніемъ комнаты и за тѣмъ, чтобы воздухъ въ ней былъ всегда чистъ и свѣжъ, такъ какъ это крайне необходимо для роженицы. Носильное и постельное бѣлье должно мѣнять также съ осторожностью, наблюдая за тѣмъ, чтобы оно было достаточно согрѣто. Половые органы должны ежедневно обмываться теплою водою. По истеченіи 8—10 часовъ послѣ родовъ нужно приложить въ первый разъ ребенка къ груди и затѣмъ его не слѣдуетъ кормить чаще, какъ черезъ $2^1/_2$ или 3 часа. Ночью ему не нужно давать грудь болѣе 1—2 разъ. Если у роженицы слишкомъ много молока, то давать ей менѣе питательную пищу. Точно такъ же должны воздерживаться отъ пищи, способствующей выдѣленію молока, тѣ женщины, которыя не могутъ или не хотятъ сами кормить своихъ дѣтей грудью. Гнѣвъ, горе, заботы и другія нравственныя потрясенія вредны для роженицы и дѣйствуютъ дурно на здоровье ребенка, котораго она кормитъ.

Лѣченіе: 1) При слишкомъ сильныхъ и частыхъ потугахъ: *Коффеа* 3, 20 капель на стаканъ воды и пить глотками каждыя 5 минутъ.—2) При слишкомъ слабыхъ и замедляющихся потугахъ: *Пульсатилла* 3 и *Секале* 3, черезъ 10—15 минутъ по 5 капель поперемѣнно.—3) При слишкомъ болѣзненныхъ потугахъ: *Белладонна* 3, *Опіумъ* 3.—4) При прекращеніи потугъ: *Коффеа* 3, черезъ каждыя 15—20 минутъ по 5 капель.—5) При судорожномъ сокращеніи (закрытіи) маточнаго рыльца: *Гіосціамусъ* 1.—6) При сердцебіеніи: *Аконитъ* 3, въ частыхъ пріемахъ.—7) При нервномъ раздраженіи: *Игнація* 3.—8) При задержаніи послѣда: *Секале* 1, *Пульсатилла* 3.—9) При продолжительномъ зловонномъ послѣродовомъ очищеніи: *Секале* 3 и *Арсеникъ* 6, по 3 раза въ день по 3 капли.—10) При сильныхъ послѣродовыхъ болѣхъ: смазываютъ животъ свѣжимъ оливковымъ со-

грѣтымъ масломъ и затѣмъ покрываютъ его шерстяными платками, а внутрь даютъ: *Арника* 3 и *Вибурнумъ опулюсъ* 1, черезъ 1—2 часа по 3 капли.—11) При боляхъ въ поясничныхъ и крестцовыхъ мышцахъ (какъ при простѣлѣ): *Русъ* 3 и *Нуксъ вомика* 3.—12) При пораненіи или механическомъ поврежденіи половыхъ органовъ: *Арника* 3 и промываніе растворомъ 1 части *тинктуры Арники* на 10 частей воды.—13) При молочной лихорадкѣ: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, каждые 2 часа поперемѣнно по 2 капли.—14) При задержаніи отдѣленія молока: *Пульсатилла* 3, *Бріонія* 3 черезъ 2 часа по 3 капли поперемѣнно.—15) При недостаточности или отсутствіи молока: разбавить 10 капель касторовaго масла въ 90 капляхъ алкоголя и принимать на кускѣ сахара четыре раза въ день по 5 капель.—16) При чрезмѣрномъ отдѣленіи молока: *Белладонна* 3 и *Боракъ* 3, по 3 раза въ день по 3 капли.—17) При безсонницѣ: *Коффеа* 3, на ночь 2—3 пріема по 3 капли.—18) При бедренной опухоли: *Белладонна* 3, *Арсеникъ* 3 и *Ляхезисъ* 6, поперемѣнно по 2 раза въ день по 3 капли.—19) При запорѣ: *Нуксъ вомика* 3, *Бріонія* 1, а если это не дѣйствуетъ, то *Опіумъ* 6 и *Плюмбумъ* 6, по 2 раза въ день по 3 капли; если же каловыя массы очень тверды и чрезвычайно трудно отдѣляются, то *Кали карбоникумъ* 6.—20) При поносѣ: *Вератрумъ* 3, *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, черезъ 1—2 часа по 3 капли 2—3 пріема; при поносѣ съ коликою: *Колоцинтисъ* 6, *Нуксъ вомика* 1, черезъ 1 часъ по 3 капли.—21) При трудномъ мочеиспусканіи или задержаніи мочи: *Кантарисъ* 6, *Пульсатилла* 3, черезъ 1—2 часа 3 капли и теплыя припарки изъ льняного сѣмени.

Рожа.

Заразное воспаленіе кожи, вызываемое стрептококками—особаго рода микроорганизмами.

Причины: Заболѣванія рожею часто бываетъ эпидемичны весною и осенью. При склонности къ этой болѣзни, она повторяется даже отъ погрѣшностей въ діэтѣ, душевныхъ

волненій. Обыкновенно является послѣдствіемъ ушибовъ, воспаленій, а также при гнойной лихорадкѣ.

Признаки: Ознобъ. Мѣстная краснота, которая отъ надавленія пальцемъ бѣлѣетъ или желтѣетъ; воспаленное мѣсто опухаетъ, горитъ и лоснится; иногда на немъ образуются пузыри. Боли колющія, языкъ обложенъ, отсутствіе аппетита. Легко дѣлается воспаленіе мозга или воспаленіе легкихъ.

Вспомогательныя мѣры: Смазывать опухоль Белладонновымъ масломъ и покрывать полотняною тряпочкою. Завертываніе въ вату не рекомендуется. При сильной лихорадкѣ холодныя примочки на голову. Болѣзнь протекаетъ обыкновенно въ 4 дня. Больного нужно оберегать отъ сквозника, сырости и холода, и комнатная температура должна быть умѣренною (15—16°). Часто пить воду очень полезно, а также поддерживать желудокъ въ исправности. Можно смазывать рожистые опухоли также анисным маслом.

Лѣченіе: 1) Гладкая рожа: *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 5 капель.—2) Когда опухоль покрыта пузырьками (пузырчатая рожа)—*Русъ* 3 и *Кантарисъ* 6 или *Арсеникъ* 6, поперемѣнно каждые 2 часа.—3) Если рожа переходить на суставы или сгибы и при этомъ являются желудочныя боли и рвота: *Бріонія* 3.—4) Если рожа бросается съ одного мѣста на другое: *Пульсатилла* 3.—5) Если послѣ болѣзни остается болѣзненная опухоль: *Гепаръ сульфурисъ* 3.—6) Для предохраненія возврата болѣзни, нужно по выздоровленіи принимать 1 недѣлю *Сульфуръ* 3, утромъ 5 капель или 5 крупинокъ, или *Барита карбоника* 6.—7) При рожѣ у новорожденныхъ нужно давать *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3 поперемѣнно, по 3 раза въ день по 2 капли въ грудномъ молокѣ или отварной водѣ.

Рта воспаленіе слизистой оболочки; молочница.

Причины: Нечистоплотность. Разстройство пищеваренія. Прорѣзываніе зубовъ. Грибовидныя образованія на слизистой оболочкѣ рта, все болѣе и болѣе разрастающіяся.

Признаки: Маленькія, немножко возвышенныя, бѣлыя или желтоватыя пятнышки, окаймленныя темнокрасною каймою. Эти пятнышки находятся на кончикѣ языка, на губахъ, на деснахъ и на слизистой оболочкѣ щекъ. Слюнотеченіе. Кислая рвота. Водянистыя испражненія, разъѣдающія задній проходъ. Проходитъ черезъ 8—14 дней.

Вспомогательныя мѣры: Часто прополаскивать ротъ комнатною водою, въ особенности послѣ каждой ѣды и питья. Часто обмывать соски. Рожки съ резиновыми трубками и сосками держать въ крайней чистотѣ. Ротикъ вытирать растворомъ буры или бертолетовой соли, 1 чайную ложку на стаканъ воды.

Лѣченіе: 1) *Кали хлорикумъ* 2, по костяной ложечкѣ 2 раза въ день.—2) Если болѣзнь переходитъ на гортань, то *Гепаръ сульфурисъ* 3.—3) Въ запущенныхъ случаяхъ: *Меркуріусъ коррозивусъ* 3.—4) При водянистомъ поносѣ: *Баптизія* 3.—5) Если подъ расплывающеюся поверхностью молочницы образуются нарывчики, то—*Ацидумъ нитрикумъ* 3, каждые 2 часа по 3 капли.—6) Въ затяжныхъ случаяхъ: *Сульфуръ* 6, *Ацидумъ сульфурикумъ* 3, поперемѣнно черезъ 2—3 часа по 3 капли.—7) При сильномъ слюнотеченіи: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, по 3 капли 3 раза въ день.

Сахарное мочеизнуреніе или діабетъ.

Въ мочѣ появляется сахаръ въ большемъ или меньшемъ количествѣ:

Причины: Неправильный образъ жизни: невоздержность и роскошь; нужда и лишенія. Появляется большею частью въ среднемъ возрастѣ или у пожилыхъ.

Предохранительныя мѣры: Простой, правильный, умѣренный образъ жизни. Воздержаніе отъ употребленія спиртныхъ напитковъ и т. п.

Признаки: Неисправное пищевареніе, изжога, ненасытный аппетитъ. Мучительная неутолимая жажда, усили-

вающаяся къ ночи, является важнымъ признакомъ этой болѣзни. Моча свѣтлая, какъ вода, безъ запаха, сладкаго вкуса, оставляющая на бѣльѣ и одеждѣ клейкія, липкія, какъ отъ сахарнаго сиропа, пятна. Моча содержитъ отъ 1 до 10 процентовъ сахара. Голосъ становится хриплымъ, слабымъ, а слюна вязкою и кисловатою. Запоры; исхуданіе, общая слабость, опухоль ногъ; слабость зрѣнія; изнурительная лихорадка. Болѣзнь длится годами, но если ее своевременно распознать и правильно лѣчить, то она поддается излѣченію. Застарѣлые случаи болѣзни большею частью неизлѣчимы.

Режимъ и діэта: нежирное мясо, нѣжные овощи, компотъ изъ яблокъ, легкое красное вино. Не слѣдуетъ употреблять мучнистой пищи, пироговъ и пирожныхъ, а также очень мало хлѣба, бобовыхъ растеній, картофеля, сахара и не пить сладкихъ винъ и пива. Теплыя ванны; ежедневныя обтиранія тѣла тепловатою водою, большія прогулки на свѣжемъ воздухѣ.

Лѣченіе: 1) При частомъ отдѣленіи и притомъ каждый разъ въ большомъ количествѣ свѣтлой, безцвѣтной мочи, кислой отрыжкѣ, горькомъ вкусѣ во рту, усиленной жаждѣ и неутомимомъ голодѣ, а также слабости пищеваренія: *Креозотъ* 3, три раза въ день по 2—3 капли на пріемъ.—2) При общей слабости и исхуданіи, сильной жаждѣ, частомъ выдѣленіи водянистой мочи и ослабленіи половой дѣятельности: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3.—3) При слабости и исхуданіи, большомъ безпокойствѣ, помутнѣніи зрѣнія, жаждѣ по ночамъ, сухости кожи, обильномъ отдѣленіи мочи, водянкѣ кожи: *Арсеникъ* 3.—4) При большой жаждѣ какъ днемъ, такъ и ночью, съ обильнымъ отдѣленіемъ мочи, при громадномъ аппетитѣ, соединенномъ съ сильнымъ исхуданіемъ и упадкомъ силъ: *Ураніумъ нитрикумъ*×3, по костяной лопаточкѣ 3—4 раза въ день.—Кромѣ этихъ средствъ, *Зинцгіумъ амболянумъ* 1, четыре раза въ день по 5 капель, также даетъ хорошіе результаты при лѣченіи сахарной болѣзни.

Селезенки болѣзни.

1. Селезенки воспаленіе.

Признаки: Напряженіе и колотье подъ ребрами съ лихорадкою и опуханіемъ лѣвой стороны. Боли ухудшаются отъ давленія, кашля, лежанія на лѣвой сторонѣ. Часто бываетъ при перемежающейся лихорадкѣ, а также нерѣдко отъ злоупотребленія хининомъ въ аллопатическихъ дозахъ.

Лѣченіе: 1) Въ началѣ болѣзни—*Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ 2 часа.—2) Чувство давленія въ области селезенки, бѣлый обложенный языкъ, сильное колотье отъ движенія: *Нуксъ вомика* 3.—3) При сильной жаждѣ, колющихъ, жгучихъ боляхъ, страхѣ и безпокойствѣ, иногда рвотѣ и поносѣ: *Арсеникъ* 3.—4) При большой слабости и продолжительныхъ ознобахъ: *Хина* 3.—5) Если болѣзнь является слѣдствіемъ удара, ушиба или другихъ механическихъ поврежденій, и боли колющія, затрудняющія дыханіе: *Арника* 2, каждые 2 часа по 2—3 капли.—6) Въ запущенныхъ случаяхъ: *Ликоподіумъ* 6 и *Сульфуръ* 6, по 1 пріему черезъ день.

2. Колотье въ области селезенки.

Лѣченіе: 1) Если оно является слѣдствіемъ утомительной физической работы, то лучшими средствами будутъ: *Арника* 3 и *Бріонія* 3, поперемѣнно, черезъ два часа, и покой.—2) При вздутіи живота: *Хина* 3 и *Пульсатилла* 3.—3) При разстройствѣ регулъ: *Пульсатилла* 3, раза 4 въ день по 5 капель.

3. Селезенки опухоль.

Лѣченіе: 1) Послѣ перемежающейся лихорадки: *Хина* 3.—2) Если уже употреблялся хининъ въ большихъ дозахъ: *Феррумъ карбоникумъ* 2, по костяной ложечкѣ три раза въ день.—3) При твердой опухоли: *Іодіумъ* 3, по 3 капли 4 раза въ день.

Сердца болѣзни.

а) Сердца порокъ.

Признаки: Сердцебіеніе, трепетаніе сердца, неправильные удары сердца, чувство страха, стѣсненіе въ груди, сердечная тоска, обмороки, головокруженіе, разстройства пищеваренія, водянка, апоплексическіе удары.

Діэта: Удобоваримая питательная пища: нежирное мясо, цыплята, куры, телятина, баранина и всякая дичь. Воспрещены: жирныя, мучныя кушанья (пироги), пиво, водка; вина можно дозволить лишь немножко; наблюдать за тѣмъ, чтобы желудокъ былъ всегда исправный; холодные компрессы на сердечную область или *зеленая глина* уменьшаютъ сильное сердцебіеніе и успокаиваютъ.

Лѣченіе: Спокойствіе, какъ тѣлесное, такъ и душевное. Воздерживаться отъ сильныхъ тѣлесныхъ напряженій, чрезмѣрнаго утомленія и душевныхъ волненій.

Внутрь давать: 1) При порокахъ сердечныхъ клапановъ, преимущественно отъ сочленовнаго (суставнаго) ревматизма: *Спигелія* 6, *Кактусъ* 3, *Фосфоръ* 6, принимать поочередно по одной недѣлѣ каждаго, 3 раза въ день по 5 капель. При волнообразномъ приливѣ къ головѣ: *Конваллярія маялисъ*×2, четыре раза въ день по 5 капель. При бронхитѣ, сопровождающемъ пороки сердечныхъ клапановъ: *Фосфоръ* 6, три раза въ день по 5 капель.—2) При ожирѣніи сердца: постная или тощая пища, вегетаріанскій столъ или молочная діэта въ продолженіе 6 недѣль; много движенія на чистомъ воздухѣ; комнатная гимнастика и ванны; впослѣдствіи, когда сердечный мускулъ окрѣпнетъ,—гуляніе по горамъ, а внутрь: *Арника* 2, черезъ три часа по три капли. При ожирѣніи сердца съ жировымъ перерожденіемъ волоконъ сердечныхъ мышцъ: *Фосфоръ* 6. При ожирѣніи сердца безъ перерожденія его мышечныхъ волоконъ: *Аурумъ муріатикумъ* 6, *Арсеникъ* 6, *Калькарея карбоника* 6, *Іодіумъ* 6, *Купрумъ* 6, каждое порознь въ теченіе одной недѣли, по два раза въ день по 5 капель. 3) При увеличеніи сердца отъ расширенія: *Арсеникъ* 3, *Фосфоръ* 6, *Кактусъ* 3.—4) При слабости и исто-

щеніи сердца: *Кожа* 1, раза 4 въ день по 5 капель.—5) При разстройствахъ дыханія: *Арсеникъ* 6.—6) При грудной водянкѣ, вслѣдствіе пороковъ сердца: *Арсеникъ* 6, *Спигелія* 6, *Вератрумъ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.

б) Сердца и сердечной сумки воспаленіе.

Причины: Воспаленіе подреберной плевы; сочленовный ревматизмъ; удары въ область сердца.

Признаки: Гнетущія, колющія боли въ области сердца, сердцебіеніе, короткое дыханіе, одышка, сильная лихорадка.

Діэта: Удобоваримая пища, некрѣпкій бульонъ, молоко, овощи, плоды, свѣжая вода, а при большой слабости токайское вино въ маленькихъ пріемахъ.

Лѣченіе: 1) При сердечныхъ шумахъ: *Аконитъ* 3, поперемѣнно со *Спигелія* 3, каждые 2 часа по 5 капель. 2) При сильной одышкѣ: *Лобелія*×2 и *Арсеникъ* 6, черезъ 1/2 часа по 5 капель.—3) При упадкѣ сердечной дѣятельности, маломъ прерывистомъ пульсѣ: *Арсеникъ* 6 и *Аммоніумъ карбоникумъ* 1.—4) Послѣ прекращенія воспалительнаго состоянія, для всасыванія выпота: *Антимоніумъ арсеникозумъ* 2 и *Арсеникъ іодатумъ* 6, черезъ день, 3 раза въ день по 5 капель. Также полезны *Сульфуръ* 3, *Кали гидроіодикумъ* 2 и *Сцилла* 1.

Спокойное положеніе тѣла; воздержаніе отъ всякаго возбужденія, раздраженія, волненія и т. п.

в) Сердцебіеніе нервное.

Причины: Малокровіе, блѣдная немочь (хлорозъ), душевныя волненія, частое употребленіе спиртныхъ напитковъ, онанизмъ, застои крови.

Признаки: Сильное сердцебіеніе, чувство тоски, душевное безпокойство, чувство стягиванія или сжиманія въ сердечной области, обмороки; по истеченіи 1/4—1/2 часа припадки сердцебіенія прекращаются, послѣ чего появляется обильный потъ.

Лѣченіе: Спокойствіе; удаленіе всякой стѣсняющей одежды; холодные компрессы на область сердца; преимущественно растительная пища.

Внутрь: 1) При жарѣ въ головѣ и лицѣ: *Аконитъ* 3, по 5 капель черезъ 1/2 часа, три-четыре пріема.—2) При колотіи въ сердечной области: *Спигелія* 3.—3) При сердцебіеніи у нервныхъ, раздражительныхъ, истеричныхъ женщинъ: *Гельземинъ* 3, *Платина* 6, *Нуксъ мосхата* 3.—4) При малокровіи, потерѣ соковъ: *Хина* 3, *Калькареа фосфорика* 6, по 2 раза въ день по 5 капель.—5) При тоскливомъ состояніи послѣ половыхъ возбужденій: *Фосфоръ* 3.—6) При сердцебіеніи вслѣдствіе чрезмѣрнаго напряженія или переутомленія съ приливомъ крови къ головѣ: *Кока* 1 или *Арника* 3, раза 3 въ день по 5 капель.—7) При чувствѣ сжиманія сердца будто тисками: *Кактусъ*×2, черезъ 1/2 часа по 2 капли во время приступа.—8) При онанизмѣ: *Дигиталисъ* 3, 3 раза въ день по 3 капли.—9) При сердцебіеніи, являющемся вечеромъ, ложась спать, и желудочномъ разстройствѣ, а также, когда біеніе сердца, хотя правильно, но очень сильно: *Натрумъ муріатикумъ* 6 и *Калькареа карбоника* 6.—10) При сердцебіеніи вслѣдствіе душевныхъ волненій: *Аконитъ* 3, *Пульсатилла* 3.—11) При сердцебіеніи вслѣдствіе гнѣва: *Камомилла* 3, черезъ 1/4 часа по 3 капли.—12) Вслѣдствіе страха или испуга: *Опіумъ* 6 или *Вератрумъ* 3.—13) Вслѣдствіе чрезмѣрной радости: *Коффеа* 3.—14) При сердцебіеніи у пьяницъ: *Нуксъ вомика* 3.—15) Вслѣдствіе горя: *Игнація* 6. *Стафизагрія* 6.—16) При большой слабости, чувствѣ задушенія, короткомъ дыханіи, одышкѣ и угрожающемъ параличѣ сердца: *Фосфоръ* 3.—17) При длительныхъ болѣзняхъ сердца: *Аурумъ муріатикумъ* 3, *Хина* 3, *Кактусъ* 3, принимать одно за другимъ, 3 раза въ день по 5 капель по 1 недѣлѣ каждаго.

г) Сердца судорожная боль; грудная жаба. Ангина пекторисъ.

Причины: Порокъ сердца, физическое переутомленіе, душевныя волненія, нарушеніе правилъ діэты, переполненіе желудка, куреніе табаку, алкоголизмъ, наслѣдственность.

Признаки: Давящая, стягивающая, сжимающая или жгучая боль, распространяющаяся отъ сердца къ лѣвому

плечу; чувство страха и стѣсненія, сердцебіеніе; блѣдное и осунувшееся лицо, липкій потъ, похолодѣніе рукъ и ногъ; по прекращеніи припадка, отдѣленіе большого количества водянистой мочи. Припадки грудной жабы появляются чаще у тучныхъ людей и часто во время сна.

Лѣченіе: 1) *Белладонна* 3, *Арсеникумъ іодатумъ* 6, *Арника* 3, поочередно черезъ 2 часа по 5 капель.—2) При сильномъ сердцебіеніи, преимущественно ночью: *Кали карбоникумъ* 6, черезъ 1/2 часа по 5 капель.—3) Вслѣдствіе душевныхъ волненій: *Хининумъ сульфурикумъ* 3.—4) Какъ болѣе радикальныя средства: *Купрумъ ацетикумъ* 3, утромъ 5 капель, *Кактусъ* 3, вечеромъ 5 капель, *Аурумъ* 6, *Игнація*×3, *Дигиталисъ* 1.

Сифилисъ.

(Лѣченіе долженъ вести врачъ).

Крайне заразительная и наслѣдственная болѣзнь, вызывается особаго рода спиралеобразными микроорганизмами, такъ называемые блѣдные спириллы или спирохеты.

Причины: Зараженіе при сомнительномъ сношеніи. Наслѣдственность. Внѣполовое зараженіе черезъ поцѣлуй, куреніе общей папиросы, кормленіе грудью (кормилица-сифилитичка), совмѣстную ѣду изъ общей посуды общими ложками, чрезъ салфетку, бритву, мытье въ банѣ, утираніе общими полотенцами, простынями и пр.

Предохранительныя мѣры.

Чтобы уберечь себя отъ зараженія сифилисомъ, надо помнить:

1) что отдѣляемое сифилитическихъ пораженій заразительно;

2) что пока кожные покровы и слизистая оболочка совершенно цѣлы, сифилитическій ядъ не можетъ проникнуть въ организмъ;

3) что зараженіе происходитъ лишь тогда, если на слизистыя оболочки или кожу, цѣлость коихъ нарушена,

попадаетъ сифилитическій ядъ либо непосредственно отъ сифилитическихъ пораженій, либо съ предметовъ, прикасавшихся къ этимъ предметамъ и носящихъ на себѣ слѣды сифилитическихъ отдѣленій;

4) не совершать полового акта въ состояніи опьяненія, каковое весьма благопріятствуетъ зараженію.

Формы болѣзни и ея проявленія.

При половомъ зараженіи на половомъ органѣ, а при внѣполовомъ на самыхъ различныхъ частяхъ тѣла появляется твердая язва (твердый шанкръ), медленно поджывающая. По ея заживаніи чрезъ нѣсколько недѣль появляется характерная (мѣдно-краснаго цвѣта) сыпь по тѣлу (прежде всего на груди, животѣ) — *первичный* сифилисъ.

Затѣмъ, по исчезновеніи первичныхъ пораженій кожи, черезъ нѣкоторое время развиваются пораженія слизистыхъ оболочекъ (рта, задняго прохода и др.) въ видѣ бляшекъ, такъ называемыя *папулы—вторичный* сифилисъ. Далѣе поражаются и внутренніе органы.

При *третичномъ* сифилисѣ образуются твердые узлы (гуммы) въ кожѣ, мышцахъ, внутреннихъ органахъ, поражаются глаза, нервная система, развиваются спинная сухотка, параличи и пр.

Лѣченіе: *Сифилисъ—несомнѣнно излѣчимая болѣзнь.*

При первичныхъ пораженіяхъ примѣняется *Меркуріусъ сублимат. коррозивусъ* 6, по 5 капель, 3—4 раза въ день въ теченіе 8-ми дней; по истеченіи этого срока назначается *Нитри ацидумъ* 3, тоже въ теченіе недѣли по 3 капли 3—4 раза въ день; затѣмъ примѣняется опять ртутный препаратъ, наприм., *Меркуріусъ биіодатусъ* 4, и т. д. въ томъ же порядкѣ чередованія ртутнаго препарата и Нитри ацидумъ.

По исчезновеніи пораженій, въ предупрежденіе развитія болѣзни и новыхъ проявленій ея, принимать *Меркуріусъ сублимат. коррозивусъ* 6, по 5 капель утромъ и вечеромъ.

При малѣйшемъ повтореніи болѣзни (вторичныхъ пораженіяхъ) опять повторить вышеуказанный курсъ лѣченія.

При третичныхъ пораженіяхъ (гуммозномъ сифилисѣ) давать *Кали іодатумъ* × 1, начиная съ 10 капель и до 20 капель утромъ и вечеромъ. Особенно хорошо облегчаетъ головныя боли, которыми такъ страдаютъ сифилитики (б. ч. ночью).

Противъ папулъ (слизистыхъ бляшекъ) въ полости рта назначается полосканье и пріемы внутрь *Фитолакка декандра* (×1 для полосканія 30 капель на стаканъ, ×3 для пріемовъ внутрь).

Противъ сифилитическаго насморка назначается *Кали бихромикумъ* 3.

Противъ пораженій нервной системы (сухотка, эпилепсія) попеременно съ *Кали іодатумъ* 1—3 назначается *Аурумъ муріатикумъ натронатумъ* 3, *Аурумъ іодатумъ* 3—6.

Иногда даютъ хорошіе результаты растительныя средства, особенно *Сарсапарилла* 3, *Коридалисъ формоза* 1 и др.

Скарлатина.

Острая, лихорадочная, заразная сыпь, поражающая дѣтей.

Предупрежденіе: Не ходить въ домъ, гдѣ есть скарлатинный больной, а равно не принимать никого изъ такого дома; здоровыхъ дѣтей отдѣлить отъ больного. Всѣ вещи, находившіяся въ комнатѣ больного, должны быть подвергнуты дезинфекціи. Здоровымъ дѣтямъ давать, какъ предохранительное, ежедневно утромъ и вечеромъ по 2 капли или 5 крупинокъ *Белладонна* 3. Необходимо ежедневно осматривать горло, какъ у больныхъ, такъ и здоровыхъ дѣтей, нѣтъ ли налетовъ, такъ какъ скарлатина часто сопровождается и заболѣваніемъ дифтеритомъ.

Признаки: Заболѣваніе слѣдуетъ обыкновенно на 3—8 день послѣ зараженія и выражается ознобомъ съ послѣдующимъ жаромъ и болью въ горлѣ при глотаніи. Вечеромъ лихорадочное состояніе усиливается и температура поднимается до 40°, а пульсъ до 120 ударовъ въ минуту. Головныя боли, тошнота, а иногда рвота и бредъ. У маленькихъ дѣтей бываютъ конвульсіи и судороги, или они

лежатъ въ безсознательномъ состоянiи, безъ движенiя. Нёбо и миндалевидныя железы опухаютъ и глотанiе затруднено. Черезъ 2—3—4 дня послѣ этого появляется высыпь, сперва на одутловатомъ лицѣ, на шеѣ и груди и затѣмъ и на всемъ тѣлѣ. Неравномѣрныя красныя пятна сливаются, и, наконецъ, получается видъ, какъ будто все тѣло вымазано малиновымъ варенъемъ. При надавливанiи пальцемъ краснота исчезаетъ, но тотчасъ же опять является на надавленномъ мѣстѣ, при чемъ наливается отъ края къ серединѣ. При кори наоборотъ: тамъ бѣлое пятно, образовавшееся отъ надавливанiя пальцемъ, наливается краснотою отъ середины къ краямъ. Кожа сухая, сильная жажда, красная моча въ скудномъ количествѣ, языкъ красный и какъ бы покрытъ крапинками. Глаза слезятся и изъ носа течетъ жидкая слизь. Высыпь держится 4 дня, при чемъ температура можетъ достигнуть 41°. Затѣмъ красныя пятна желтѣютъ или дѣлаются бурыми, лихорадочное состоянiе мало-по-малу проходитъ, моча идетъ мутноватая и въ достаточномъ количествѣ, горловые симптомы исчезаютъ и, наконецъ, кожа начинаетъ шелушиться со всего тѣла. Шелушенiе можетъ продолжаться двѣ—три недѣли.

Болѣзни, часто сопровождающiя скарлатину.

1) **Тифозная скарлатина:** Большая слабость, сонливость, глаза полуоткрыты, незначительная высыпь, которая потомъ синѣетъ.

2) **Дифтеритъ** очень часто бываетъ спутникомъ скарлатины.

3) **Воспаленiе шейной клѣтчатки:** Съ одной стороны шеи появляется затвердѣнiе, которое распространяется до подбородка. При этомъ является затрудненное глотанiе и дыханiе, и опухоль можетъ перейти въ гнойное разложенiе.

4) **Воспаленiе околоушной железы:** Опухоль подъ нижнею частью уха, которая расходится позади уха по шеѣ и до щеки. При этомъ бываютъ боли въ ухѣ и открыванiе рта очень болѣзненно. Опухоль расходится или переходитъ въ нагноенiе. Ослабленiе слуха и течь изъ уха.

5) **Воспаленіе почекъ и водянка:** Уменьшенное выдѣленіе мутной, красной мочи, дающей при отстаиваніи глинистый осадокъ. Языкъ обложенъ. Небольшой отекъ лица, иногда головныя боли и рвота. Грудная полость наполняется водою.

Вспомогательныя мѣры: Какъ только появятся признаки заболѣванія скарлатиною, больного немедленно уложить въ постель и не укрывать его слишкомъ тепло. Температура комнаты должна быть 12—13° и воздухъ въ комнатѣ чистый. Какъ питье, давать чистую воду или съ лѣкарствомъ, но безъ всякихъ сиропoвъ и подслащеній. Пища должна состоять изъ молока и слизистыхъ жидкостей, какъ, напр., отваръ изъ саго. Когда у больного появится аппетитъ, то можно мало-по-малу переходить къ болѣе питательной пищѣ, какъ, напр., бульонъ, цыплята, дичь, а потомъ жареное мясо и т. д. Перемѣнять бѣлье нужно съ большою осторожностью: самое лучшее нагрѣвать таковое у печки передъ одѣваніемъ. Больному полезно смазывать все тѣло чистымъ свинымъ жиромъ, чтобы облегчить шелушеніе кожи и не давать шелухѣ разлетаться по комнатѣ. Въ періодѣ шелушенія можно дѣлать больному ежедневно теплую ванну въ 28° R, въ которой онъ остается 10 минутъ, затѣмъ быстро высушивается и укладывается въ теплую постель. Когда больной встанетъ съ постели, обыкновенно черезъ 12—14 дней, то его необходимо продержать еще недѣли три въ комнатѣ, пока не окончится періодъ шелушенія. Затѣмъ его можно выпускать на улицу, но первый разъ только въ хорошую погоду. Для закаленія кожи можно ежедневно обтирать все тѣло мокрымъ холоднымъ полотенцемъ.

Лѣченіе: 1) При появленіи лихорадки давать *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно по 5 капель черезъ 2 часа.— 2) Когда горло воспалено, лицо красное, безпокойство, безсонница, жажда: *Аписъ* 3, поочередно съ вышеупомянутыми средствами, черезъ 2 часа по 5 капель въ ложечкѣ отварной воды.—3) Дѣлать полосканіе горла растворомъ *Фитолакки* двадцать капель тинктуры на стаканъ тепловатой воды.

При злокачественной формѣ: 1) Полное безпамятство, бурыя, потрескавшіяся губы, сухой языкъ, слабость, сонливость: *Русъ* 3, каждый часъ по 5 капель.—2) Силь-

ная лихорадка, мозговыя явленія, темноокрашенная и неполная высыпь: *Айлантусъ* 3, каждый часъ по 3 капли.—3) Большой упадокъ силъ, малый пульсъ, слабость: *Ляхезисъ* 6, каждый часъ.—4) Сильная жажда, безпокойныя ночи, слабость: *Арсеникъ* 6, каждый часъ.—5) Въ опасныхъ случаяхъ, когда другія средства не помогаютъ: давать въ частыхъ пріемахъ *Карбо вегетабилисъ* 6 или 30, по 3 капли въ ложечкѣ воды, до наступленія реакціи, и затѣмъ опять перейти къ другимъ средствамъ, согласно указаніямъ выше.

Осложненія: 1) Если появятся колотья въ груди и боку съ значительною одышкою, что указываетъ на воспаленіе легкихъ, то давать *Фосфоръ* 6, по 5 капель или 5 крупинокъ черезъ 1—2 часа.—2) Головная боль, безсмысленный взглядъ, безпамятство, одеревенѣлый затылокъ, скрежетаніе зубами—воспаленіе мозга: *Кали іодатумъ* 2 попеременно съ *Аписъ* 3, черезъ 1—2 часа по 5 капель. При дальнѣйшемъ развитіи воспаленія мозга давать *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Геллеборусъ* 1 попеременно, черезъ 1—2 часа по 5 капель.—3) Дифтеритъ: *Аписъ* 3 и *Меркуріусъ ціанатусъ* 6, и при злокачественной формѣ еще *Ацидумъ нитрикумъ* 2, поочередно, черезъ 1 часъ по 5 капель. При охриплости и крупозномъ кашлѣ: *Спонгія* 3, *Броміумъ* 3.—4) Воспаленіе клѣтчатки шеи: Льняныя припарки снаружи, а внутрь сначала *Гепаръ сульфурисъ* 6, а послѣ *Силицеа* 6, каждые 4 часа по 5 капель.—5) Воспаленіе ушныхъ железъ: *Белладонна* 3 попеременно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, по 5 капель. При замедленіи нагноенія: *Гепаръ сульфурисъ* 6, черезъ 2 часа по 3 капли. При затвердѣніи железъ: *Барита карбоника* 6 и *Силицеа* 6 попеременно, по 5 капель.—6) Течь изъ уха: *Гепаръ сульфурисъ* 6, *Силицеа* 6 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—7) Воспаленіе глазъ: *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3 или *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, попеременно черезъ 2 часа.—8) Истеченіе гноя изъ носа: *Аурумъ трифиллюмъ* 3.—9) Продолжительный поносъ: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, раза 3 въ день по 5 капель.

Послѣдствія: 1) Воспаленіе почекъ: теплыя ванны и закутываніе въ шерстяныя одѣяла, чтобы вызвать

потъ, а внутрь *Аписъ* 3 и *Арсеникъ* 6, черезъ 2 часа по 5 капель. Если болѣзнь затягивается, то давать *Гепаръ сульфурисъ* 3, 3 раза въ день по костяной ложечкѣ.—2) При водянкѣ мозга: *Геллеборусъ* 1, черезъ 3 часа по 5 капель.

Слезнаго мѣшка воспаленіе.

Признаки: Опухоль у внутренняго угла глазъ величиною съ бобовицу. При надавливаніи выдѣляется изъ глаза или изъ носа слизистая жидкость или гной.

Лѣченіе: *Пульсатилла* 6 и *Стафизагрія* 6, поперемѣнно, по 2 раза въ день по 5 капель.—Въ застарѣлыхъ случаяхъ: *Силицеа* 6, по 5 капель 2—3 раза въ день.

Слезная фистула.

Признаки: Постоянное истеченіе слезъ или гнойной жидкости изъ глаза или чрезъ носовое отверстіе.

Лѣченіе: Давать продолжительное время, черезъ день *Калькареа карбоника* 30 и *Ликоподіумъ* 30, по 1 пріему въ день по 5 капель или 5 крупинокъ. Кромѣ этихъ средствъ рекомендуются еще нѣкоторыми врачами *Силицеа* 30, *Ляхезисъ* 12 и *Ацидумъ флуорикумъ* 6.

Слѣпота дневная.

Такіе больные не выносятъ солнечнаго свѣта, страдаютъ головными болями, слезотеченіемъ и съуженіемъ зрачка. Они видятъ хорошо ночью, днемъ же почти не видятъ.

Лѣченіе: *Фосфоръ* 6, *Силицеа* 6, *Аконитъ* 3 и *Сульфуръ* 6. Каждое средство принимать отдѣльно: одну недѣлю *Фосфоръ* 3 раза въ день по 5 капель, затѣмъ *Силицеа* слѣдующую недѣлю, далѣе *Аконитъ* и *Сульфуръ* въ такомъ же порядкѣ.

Слѣпота ночная, куриная.

Признаки: Съ наступленіемъ сумерекъ больной не видитъ ничего.

Вспомогательныя мѣры. Хорошее питаніе, жиры въ пищѣ, сливочное масло, рыбій жиръ.

Лѣченіе: 1) Если передъ глазами часто кажутся красныя пятна: *Белладонна* 3, 4 раза въ день по 3 капли.—2) Если кажутся черныя пятна передъ глазами: *Вератрумъ* 3.—3) Если указанныя средства не помогаютъ, то давать *Гіосціамусъ* 3 или *Ранункулусъ* 3. Хорошіе результаты также отъ *Феррумъ карбоникумъ* 3 и *Арсеникъ* 6.

Солнечный ударъ.

Положить больного въ покойную, прохладную и темную комнату такъ, чтобы голова лежала выше туловища, и дѣлать холодныя примочки на голову, а тѣло обтирать смоченными холодною водою полотенцами и растирать до красна; затѣмъ положить на голову теплую согрѣтую повязку и сдѣлать теплую ванну. Какъ питье, давать чистую свѣжую воду или съ лѣкарствомъ, какъ указано ниже; въ пищу—молоко и мясной бульонъ. Пища должна быть вообще самая легкая, и больному запрещаются безусловно всякія умственныя занятія, даже чтеніе, до полнаго выздоровленія и укрѣпленія.

Лѣченіе: Прежде всего дать нѣсколько пріемовъ *Камфора* 1, черезъ 10 минутъ по 2—3 капли на сахарѣ, а затѣмъ *Кактусъ* 1, также 2 пріема черезъ 10 минутъ, а затѣмъ черезъ 1 и 2 часа. Кромѣ того, хорошо также *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3 или *Гіоноинъ* 3 и *Гельземинумъ* 1, попеременно черезъ $^1/_2$ часа по 3 капли, а затѣмъ рѣже.

Спинного мозга оболочекъ воспаленіе.

Причины: Простуда, въ особенности отъ лежанія на сырой землѣ; ушибы, удары и т. п. При суставномъ ревматизмѣ, костоѣдѣ спинного хребта.

Признаки: По большей части развивается незамѣтно: головныя боли, усталость, боль спины, легкое познабливаніе; ухудшеніе отъ движенія и давленія спины, запоры, задержаніе мочи. Большая чувствительность кожи, лихорадочныя явленія и наконецъ общій параличъ.

Вспомогательныя мѣры: Спокойное лежаніе въ постели; холодные компрессы на спину. При наличности параличныхъ симптомовъ, вмѣсто холодныхъ компрессовъ, теплыя ванны. Электричество.

Лѣченіе: 1) Вначалѣ *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно, въ частыхъ пріемахъ, черезъ 1/2—1 часъ по 5 капель.—2) При боляхъ въ спинѣ и судорожныхъ явленіяхъ: *Аконитъ* 3 и *Нуксъ вомика* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 5 капель.—3) Сильныя боли и затрудненное дыханіе: *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, поперемѣнно, черезъ 2 часа по 5 капель.—4) Если болѣзни предшествовалъ ушибъ или ударъ: *Арника* 3 и *Цикута* 3 поперемѣнно, черезъ 2—3 часа по 3 капли.—5) Если послѣ промачиванія ногъ или всего тѣла: *Аконитъ* 3 и *Русъ* 3, поперемѣнно.—6) Если причиною была распутная жизнь: *Меркуріусъ вивусъ* 6 и *Фосфоръ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель.—7) При параличныхъ явленіяхъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, каждые 2 часа по 3 капли; если не наступитъ улучшенія: *Русъ* 3, *Вератрумъ* 3 или *Калабаръ* 3.—8) Если болѣзнь затягивается: *Кали іодатумъ* 2 и *Сульфуръ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель.

Спинного хребта механическія поврежденія.

Внутрь *Арника* 6 и *Гиперикумъ* 3, поперемѣнно по 2 раза въ день по 5 капель въ ложечкѣ воды. Снаружи втирать въ спинной хребетъ *Оподельдокъ Гиперикумъ* или Гиперикумъ тинктуру, смѣшанную со спиртомъ, 1 ч. на 4 части. Массажъ.

Струпья на головѣ у грудныхъ дѣтей.

Струпья эти являются вслѣдствіе увеличеннаго отдѣленія сала на волосистой части головы у грудныхъ дѣтей, которое смѣшивается съ пылью и образуетъ болѣе или менѣе толстыя корки свѣтло-желтаго, зеленоватаго или свѣтло-бураго цвѣта. Кожа подъ этими корками остается совершенно здоровою и только вслѣдствіе долгаго существованія ихъ и разложенія жира она краснѣетъ и поражается экземою.

Лѣченіе: Ежедневное обмываніе головы *арника глицериновымъ мыломъ*, а затѣмъ втираніе *вазелина* или *арникового масла.*

Внутрь: *Сульфуръ* 6 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ день попеременно, по 1 разу въ день по 3 капли или 5 крупинокъ.

Струпъ молочный.

Признаки: Сыпь на лицѣ. Просачивающаяся жидкость причиняетъ жженіе и зудъ. Бываетъ большею частью у дѣтей на первомъ году жизни.

Вспомогательныя мѣры: На руки дѣтямъ одѣвать перчатки или обвязывать ихъ, чтобы предохранить отъ расчесыванія ногтями. Для утоленія зуда обмывать пораженныя мѣста тепловатою водою и смазывать миндальнымъ масломъ, или размачиваютъ образовавшіяся корки примочками изъ теплой воды и смываютъ теплою мыльною водою. Можно вмѣсто миндальнаго масла употреблять для смазыванія чистый *американскій вазелинъ.*

Лѣченіе: 1) Если окружность струпьевъ очень воспалена, то давать *Аконитъ* 3 попеременно съ *Русъ* 3, черезъ 1—2 часа по 2 капли.—2) Если отъ этого не наступаетъ скорое улучшеніе, то давать *Графитъ* 6 и *Віола трикоморъ* 3, попеременно. Какъ промежуточное средство, давать ежедневно утромъ 1 пріемъ *Сульфуръ* 6.—3) Если сыпь распространяется до ушей, то *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 попе-

ремѣнно съ *Гепаръ сульфурисъ* 6.—4) При опуханіи шейныхъ железъ и сухой сыпи: *Барита карбоника* 6 утромъ и вечеромъ по 2 капли.

Судороги.

Причины: Весьма часто судороги происходятъ вслѣдствіе заболѣванія головного или спинного мозга; также вслѣдствіе страха, испуга, гнѣва, и т. д., а у дѣтей,—при прорѣзываніи зубовъ, при глистахъ, рѣже при скопленіи кала въ кишкахъ, большой слабости.

Лѣченіе: Покойное положеніе тѣла; удаленіе всякой стягивающей или давящей одежды; невозбуждающая, умѣренная пища, состоящая преимущественно изъ овощей, плодовъ, различныхъ кашицъ и молока; теплыя ванны; клистиры изъ ромашковаго отвара.

Внутрь: 1) При судорогахъ въ груди: *Актеа рацемоза* 6 и *Купрумъ* 6, черезъ 1/4 часа по 5 капель до прекращенія судорогъ. Также полезны въ этихъ случаяхъ: *Самбукусъ* 3, *Агарикусъ мускаріусъ* 6 и *Найя трипудіансъ* 6.—2) При нервныхъ судорогахъ, судорожномъ смѣхѣ и плачѣ, послѣ горя, печали, душевнаго разстройства: *Игнація* 6, *Платина* 6 и *Страмоніумъ* 6.—3) При эпилептическихъ судорогахъ (судорогахъ отъ падучей): *Белладонна* 6, *Купрумъ* 6, *Цикута вироза* 6.—4) При столбнякѣ: *Нуксъ вомика* 3, *Белладонна* 3, *Магнезія фосфорика* 6, черезъ 1/4 часа по 5 капель, а при столбнякѣ отъ пораненій: *Гиперикумъ перфоратумъ* ×1, принимать такъ же.—5) При столбнякѣ у новорожденныхъ: *Пассифлора инкарната* 3, *Нуксъ вомика* 6, *Ангустура вера* 6, черезъ 1/4 часа по 1 каплѣ въ 1/2 чайной ложечкѣ воды.—6) При судорогахъ въ икрахъ: *массажъ* и внутрь *Сульфуръ* 3, *Секале корнутумъ* 3, *Вератрумъ* 3, *Стронтіана карбоника* 6.—7) При расположеніи къ столбняку: *Русъ* 3, принимать съ мѣсяцъ 2 раза въ день по 5 капель.—8) При судорогахъ въ пальцахъ: *Силицеа*, *Секале корнутумъ* 3; при писчей судорогѣ и отъ переутомленія при игрѣ на фортепіано: *Каустикумъ* 6, два раза въ день по 5 капель.—9) При лицевыхъ

судорогахъ: *Белладонна* 3, *Игнація* 3, *Цинкумъ*, *Опіумъ* 6.—10) При истерическихъ судорогахъ: *Игнація* 6 и *Камомилла* 3, *Купрумъ* 6, *Коккулюсъ* 3.—11) При судорогахъ у беременныхъ: *Цинкумъ* 6 попеременно съ *Белладонною* 3, сначала черезъ каждые 1/2 часа, а потомъ рѣже.—12) При судорогахъ у роженицъ: а) во время родовъ: *Белладонна* 6 и *Гельземинумъ* 6; б) послѣ родовъ: *Секале корнутумъ* 3; в) если при этомъ лицо роженицы представляется впалымъ, блѣднымъ и холоднымъ: *Купрумъ* 6 и *Мосхусъ* 3, каждыя 10—15 минутъ по 5 капель въ водѣ; г) у роженицъ очень крѣпкаго тѣлосложенія: *Опіумъ* 6.—13) При судорогахъ у дѣтей: *Белладонна* 6, *Игнація* 6, *Цинкъ* 6, *Камомилла* 3; а если причину судорогъ можно приписать глистамъ: *Цина*×1, по 5 капель 3 раза въ день.—См. „Родимчикъ".

Сухотка спинного мозга.

Перерожденіе нервной ткани спинного мозга, часто вслѣдствіе заболѣванія сифилисомъ.

Причины: Простуда, въ особенности при потныхъ ногахъ.

Признаки: Онѣмѣніе ногъ, отсутствіе чувствительности кожи, особенно на подошвахъ. Потеря чувствительности въ нижнихъ бедрахъ. Безпомощность при ходьбѣ. Сначала усиленіе, потомъ ослабленіе полового влеченія. Парализація рукъ; слабость зрѣнія; отдѣленіе мочи каплями. Въ общемъ болѣзнь продолжительная.

Вспомогательныя мѣры: Спокойное лежаніе въ постели; питательная легкая пища; избѣгать волненій; при запорахъ прибѣгать къ клистирамъ. Парализованныя части содержать въ безусловной чистотѣ.

Лѣченіе: 1) *Силицеа* 6, въ рѣдкихъ пріемахъ, черезъ 3—4 дня по 1 пріему, когда болѣзнь явилась вслѣдствіе задержанія ножныхъ потовъ; кромѣ того, давать ежедневно *Алюминіумъ металликумъ* 3 попеременно съ *Секале корнутумъ* 3 или съ *Аписъ* 3, по 5 капель черезъ 4 часа, продолжительное время.—2) При половыхъ возбужденіяхъ давать нѣсколько пріемовъ *Лупулинумъ* 3, *Ацидумъ фосфори-*

жумъ 3.—3) Если болѣзнь явилась слѣдствіемъ промачиванія ногъ: *Русъ* 3 и *Калькареа карбоника* 6, по 2 раза въ день по 5 капель въ ложечкѣ воды.

Важно противосифилитическое лѣченіе — *Нитри ацидумъ* 6. Въ началѣ болѣзни хорошіе результаты даетъ *Алюминіумъ металликумъ* 3—6 и *Нуксъ вомика* 3—6.

Сыпи.

Не слѣдуетъ вгонять сыпи во внутрь посредствомъ мазей или пластырей, такъ сказать, замазывать сыпи. Только втиранія въ кожу *вазелина*, *глицерина*, либо *ланолина*, съ прибавленіемъ нѣсколькихъ капель тинктуры *Русъ*, бываютъ часто полезны.

Главныя средства при лѣченіи сыпей это: *Гепаръ сульфурисъ* 6, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, *Сульфуръ* 6, *Русъ* 3, *Силицеа* 6. Если высыпь соединена съ лихорадкой: *Аконитъ* 3 или *Белладонна* 3, поперемѣнно съ однимъ изъ предыдущихъ средствъ.

1) **Сыпи на головѣ**: Обмыванія головы мыломъ изъ Руса и внутрь *Барита карбоника* 6 и *Русъ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.—При образованіи большихъ струпьевъ (корокъ): *Гепаръ сульфурисъ* 3.—При образованіи чешуекъ: *Графитъ* 6.—При мокнущихъ сыпяхъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, *Петролеумъ* 3. При образованіи перхоти и шелушеніи кожи: *Кали сульфурикумъ* 6.—При сыпи на головѣ и лицѣ у дѣтей съ образованіемъ на нихъ корокъ или безъ этихъ послѣднихъ, при зудящей, мокнущей сыпи (пузыряхъ): *Сульфуръ*×3 и *Графитъ* 6, черезъ день, поперемѣнно, 3 раза въ день по 5 капель. Во всѣхъ случаяхъ такой сыпи очень полезно смазывать раза 3 въ день мазью изъ *Меркуріусъ коррозивусъ*×3, 10 капель на 1 унцъ чистаго, бѣлаго вазелина.

2) **Сыпи на лицѣ**: *Сульфуръ* 6, *Арсеникумъ іодатумъ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, *Антимоніумъ крудумъ* 6, *Стафизагрія* 3.—На ушахъ и на носу: *Графитъ* 6, *Каустикумъ* 6.—При изъязвленіи въ ноздряхъ: *Аурумъ муріатикумъ натро-*

натумъ 3 и *Кали бихромикумъ* 3, по 2—3 раза въ день по 5 капель.

3) **Сыпи на голени:** *Кали іодатумъ* 3, *Силицеа* 6.—При старыхъ разъѣдающихъ язвахъ: *Келидоніумъ* 1, утромъ и вечеромъ по 5 капель, а днемъ 2 раза *Арсеникъ* 3 и промываніе ранъ *Календулою* (1 : 10 ч. воды) или растворомъ *Меркуріусъ коррозивусъ* (1 : 5000).

4) **Различныя сыпи:** При пузырчатой сыпи, которая выражается образованіемъ на кожѣ сливающихся между собою пузырей, лихорадкою, исхуданіемъ, малокровіемъ, отсутствіемъ аппетита: *Русъ* 3, *Кантарисъ* 3, черезъ 2 часа по 5 капель, а утромъ и вечеромъ *Арсеникъ* 3, по 5 капель. При злокачественныхъ гнойникахъ (нарывахъ) смазывать ихъ мазью изъ *Ипекакуана* 1, 30 капель на 2 ложечки Спермацетной мази, и внутрь давать *Гепаръ* 3 и *Белладонну* 3, каждые 2 часа. Точно такимъ же образомъ слѣдуетъ лѣчить огневики (карбункулы).—При сыпи на рукахъ: *Кали сульфурикумъ* 6.—При образованіи оспенныхъ прыщей на рукахъ у женщинъ, доящихъ коровъ: *Русъ* 3 поперемѣнно съ *Ляхезисъ* 6.—При пузырчатой сыпи у новорожденныхъ: *Ранункулюсъ бульбозусъ* 3.—При пузырчатой сыпи у взрослыхъ дѣтей: теплыя ванны съ отрубями и внутрь *Русъ* 3, *Кантарисъ* 3; если она злокачественна: *Кали фосфорикумъ* 6.

Тазобедреннаго сустава воспаленіе. Кокситъ.

Эта опасная болѣзнь, происходящая часто вслѣдствіе золотухи, туберкулеза, начинается почти всегда болью въ колѣнѣ, а затѣмъ въ тазобедренномъ сочлененіи, при чемъ больной начинаетъ похрамывать. Затѣмъ образуется въ суставѣ нарывъ, часто свищъ, костоѣда, имѣющіе своимъ послѣдствіемъ увяданіе (атрофію) и укороченіе ноги.

Лѣченіе: *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, по два раза въ день по 5 капель. Снаружи

легкій, осторожный массажъ съ *Арника вазелиномъ* или *Симфитумъ мазью.*

Трещины кожи.

Если трещины на рукахъ, то ихъ слѣдуетъ смазывать свѣжимъ чистымъ вазелиномъ съ прибавленіемъ *Меркуріусъ коррозивусъ*×3 (10 капель на 1 унцъ вазелина). Въ упорныхъ случаяхъ прекрасно дѣйствуетъ *Графитная мазь* (растереть 1 гр. *Графита*×1 въ 10 гр. вазелина); кромѣ того, хорошо дѣйствуетъ *Гамамелисъ мазь*, а также омыванія воднымъ растворомъ (1/2 чайной ложечки тинктуры на стаканъ воды) *Гамамелисъ.*

Внутрь: При трещинахъ на губахъ: *Сульфуръ* 6, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ день, по 3 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ и смазывать ежедневно губною помадою.— 2) При трещинахъ въ углахъ или краяхъ носа у ноздрей или носовыхъ крыльевъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Кали бихромикумъ* 6, по 2 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ, и смазываніе *Гамамелисъ мазью.*— 3) При упорныхъ трещинахъ и вообще нездоровой кожѣ: *Гепаръ* 3 и *Натрумъ муріатикумъ* 6, по 2 раза въ день принимать. Мазь изъ 10 капель *Меркуріусъ коррозивусъ*×3 на 1 унцъ *Колдъ крема* является прекраснымъ средствомъ во всѣхъ случаяхъ потрескавшейся кожи. Смазывать 2 — 3 раза въ день.

Трипперъ. Перелой.

Крайне заразительный и заразный катарръ мочеиспускательнаго канала, а у женщинъ и влагалища, вызываемый особыми микроорганизмами, такъ называемыми гонококками.

Причины: Зараженіе при сомнительномъ сношеніи.

Признаки: Сначала жженіе при мочеиспусканіи, затѣмъ начинаются рѣзь, боли, появляется отдѣленіе, сначала слизистое, бѣловатое, затѣмъ гнойное, обильное.

Острый періодъ длится недѣль 5—6, затѣмъ легко переходитъ въ хроническую форму; при чемъ отдѣленіе почти незамѣтно, по утрамъ лишь выдавливается капля гноя, боли незначительны—небольшое жженіе, саднѣніе при мочеиспусканіи, въ мочѣ плаваютъ нити и пр.

Осложненіе. Катарръ мочевого пузыря, воспаленіе яичекъ, предстательной железы, катарръ почекъ, пораженіе суставовъ. Общее истощеніе организма.

Мѣры діэтетическія и гигіеническія. Совершенно оставить употребленіе спиртныхъ и возбуждающихъ напитковъ; возможно больше пить молока (очень хорошо дѣйствуетъ миндальное молоко). Избѣгать въ пищѣ всего кислаго, горькаго, соленаго и пикантнаго, никакихъ пряностей и приправъ. Соблюденіе крайней чистоты и опрятности, помнить, что отдѣленія—весьма заразительны, и попаданіе ихъ въ глаза вызываетъ тяжелое заболѣваніе—трипперный конъюнктивитъ (воспаленіе соединительной оболочки), крайне опасное для зрѣнія. Полное воздержаніе отъ половыхъ сношеній. На мошонку одѣть суспензорій (мѣшочекъ для яичекъ). Избѣгать усиленныхъ движеній, усиленной ходьбы, ѣзды и пр.

Лѣченіе: Вначалѣ *Аконитъ* 3 и *Белладонна* 3, попеременно каждый часъ по 2 капли, а когда покажется отдѣленіе: *Кантарисъ* 3 и *Туя* 3, попеременно, и какъ питье *Белладонна* 3. Для предупрежденія осложненій утромъ и вечеромъ по 5 капель *Меркуріусъ коррозивусъ* 3. Мѣстныя спринцованія изъ *Цинкумъ сульфурикумъ* или *сульфокарболикумъ* (1 гранъ на 2 унца воды). Лѣченіе долженъ вести врачъ.

Трудная, запоздалая ходьба дѣтей.

Ежедневно купать дѣтей въ тепловатой водѣ, къ которой можно прибавить 1—2 фунта *поваренной соли* на ванну. Вытирать тѣло этой же водой или *французскою водкою съ солью*. Діэта: молоко, яица всмятку, бульонъ; не давать совсѣмъ картофеля, пироговъ и вообще мучнистой пищи.

Лѣченіе: *Калькареа карбоника* 6 или *Калькареа фосфорика* 6, утромъ и вечеромъ по 1 пріему, по 5 капель, въ теченіе 8 дней; сдѣлать перерывъ на 2 недѣли и затѣмъ опять давать лѣкарство.

Трясеніе рукъ.

Причины: Слишкомъ частое употребленіе возбуждающихъ средствъ (кофе, спиртныхъ напитковъ), половая невоздержанность, слабость послѣ тяжкихъ болѣзней, отравленіе ртутью и т. п.

Лѣченіе: Прежде всего нужно устранить причину, вызвавшую трясеніе, затѣмъ ежедневныя умыванія холодною водою, рѣчныя купанья; не возбуждающая, но питательная пища. Умѣренный образъ жизни. Врачебная гимнастика. 1) *Нуксъ вомика* 3, у злоупотребляющихъ спиртными напитками, 3 раза въ день по 5 капель.—2) При слабости послѣ длительной болѣзни или вслѣдствіе половой невоздержности: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3 и *Хининумъ сульфурикумъ* 3.—3) Вслѣдствіе отравленія ртутью: *Гепаръ сульфурисъ* 6 и *Ацидумъ нитрикумъ* 3.—Принимать въ теченіе нѣкотораго времени *Гензелевскія капли* или *Феррумъ гэматиникумъ* 2 попеременно съ *Калькареа фосфорика* 6, по 3 раза въ день по 5 капель.

Угри.

Закупорка жировыхъ железокъ кожи лица.

Встрѣчаются на лицѣ и на плечахъ и узнаются по чернымъ точкамъ.

Лѣченіе: Внутрь принимать *Арсеникъ* 6 и *Сульфуръ* 6, черезъ день, утромъ и вечеромъ по 5 капель. Выдавливать угри часовымъ ключикомъ; часто мыть лицо; смазывать на ночь миндальнымъ масломъ и смывать утромъ Арниковымъ мыломъ.

Ударъ мозговой, апоплексическій. Апоплексія.

Разрывъ кровеноснаго сосуда въ головномъ мозгу и кровоизліяніе въ ткань мозга, съ ея разрушеніемъ. Какъ послѣдствія—параличи.

Причины: Наслѣдственность. Злоупотребленіе спиртными напитками. Тучность, ожирѣніе, жировое перерожденіе тканей. Артеріосклерозъ — известковое перерожденіе стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, ихъ ломкость. Сифилисъ.

Предохранительныя мѣры: Оставить совершенно употребленіе спиртныхъ и возбуждающихъ напитковъ. Столъ, главнымъ образомъ, вегетаріанскій и молочный. Больше моціона. Пить щелочныя минеральныя воды. Избѣгать физическихъ напряженій, душевныхъ волненій, всякихъ возбужденій. Заботиться о правильномъ ежедневномъ опорожненіи кишечника.

Припадокъ. Лицо пораженнаго ударомъ багрово-синее, дыханіе трудное, хрипящее, прерывистое, зрачки или сужены или же очень расширены, глаза скошены въ сторону. Изслѣдованіе обнаруживаетъ, что уже произошелъ параличъ одной половины тѣла: ротъ, лицо скошено, рука, нога при подниманіи и выпусканіи падаютъ, какъ безжизненныя. Больной безъ сознанія, безъ движенія. Иногда въ такомъ состояніи, если повреждены или обширныя или важныя части мозга, больной умираетъ или приходитъ въ себя, оправляется, и слѣдствіемъ удара остаются параличи. Обычно наблюдается повтореніе припадка, и каждый послѣдующій грозитъ все большею и большею опасностью.

Лѣченіе: Прежде всего важно обратить вниманіе на предупрежденіе припадка апоплексіи и принять всѣ вышеуказанныя и предохранительныя мѣры. Какъ предохранительнымъ средствомъ можетъ служить: *Белладонна* 3, утромъ и вечеромъ по 5 капель. Больного, пораженнаго ударомъ, положить горизонтально, освободить отъ одежды, разстегнуть шею, грудь. На голову холодный компрессъ (ледъ). Ноги растирать одеколономъ, водкой, поставить клизму для освобожденія ки-

шечника отъ каловыхъ массъ. Давать каждые ½ часа по 5 капель *Белладонна* 3 и *Арника* 3, поперемѣнно; у лицъ, злоупотребляющихъ спиртными напитками, дать нѣсколько пріемовъ *Опій* 3. Въ пищу давать бульонъ, молоко.

Параличи требуютъ назначенія *Гельземина* 3 и *Каустикумъ* 3, черезъ 2—3 часа поперемѣнно по 5 капель.

Если имѣется подъ рукой врачъ, необходимо его пригласить немедленно къ больному.

Ужаленіе насѣкомыми.

Лѣтомъ слѣдуетъ носить съ собою бутылочку съ *нашатырнымъ спиртомъ*, для того, чтобы можно было немедленно потереть имъ мѣсто укуса, или прикладываютъ примочки изъ раствора одной ложечки *Ледумъ* Θ на чашку теплой воды.—Въ случаѣ ужаленія пчелою, осою и т. п., слѣдуетъ прежде всего постараться вынуть жало и затѣмъ смочить укушенное мѣсто слюною, или натереть черною землею или простымъ мыломъ, или уксусомъ. Послѣ удаленія жала выжимать или высасывать ранку до тѣхъ поръ, пока изъ изъ нея не покажется капелька крови, послѣ чего можно намазать это мѣсто растворомъ (1 : 10 ч.) *салициловой кислоты* и покрыть пораженное мѣсто *коллодіемъ*. При дурныхъ послѣдствіяхъ отъ ужаленія нужно принимать черезъ каждыя 5 минутъ по три капли *камфарнаго спирта* на сахарѣ или *Аписъ* 3, *Белладонна* 3, *Ляхезисъ* 6, черезъ 1—2 часа по 5 капель, а снаружи смазывать опухоли *Аписнымъ масломъ*.

Укушеніе змѣями.

Докторъ Герингъ рекомендуетъ раскалить кусокъ желѣза, а въ крайнемъ случаѣ раскурить сигару и держать ее близко у самаго укуса такъ долго, какъ только можетъ выдержать укушенный, и на такомъ разстояніи, чтобы не

прижечь кожу. Это нужно продолжать, по крайней мѣрѣ, часъ. Вокругъ укушеннаго мѣста намазывать масломъ или саломъ, а если нѣтъ, то мыломъ или даже слюною, но постоянно, чтобы кожа не оставалась сухою. На разстояніи нѣсколькихъ пальцевъ выше мѣста укушенія перетянуть членъ крѣпко полотенцемъ или шнуркомъ и держать, пока возможно. Давать больному крѣпкое вино или водку возможно больше. Высасываніе ранки тоже хорошо, только съ осторожностью, чтобы губы и языкъ у высасывающаго не были потресканы. Затѣмъ ранку обмывать соленою водою или растворомъ нашатырнаго спирта (10 капель на рюмку воды) и давать горячія или паровыя ванны. Внутрь давать *Ляхезисъ* 6 и *Арсеникъ* 3, черезъ 1/2 часа по 5 капель.

Ушныя болѣзни и заболѣванія органа слуха.

При ушныхъ болѣзняхъ слѣдуетъ немедленно обратиться къ врачу, такъ какъ безъ этого могутъ произойти трудно излѣчимыя болѣзни.

а) **Глуховатость** происходитъ часто вслѣдствіе затвердѣнія ушной сѣры. Для размягченія ея нужно вливать въ ухо по каплямъ теплое миндальное масло. Затѣмъ впрыскиваютъ въ ухо, посредствомъ спринцовки, теплое молоко или тепловатый водный растворъ борной кислоты (1 чайную ложечку на стаканъ воды). Очищеніе слухового прохода производится съ большою осторожностью, всего лучше посредствомъ ухочистки или тупымъ концомъ шпильки, обернутымъ въ гигроскопическую вату.

Лѣченіе: 1) При глуховатости вслѣдствіе простуды: *Дулькамара* 3, *Графитъ* 6, *Петролеумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.—2) При глуховатости, соединенной съ шумомъ въ ушахъ: *Рододендронъ* 6, *Хининъ* 6.—3) Вслѣдствіе внезапнаго задержанія течи изъ уха: *Гепаръ сульфурисъ* 3, *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, по костяной ложечкѣ по 3 раза въ день.—4) Вслѣдствіе подагры: *Феррумъ пикри-*

никумъ 3.—5) Послѣ кори: *Пульсатилла* 3, *Карбо вегетабилисъ* 6.—6) Послѣ скарлатины или оспы: *Белладонна* 3, *Сульфуръ* 3.—7) Вслѣдствіе скрывшейся сыпи: *Сульфуръ* 6, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6.—8) Вслѣдствіе удара, ушиба и т. д.: *Арника* 3, *Русъ* 3.—9) При старческой глуховатости, соединенной съ сухостью и шумами въ ушахъ: *Аурумъ муріатикумъ натронатумъ* × 3, *Сульфуръ* × 3, *Петролеумъ* 6 и *Силицея* 6, каждое порознь въ теченіе одной недѣли, утромъ и вечеромъ по 3 капли.

б) **Шумъ въ ушахъ** можетъ происходить вслѣдствіе прилива крови къ головѣ, простуды, сквознаго вѣтра, промоченія ногъ и т. д., а также вслѣдствіе затвердѣнія ушной сѣры или присутствія въ слуховомъ проходѣ посторонняго тѣла. Поэтому изслѣдованіе уха необходимо.

Лѣченіе: 1) При шумѣ въ ушахъ: *Белладонна* 3, *Нуксъ вомика* 3, *Пульсатилла* 3, поочередно, черезъ день одно за другимъ по 3 пріема въ день по 5 капель.—2) При звонѣ въ ушахъ: *Калькареа карбоника* 6, *Пульсатилла* 3.—3) При ощущеніи колокольнаго звона въ ушахъ: *Аурумъ муріатикумъ* 3 и *Силицеа* 6.

Ушная сѣра.

При значительномъ скопленіи ея, вслѣдствіе ушныхъ болѣзней, давать внутрь: *Коніумъ* 3 и *Аурумъ муріатикумъ натронатумъ* × 3, по 2 раза въ день по 5 капель, иногда требуется механическое удаленіе сѣры, которое можетъ быть сдѣлано только врачемъ. Для размягченія сѣры употребляютъ *растворъ соды* (1 : 15 ч.) или слабый *отваръ ромашки*.

Ушная сыпь.

При сильно зудящей сыпи смазывать ее маковымъ масломъ.

Лѣченіе: 1) Въ скоропроходящихъ случаяхъ: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ 1—2 часа по костяной ло.

жечкѣ.—2) При водянистомъ истеченіи: *Арсеникъ* 6, по 3 капли черезъ 2 часа, а при гнойномъ истеченіи—*Гепаръ сульфурисъ* 3, по костяной ложечкѣ каждые 2 часа.—3) Въ запущенныхъ случаяхъ давать *Графитъ* 6, *Калькареа карбоника* 6, *Сульфуръ* 6 и *Меркуріусъ іодатусъ* 6, каждое порознь въ теченіе одной недѣли, одно послѣ другого, 2 раза въ день по 5 капель.

Ушная жаба, свинка, заушница.

Воспаленіе околоушной железы. Эта болѣзнь является эпидемической и поражаетъ дѣтей старше 1 года.

Причины: Простуда; зараженіе.

Признаки: Лихорадка, головная боль, усталость, иногда рвота. Боли подъ ухомъ, подъ которомъ затѣмъ образуется опуханіе околоушной железы, съ одной или съ обѣихъ сторонъ, которая все дальше и дальше распространяется и совершенно обезображиваетъ лицо; зубы сжаты; слюнотеченіе усиленное; иногда опухоль переходитъ въ нарывъ. Боль эта продолжается отъ 3—14 дней и часто бываетъ при скарлатинѣ.

Вспомогательныя мѣры: Растираніе опухоли теплымъ *аписнымъ масломъ*. Не слѣдуетъ укутывать голову теплыми платками; но нужно очень остерегаться простуды, такъ какъ болѣзнь легко переходитъ на другія железы (яички, грудныя железы).

Лѣченіе: 1) Когда лицо горячее, красное—*Белладонна* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, попеременно, черезъ 2 часа по 5 капель.—2) Когда бываютъ поражены яички, то *Пульсатилла* 3, дня два, а затѣмъ *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, 4 раза въ день по костяной ложечкѣ, а затѣмъ *Сульфуръ* 3.—3) При опухоли не воспалительной формы: *Іодіумъ* 3.—4) При затвердѣвшей опухоли: *Силицеа* 6, *Аурумъ* 6 и *Барита карбоника* 6.—5) Когда начинается нагноеніе или болѣзнь бываетъ при скарлатинѣ, то давать *Гепаръ сульфурисъ* 3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ.—6) Если при тифѣ,—то *Русъ* 3, каждые 2 часа по 5 капель.

Уха воспаленіе.

Причины: Большею частью бываетъ отъ простуды, сквознаго вѣтра и чаще у дѣтей, чѣмъ у взрослыхъ. Сопровождается обыкновенно насморкомъ, кашлемъ, воспаленіемъ миндалевидныхъ железъ, а также при прорѣзываніи зубовъ у маленькихъ дѣтей.

Признаки: Ухо красное, горячее, опухшее, болѣзненное и заложено; иногда боли рвущія, сверлящія, стучащія, колющія и жгучія.

Вспомогательныя мѣры: При сильныхъ боляхъ вкапываютъ въ ухо нѣсколько капель теплаго Белладоннаго масла, и затѣмъ вкладываютъ кусочекъ ваты.

Лѣченіе: 1) Послѣ простуды—при рвущихъ, тянущихъ боляхъ съ жужжаніемъ въ ушахъ, истеченіи гноя, ухудшеніи къ вечеру и ночью: *Пульсатилла* 3.—2) Если болѣзнь произошла отъ сквознаго вѣтра и сопровождается сильными рѣжущими болями: *Камомилла* 3.—3) При рожистомъ воспаленіи, опухоли и колотіи въ ушахъ: *Белладонна* 3.—4) При пульсирующемъ шумѣ въ ушахъ, усиливающемся отъ надавливанія, и носовыхъ кровотеченіяхъ: *Феррумъ фосфорикумъ* 6.—5) Если боль сопряжена съ зубною болью: *Плантаго* 3.—6) У золотушныхъ дѣтей: *Гепаръ сульфурисъ* 3.—7) При сопровождающей глухотѣ: *Меркуріусъ дульцисъ* 3.—8) При хроническомъ воспаленіи средняго уха: *Кали хлоратумъ* 6.—9) При истеченіяхъ: желтоватыхъ—*Кали сульфурикумъ* 6; темныхъ и вонючихъ—*Кали фосфорикумъ* 6. Принимать лѣкарства: въ капляхъ 3—4 раза въ день по 5 капель, въ порошкахъ по 1 костяной ложечкѣ въ тѣ же промежутки.

Ушная течь.

Причины: Чаще встрѣчается у золотушныхъ дѣтей, какъ послѣдствіе воспаленія ушей послѣ скарлатины, кори и оспы.

Признаки: Истеченіе бываетъ иногда гноевидное, вонючее и разъѣдающее наружный слуховой проходъ и окружающія его части.

Вспомогательныя мѣры: Ухо слѣдуетъ возможно часто (раза 2 въ день) очищать промываніями изъ тепловатой воды, отвара ромашки или раствора борной кислоты (чайную ложку на стаканъ воды). Ѣдкихъ, кислыхъ, соленыхъ промываній остерегаться. Ухо можно закладывать на воздухѣ чистою ватою.

Лѣченіе: 1) Если течь явилась слѣдствіемъ воспаленія уха: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, три-четыре раза въ день по костяной ложечкѣ.—2) У золотушныхъ дѣтей, если она сопряжена съ сыпью на лицѣ или опухолью железъ: *Гепаръ* 6, 3 раза въ день по 5 капель.—3) Какъ послѣдствіе кори, скарлатины и т. п.: *Белладонна* 3 и *Пульсатилла* 3 попеременно, по 3 раза въ день по 5 капель.—4) При сильномъ отдѣленіи ушной сѣры: *Коніумъ* 3 и *Кали карбоникумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.—5) При кровянистомъ истеченіи: *Пульсатилла* 3, утромъ и вечеромъ по 5 капель, *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Ацидумъ нитрикумъ* 6, попеременно, по 2 раза въ день по 5 капель.—6) При вонючемъ истеченіи и костоѣдѣ: *Аурумъ муріатикумъ* 6 и *Силицеа* 6, черезъ день, по 2 раза въ день по 5 капель.— 7) При течи съ изъязвленіемъ кожи за ушами: *Графитъ* 6, по 5 капель 3 раза въ день.—8) При хроническихъ истеченіяхъ съ пораженіемъ костей: *Калькареа іодата* 6, ежедневно по 1 пріему, а затѣмъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, черезъ 2—3 дня, *Калькареа флуорика* 6, *Сульфуръ* 6, *Силицеа* 6, утромъ и вечеромъ по 5 капель, съ двухнедѣльными промежутками между пріемами лѣкарствъ.

Ушная боль.

Причины: Большею частью простуда, но можетъ быть предвѣстникомъ и другихъ страданій.

Признаки: Очень болѣзненныя, рвущія, давящія боли внутри уха, которыя иногда очень постоянны и продолжи-

тельны, иногда же являются приступами или толчками. Наружнаго воспаленія при этомъ нѣтъ.

Вспомогательныя мѣры: Избѣгать сильнодѣйствующихъ средствъ. Вкапывать въ больное ухо теплое Белладонное масло.

Лѣченіе: 1) Краснота лица и шумъ въ ухѣ указываютъ на *Белладонну* 3.—2) Рвущія, дергающія боли, съ ухудшеніемъ вечеромъ и къ ночи: *Пульсатилла* 3.—3) Колющія боли и сухость въ ухѣ: *Камомилла* 3.—4) Рвущія боли, доходящія до зубовъ и челюстей: *Меркуріусъ солюбилисъ* 3.—5) Боли, сопряженныя съ періодическою глухотою: *Спигелія* 3. 6) Боли судорожныя, сопряженныя съ зубною болью и невралгіею: *Магнезія фосфорика* 6.—6) Сильныя боли толчками, утромъ или ночью, съ скрипленіемъ при жеваніи: *Нуксъ вомика* 3.—Давать лѣкарства каждые $1^1/_2$—2 часа по 5 капель въ ложечкѣ воды; а въ порошкѣ,—по костяной ложечкѣ на языкъ и запивать водою.

Ушибы.

Ушибы бываютъ слѣдствіемъ удара, толчка, нажатія, паденія и т. п., отчего являются раны, подтеки, кровоизліянія, синяки. Пораженныя мѣста синѣютъ, зеленѣютъ, желтѣютъ. При этомъ можетъ образоваться воспаленіе, нагноеніе и даже антоновъ огонь (омертвѣніе ушибленной части).

Вспомогательныя мѣры: Если кожа не повреждена, то нужно дѣлать примочки изъ *Арники* Θ (1 ч. Арники на 5—10 ч. воды), при чемъ ушибленная часть тѣла должна находиться въ совершенномъ покоѣ; а если *Арника* не переносится кожею, причиняя рожистое воспаленіе, то замѣнить ее *Календулою.*

Лѣченіе: *Арника* 3, при воспаленіи, попеременно съ *Аконитомъ* 3, каждые 2 часа по 5 капель. При поврежденіи кости и надкостницы: примочка изъ *Симфитумъ* (1 ч. на 10 ч. воды) и внутрь *Симфитумъ* 3. При ущемленіи

грудей, яичекъ и т. п.: *Коніумъ* 3. Противъ послѣдствій, остающихся послѣ ущемленій: *Русъ* 3, утромъ и вечеромъ по 5 капель.

Флюсъ.

Лѣченіе: Намазывать щеку хорошенько теплымъ *Анисным масломъ* нѣколько разъ въ день и давать внутрь въ начальномъ періодѣ *Гепаръ сульфурисъ*×3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ, пока не начнетъ спадать опухоль. Если опухоль длится уже нѣсколько дней, то *Меркуріусъ солюбилисъ* 6 и *Белладонна* 3 поперемѣнно, черезъ 2 часа по 5 капель, а по вскрытіи нарыва *Силицеа* 6. При очень болѣзненной опухоли втирать въ щеку *аконитиновый спиртъ* или *Белладонное масло.*

Холера (азіатская).

Холера вызывается особымъ микроорганизмомъ, запятовидною бациллою (холерный вибріонъ), находящеюся въ кишкахъ и кишечныхъ изверженіяхъ больныхъ.

Признаки: Начинается разстройствомъ желудка, поносомъ и отсутствіемъ аппетита. Поносъ все болѣе и болѣе учащается и усиливается, при чемъ испражненія имѣютъ *видъ рисоваго отвара.* Къ этому присоединяется сильная рвота, а послѣ нея часто икота; чрезвычайный упадокъ силъ; кожа становится холодною, а пульсъ слабымъ; появляются болѣзненныя судороги въ икрахъ и сильное безпокойство; дыханіе затрудняется и дѣлается поверхностнымъ; глаза и щеки сильно вваливаются и носъ заостряется; кожа теряетъ свою эластичность и образуетъ складки; голосъ становится сиплымъ и слабымъ, а языкъ сухимъ и густо обложеннымъ; холодный потъ выступаетъ на лбу; мочеотдѣленіе прекращается; появляется мучительная жажда. Появленіе теплаго пота указываетъ на благопріятный исходъ болѣзни.

Предохранительныя мѣры: Во время эпидеміи каждое утро всыпать въ шерстяные носки или чулки ложечку *сѣрнаго* порошка (осадочной сѣры). Растворить 10 капель *Вератрумъ* × 3 на 1/2 стакана отварной воды и принимать по десертной ложкѣ утромъ натощакъ и послѣ завтрака, обѣда и ужина. Если же во время холерной эпидеміи появится тошнота, то принимать это средство по столовой ложкѣ черезъ 1/2 часа. Дѣтямъ отъ 2—14 лѣтъ даютъ его по чайной ложечкѣ. Точно такъ же можно предохранить себя отъ заболѣванія, если принимать по 5 капель камфарнаго спирта на кусочкѣ сахара, раза 3 въ день. Во время эпидеміи никогда не слѣдуетъ пить сырой воды, ѣсть сырыхъ фруктовъ, не выходить изъ дому утромъ натощакъ, а съѣсть передъ тѣмъ хотя бы кусокъ черстваго (не свѣжаго) хлѣба. Не отягощать желудка трудноваримою пищею. Вообще нужно быть воздержнымъ въ ѣдѣ и питьѣ, въ особенности же не ѣсть незрѣлыхъ плодовъ и не пить кислаго пива. Избѣгать промачиванія ногъ и вообще всякой простуды. Не слѣдуетъ оставаться подолгу въ томъ мѣстѣ, гдѣ ощущается дурной запахъ. Не посѣщать чужихъ отхожихъ мѣстъ или ватеръ-клозетовъ. Отхожія мѣста должно ежедневно обеззараживать растворомъ мѣднаго купороса или марганцевокислаго кали. Необходимъ, кромѣ того, умѣренный моціонъ на свѣжемъ воздухѣ и чистый воздухъ въ жилыхъ комнатахъ, преимущественно въ спальнѣ, для чего нужно часто провѣтривать ихъ, а также полезно носить шерстяные набрюшники.

При первыхъ признакахъ заболѣванія холерою, больного слѣдуетъ положить въ постель и прикладывать къ ногамъ бутылки съ горячею водою, завернутыя въ полотенца, а равно и на животъ; дѣлать горячія ванны, въ которыхъ усиленно растирать больного суконкою. Въ теченіе первыхъ сутокъ больной долженъ оставаться безо всякой пищи. Для устраненія жгучей жажды даютъ больному понемногу зельтерской воды или кусочки чистаго льду. Діэту нужно соблюдать въ высшей степени строгую и притомъ не только во время болѣзни, но и послѣ, недѣли двѣ. Вначалѣ разрѣшаются лишь слизистые супы (овсянка), кипяченое

молоко, не жирный куриный бульонъ, бѣлокъ яичный размѣшанный въ отварной водѣ, съ прибавленіемъ ложечки коньяку и кусочка сахара и т. п., такъ какъ при несоблюденіи діэты легко появляются опасные возвраты болѣзни.

Лѣченіе: 1) Самымъ лучшимъ предохранительнымъ средствомъ служатъ пріемы: *Камфора Рубини*, по 5 капель утромъ и вечеромъ. При первыхъ признакахъ заболѣванія пріемы этого средства учащаются, а вмѣстѣ съ нимъ даются и еще два специфическихъ противъ холеры средства: *Вератрумъ*×3 и *Купрумъ ацетикумъ* 3, каждый часъ поперемѣнно. Это главныя средства. При мучительной жгучей жаждѣ и быстромъ упадкѣ силъ: *Арсеникъ* 3 и *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, черезъ 1/4 часа по 5 капель. При внезапныхъ приступахъ холеры, сопровождаемыхъ крайне тяжелыми явленіями: *Камфора Рубини*, черезъ каждыя 5—10 минутъ, по 5 капель на кусочкѣ сахара, или по 1—2 лепешки. Подъ наблюденіемъ врача сажаютъ больного въ ванну и поливаютъ его теплою водою (30—32° Р.), затѣмъ окутываютъ согрѣтыми шерстяными одѣялами и укладываютъ въ постель. Какъ только прекратятся судороги, боли въ желудкѣ, поносъ и рвота, губы начнутъ краснѣть и наступитъ лихорадочное состояніе, то оставить другія лѣкарства и давать *Аконитъ* 3, каждый часъ по 5 капель, пока больной не спитъ; когда же заснетъ, то оставить его въ покоѣ безъ лѣкарствъ. Иногда, во время холеры, развивается холерный тифоидъ, т.-е., тифозное тяжко-лихорадочное состояніе организма, выражающееся значительнымъ повышеніемъ температуры, сильною головною болью, потемнѣніемъ въ глазахъ, краснотою лица, появленіемъ на кожѣ, особенно на конечностяхъ, красной сыпи, иногда кашлемъ и т. д. Въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ давать: *Белладонна* 3 и *Арсеникъ* 3 поперемѣнно, черезъ часъ по 5 капель. При кашлѣ: *Фосфоръ* 3, черезъ 2 часа по 5 капель. При вздутіи живота и урчаніи въ немъ: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3 и *Карбо вегетабилисъ* 6, по 5 капель черезъ 1—2 часа. При прекращеніи мочеотдѣленія: *Кантарисъ* 3, каждые 2 часа по 5 капель. Д-ръ Герингъ совѣтовалъ въ началѣ приступа холеры дать одинъ пріемъ

Сульфуръ 6, а затѣмъ приступить къ дальнѣйшему лѣченію, какъ сказано выше.

Холерина.

Признаки: Заболѣваніе холериною очень схоже съ настоящею азіатскою холерою, но въ большинствѣ случаевъ отсутствуютъ судороги и прекращеніе мочеотдѣленія.

Лѣченіе: *Ипекакуана* 3 и *Арсеникъ* 3 или *Вератрумъ* 3 попеременно, черезъ одинъ часъ по 5 капель въ отварной водѣ или по 5 крупинокъ на пріемъ. Согрѣтыя полотенца или фланель на животъ и желудокъ.

Діэта: Слизистые отвары, рисовая или зельтерская вода.

Холера дѣтская.

Въ большихъ городахъ болѣзнь эта появляется часто эпидемически.

Признаки: Всякая пища извергается рвотою, при чемъ молоко въ видѣ комковъ творогу; желудокъ вздутъ, большая жажда; лицо очень блѣдное; глаза вваливаются и бываютъ окружены синевою; похолодѣніе членовъ; ребенокъ притягиваетъ ножки къ животу и корчится отъ боли; поносъ, при которомъ испражненія представляются сначала водянистыми и разъѣдающими задній проходъ, затѣмъ зеленоватыми и, наконецъ, слизистыми, быстрое исхуданіе съ полнымъ упадкомъ силъ; спячка; судороги. Смерть можетъ наступить даже черезъ 24 часа.

Вспомогательныя мѣры. Прежде всего нужно регулировать діэту. Молока не давать никакого, а равно никакихъ слизистыхъ или крахмальныхъ отваровъ. Какъ питательное средство, заготовить питье: 1 яичный бѣлокъ размѣшать въ стаканѣ отварной воды, прибавить для вкуса кусокъ сахара и 20 капель хорошаго коньяку и давать ре-

бенку съ чайной ложечки какъ можно чаще Это утоляетъ жажду и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ прекраснымъ питательнымъ средствомъ. Давать пить только холоднымъ и ничего горячаго.

Воспрещены: Подслащенная вода, фруктовые соки, бульоны и т. п. Наложить на животъ и желудокъ компрессъ, смоченный въ горячемъ красномъ винѣ. Въ случаѣ крайняго упадка силъ даютъ ребенку ежечасно по ложечкѣ шампанскаго или 1/2 ложечки хорошей настоящей мадеры или какого-нибудь крѣпкаго вина; ложечка хорошаго чернаго кофе, съ прибавленіемъ къ нему нѣсколькихъ капель рому или стараго коньяку, согрѣваетъ желудокъ и возстановляетъ нѣсколько упадокъ силъ.

Лѣченіе: Сначала нѣсколько пріемовъ по 2 капли *Аконита* 3 поперемѣнно съ *Ипекакуана* 3. Если эти средства не остановятъ дальнѣйшаго развитія болѣзни, то давать *Ипекакуана* 3 поперемѣнно съ *Арсеникъ* 6. Если болѣзнь затягивается и предыдущія средства не останавливаютъ поноса, то давать *Ацидумъ фосфорикумъ* 3, по 2 капли, и жидкую микстурку, приготовленную изъ миндальнаго масла (одну драхму миндальнаго масла, полдрахмы вишневаго клея и четыре унціи воды), къ которой прибавить 10 капель *Арсеникумъ* 6 и давать по чайной ложечкѣ, поперемѣнно, черезъ 1/4 часа до прекращенія поноса. Въ случаѣ появленія вслѣдствіе этой болѣзни головной водянки, слѣдуетъ давать *Цинкумъ оксидатумъ* 3 поперемѣнно съ *Фосфоромъ* 3 или *Геллеборусъ* 3, по 1—2 капли въ ложечкѣ отварной воды.

Хрипота.

Катарръ гортани, голосовыхъ связокъ.

Причины: Простуда, дифтерія, крупъ, корь и т. д. Если хрипота происходитъ вслѣдствіе тяжкой болѣзни гортани (бугорчатки, рака и т. п.), то необходимо обратиться къ врачу, подъ руководствомъ котораго и лѣчить ее.

Вспомогательныя мѣры: Согрѣвающіе компрессы; холодныя обмыванія; запретить громко говорить, пѣть и т. п.;

чистый, влажный, умѣренно-теплый воздухъ въ жиломъ помѣщеніи и спальнѣ; зимою поставить въ душникъ печки сосудъ съ водою, къ которой можно прибавить нѣсколько капель *Іодіумъ* Θ. Пульверизація горла растворомъ 20 капель *Аммоніумъ карбоникумъ*×2 или *Креозота*×2 въ стаканѣ воды. По утрамъ пить въ теченіе долгаго времени по стакану *Эмсъ Кренхенъ* пополамъ съ горячимъ молокомъ.

Лѣченіе: 1) При хрипотѣ вслѣдствіе простуды (катаррѣ гортани): *Арумъ трифиллумъ* 3 и *Гепаръ* 3, черезъ 2 часа попеременно.—2) При параличѣ голосовыхъ связокъ и полной потерѣ голоса: *Каустикумъ* 3 и *Фосфоръ* 3.—) При боли въ горлѣ и хрипотѣ: *Белладонна* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, черезъ 2 часа попеременно, и полоскать горло растворомъ *Фитолакка глицерина* (1 чайную ложку на ½ стакана воды).—4) При насморкѣ, чувствѣ садненія и першенія въ области гортани: *Гепаръ* 3 и *Пульсатилла* 3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ и по 5 капель.—5) При кашлѣ со щекотаніемъ въ горлѣ: *Калькареа іодата* 6 и *Белладонна* 3, черезъ 2 часа по 3 капли.—6) При хрипотѣ у лицъ, которыя постоянно должны громко говорить: *Арника*×3 и *Фосфоръ* 6, а также *Бромъ* 2. Если же голосъ внезапно то понижается, то повышается, а также при скопленіи слизи въ горлѣ: *Аммоніумъ карбоникумъ* 3 и *Гепаръ* 3.—7) При охриплости послѣ кори: *Карбо вегетабилисъ* 3.—8) Послѣ крупа: *Спонгія* 3.—9) Послѣ коклюша: *Дрозера* 3.—10) Послѣ дифтерита: *Бромъ* 3 и *Фосфоръ* 3.—11) При длительной хрипотѣ: *Румексъ* 6, *Фосфоръ* 30; *Калькареа сульфурика* 6, попеременно съ *Кали хлоратумъ*×6.

Цынга. Скорбутъ.

Болѣзнь крови, разстройство и упадокъ питанія.

Признаки: Красноватыя, опухшія, рыхлыя десны. Края десенъ вздуты и кровоточивы. На зубахъ скопляется гноевидная зловонная масса. Нарывы на деснахъ, которые ихъ разрушаютъ. Усиленное слюноотдѣленіе. Зловонный запахъ изо рта. Отсутствіе аппетита. Боль зубовъ и горла.—Синія

пятна по кожѣ. Боли въ мышцахъ, невозможность движеній. Тяжкія осложненія со стороны внутреннихъ органовъ.

Вспомогательныя мѣры: Діэта: пища должа состоять изъ кислой капусты, шпината, картофеля, салатовъ; особенно рекомендуются лимоны, клюква, кислыя яблоки, апельсины, мандарины и т. п., также молоко, ячменный отваръ, яблочный мусъ. Теплая, сухая квартира. Полосканіе рта растворомъ бертолетовой соли (1 чайную ложечку на стаканъ воды). Десны смазывать настойкой корня ратаніи.

Лѣченіе: 1) *Кали хлорикумъ* 3, 2 раза въ день по костяной ложечкѣ.—2) Если болѣзнь запущена — *Меркуріусъ коррозивусъ* 3 и *Ацидумъ нитрикумъ* 1, по два раза въ день по 3 капли.—3) Если затронута кость—*Силицеа* 6, утромъ и вечеромъ по 5 капель.

Чахотка легочная.

Болѣзнь заразительная, вызывается особыми микроорганизмами—туберкулезнымп палочками (бациллы Коха).

Причины: Золотуха, блѣдная немочь, плевритъ, воспаленіе легкихъ, тифъ, корь, роды и т. д.; пребываніе въ пыльныхъ фабричныхъ помѣщеніяхъ; распутный образъ жизни; тѣлесное переутомленіе; дурная, нездоровая пища; сырость въ спальнѣ и жиломъ помѣщеніи; простуда; запущенные катарры дыхательныхъ путей; наслѣдственность; весьма часто зараженіе отъ пребыванія и сообщенія съ чахоточными или вслѣдствіе ношенія платья лицъ, умершихъ отъ чахотки.

Признаки: Длительный, сухой кашель, со щекотаніемъ въ гортани; влажные хрипы въ верхушкахъ легкихъ; частое кровотеченіе изъ носа; исхуданіе; потеря аппетита; по вечерамъ легкая лихорадка; сердцебіеніе; колотье въ груди и между лопатками; гнойная мокрота, которая, будучи выплюнута въ воду, погружается на дно сосуда; изнурительные ночные поты; поносы; отекъ ногъ; затрудненное дыханіе; одышка; безсонница, вслѣдствіе постоянныхъ позывовъ на кашель; часто появляется кровохарканіе. Болѣзнь эта

можетъ имѣть быстрое теченіе (галопирующая или скоротечная чахотка) или продолжаться годами.

Предохранительныя мѣры: Нѣжныхъ, слабосложенныхъ, малокровныхъ дѣтей, имѣющихъ склонность къ чахоткѣ, не слѣдуетъ отягощать школьною работою; они должны пребывать какъ можно болѣе на открытомъ воздухѣ; ихъ слѣдуетъ пріучать къ дыханію полною грудью (глубокому вдыханію); комнатная (не утомляющая) гимнастика, путешествія, купанья, холодныя обтиранія. Никогда не запускать кашля. Въ видахъ предохраненія себя отъ зараженія, наблюдать за тѣмъ, чтобы чахоточные всегда отхаркивали мокроту въ сосудъ съ водою, который нужно ежедневно промывать кипяткомъ, а затѣмъ растворомъ марганцово-кислаго кали. Избѣгать сообщенія съ чахоточными. Постельное и носильное бѣлье, одежда и проч., принадлежавшія до того чахоточнымъ, должны быть тщательно дезинфецированы или лучше совсѣмъ уничтожены. Жилыя комнаты или спальни, въ которыхъ пребываютъ чахоточные, должны быть часто провѣтриваемы, и потому доступъ свѣжаго воздуха долженъ быть къ нимъ свободный.

Вспомогательныя мѣры: Какъ только появляются симптомы, дающіе подозрѣнія о началѣ развитія чахотки, то необходимо ихъ немедленно удалить, такъ какъ вполнѣ развившаяся чахотка рѣдко излѣчивается. Въ виду этого слѣдуетъ утромъ и вечеромъ въ теченіе продолжительнаго времени принимать по ложечкѣ *неочищеннаго трескового жира*. Пища должна быть укрѣпляющая, но вмѣстѣ съ тѣмъ удобоваримая; вегетаріанскій режимъ бываетъ чрезвычайно полезенъ. *Молоко*, если оно только переносится, нужно употреблять въ возможно большемъ количествѣ (пить всегда маленькими глотками); всего лучше пить свѣже-прокипяченное молоко или въ видѣ *кефира*, а еще лучше, гдѣ возможно, *кумысъ*. Свѣжій воздухъ въ жилыхъ комнатахъ, а въ особенности въ спальнѣ. Никоимъ образомъ не ходить въ тѣ мѣста, гдѣ дымъ, пыль, газъ или испорченный воздухъ. Ежедневно гулять въ лѣсу или по полямъ, при чемъ дѣлать *глубокія вдыханія* свѣжаго воздуха. Упражняться съ приборомъ, развивающимъ грудную клѣтку (по указанію

врача). Ежедневныя обмыванія верхней части тѣла съ послѣдующимъ его растираніемъ. Зимою еженедѣльно ходить въ баню или брать теплыя ванны, а лѣтомъ почаще купаться въ рѣкѣ, но купанье не должно продолжаться болѣе 3—5 минутъ. Избѣгать тщательно простуды. Носить Егеровское шерстяное нижнее бѣлье. Обращать особенное вниманіе, чтобы ноги содержались въ теплѣ. Дезинфецировать (обеззараживать) спальню марганцово-кислымъ кали (чайную ложку на тарелку воды и ставить на окнахъ и въ углахъ комнаты). Запрещаются: танцы, возбуждающія, утомительныя удовольствія, тяжелая работа, куреніе табаку, водка, ликеры, но разрѣшается пить баварское пиво или мальцъэкстрактъ, хорошее вино.

Лѣченіе: 1) При сухомъ кашлѣ, раздраженіи въ гортани, легкомъ потѣніи, золотухѣ: *Калькареа карбоника* 30, утромъ и вечеромъ, въ теченіе 14 дней, а затѣмъ перерывъ (пауза) въ теченіе 8 дней.—2) При сухомъ кашлѣ, съ припадками, похожими на коклюшъ, опухоли железъ, значительномъ исхуданіи: *Іодіумъ* 3, 3 раза въ день по 5 капель.—3) При сухомъ, судорожномъ кашлѣ, начинающемся очень рано по утрамъ, съ отдѣленіемъ бѣлковидной мокроты, сердцебіеніи, колотіи въ боку: *Кали карбоникумъ* 12, черезъ 2 часа по 5 капель.—4) При чувствѣ раздраженія и царапанія въ гортани, жженіи и царапаніи въ груди, сухомъ кашлѣ, дрожаніи послѣ каждаго приступа кашля, непроизвольномъ испусканіи мочи, отдѣленіи сладковатой или солоноватой мокроты, которая содержитъ въ себѣ слѣды крови: *Фосфоръ* 6, по два пріема въ день по 5 капель.—5) При частомъ, короткомъ покашливаніи, съ отдѣленіемъ значительнаго количества мокроты, у золотушныхъ или страдающихъ кожными болѣзнями: *Сульфуръ* 6.—6) При кашлѣ съ очень обильнымъ отдѣленіемъ мокроты: *Силицея* 6 или *Станнумъ* 6, три раза въ день.—7) При сильномъ исхуданіи, безпрестанной лихорадкѣ, одышкѣ: *Арсеникъ* 3 или *Арсеникумъ іодатумъ* 3, одно или поперемѣнно съ *Калькареа фосфорика* 3.—8) Женщинамъ, которыя вмѣстѣ съ чахоткою страдаютъ маточными болѣзнями: *Сепія* 6.—9) Въ новѣйшее время совѣтуютъ противъ чахотки: *Бальзамумъ перувіанумъ*

1—3 десятичнаго дѣленія, принимать въ теченіе продолжительнаго времени. Кромѣ того полезны бываютъ: *Креозотъ* 3, *Фелландріумъ аквatикумъ* 3, а въ начальномъ періодѣ *Калькареа фосфорика* 3, два раза въ день по ложечкѣ. Наконецъ, *Туберкулинъ* 30, по одному пріему (2—3 крупинки) утромъ натощакъ, черезъ каждые три дня, оказался очень благотворнымъ средствомъ.

1) **При раздражительномъ кашлѣ:** 1) При неудержимомъ кашлѣ со щекотаніемъ и раздраженіемъ въ горлѣ: *Дрозера* 6.—2) При ночномъ кашлѣ: *Гіосціамусъ* 1.—3) При кашлѣ, вызываемомъ разговоромъ: *Коніумъ* 6.—4) При щекотаніи въ шейной ямочкѣ: *Силицеа* 6.

2) **При легочномъ кровотеченіи:** 1) При кашлѣ съ отдѣленіемъ кровянистой мокроты или крови: *Акалифа индика* 3, по 3 раза въ день по 5 капель.—2) Если кровотеченія изъ легкихъ весьма обильны: *Ипекакуана* 3 и *Гамамелисъ*×2, черезъ 10 минутъ по 5 капель.—3) При кровохарканіи: *Миллефоліумъ* 3 и *Фосфоръ* 6, по 3—4 раза въ день по 5 капель.—4) Въ хроническихъ случаяхъ: *Фосфоръ* 6. Весьма полезнымъ средствомъ считается также *экстрактъ Гамамелисъ*, который дается при кровотеченіяхъ по 10—15 капель на пріемъ.

3) **При поносѣ:** 1) При испражненіяхъ, имѣющихъ гнилой запахъ: *Арсеникумъ* 6 попеременно съ *Хина* 3.—2) При безболѣзненныхъ ночныхъ поносахъ: *Ацидумъ фосфорикумъ* 3.—3) При туберкулезныхъ язвахъ кишекъ: *Гепаръ* 3, *Калькареа фосфорика* 3, черезъ день, 3 раза въ день по костяной ложечкѣ.

4) **При лихорадкѣ:** *Баптизія* 1 попеременно съ *Арсеникъ* 3.

5) **При сильныхъ потахъ:** *Пилокарпинъ* 6 или *Самбукусъ* 6.

Чесотка.

Накожная болѣзнь, вызываемая особаго рода паразитами—чесоточными клещами, прорѣзающими подъ кожей ходы.

Причины: Зараженіе, т.-е., переносъ чесоточнаго клеща на здороваго; неопрятность.

Признаки: Узелки, пузырьки, пустулы (прыщики), вызывающіе сильный зудъ и помѣщающіеся между пальцами, на кистевомъ, локтевомъ и колѣнномъ суставахъ, въ пахахъ, на животѣ; теплота (т.-е. теплая одежда, теплыя одѣяла въ постели и т. п.) усиливаетъ зудъ.

Лѣченіе: Чрезвычайная чистота носильнаго и постельнаго бѣлья; въ пораженныя чесоткою (чесоточнымъ клещомъ), мѣста тщательно втирать мазь изъ *Меркуріусъ коррозивусъ*×2, 10 капель на 2 столовыхъ ложки вазелина, оставить такъ въ теченіе 25 минутъ и затѣмъ промыть очень теплою (на сколько можно выдержать) водою. Кромѣ того, вечеромъ, передъ сномъ, втирать въ эти мѣста мазь съ *перуанскимъ бальзамомъ* или *сѣрную мазь* (1 часть сѣрнаго цвѣта на 8 частей сала). Необходимо ежедневно по утрамъ надѣвать чистое бѣлье. Два раза въ недѣлю *теплыя ванны* съ предварительными втираніями въ пораженныя мѣста вышеупомянутой мази изъ *Меркуріусъ коррозивусъ*×2 или вмѣсто ваннъ обмываніе означенныхъ частей тѣла теплою мыльною водою.

Внутрь: *Сульфуръ* 2 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ день, утромъ и вечеромъ по костяной ложечкѣ.

Чирей и карбункулъ (огневикъ).

Воспаленіе подкожной клѣтчатки, ограниченное, съ образованіемъ стержня изъ омертвѣвшей клѣтчатки.

Причины: Простуда; недостаточно чистое содержаніе тѣла (кожи); жирная пища; неправильный образъ жизни; худосочіе.

Признаки: Чирей обыкновенно начинается въ видѣ маленькаго, краснаго, болѣзненнаго бугорка, который постепенно и довольно быстро увеличивается и заостряется. На вершинѣ его появляется бѣлая точка, принимающая далѣе форму желтоватаго пузырька, который на 4—5 день созрѣваетъ и прорывается; изъ него выходитъ маленькій стер-

жень. Величина чирья можетъ быть иногда очень значительна. Весьма часто вслѣдъ за первымъ чирьемъ образуются новые и т. д.

Лѣченіе: Теплыя припарки изъ льняного сѣмени или овсяной крупы или изъ размоченной въ тепломъ молокѣ булки отнимаютъ боль и способствуютъ скорѣйшему созрѣванію нарыва. По вскрытіи чирья, слѣдуетъ промыть образовавшуюся язву растворомъ Календулы и положить компрессъ, смоченный въ Белладонномъ маслѣ.

Лѣченіе: 1) Прежде всего *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3, попеременно, черезъ 1/2 часа по 5 капель.—2) Если болѣзненный процессъ продолжается: *Белладонна* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3 внутрь и *растворъ Белладонны* наружно.—3) Если чирей сильно увеличивается и становится все болѣе и болѣе болѣзненнымъ, то *Силицеа* 6 и теплыя припарки.—4) При чрезмѣрной чувствительности и сѣро-свинцовомъ цвѣтѣ нарыва: *Ляхезисъ* 6.—5) При частыхъ возвратахъ чирьевъ: *Сульфуръ* 3, 2 раза въ день по 3 капли; принимать мѣсяца два. Если нарывъ становится багровымъ (красносинимъ) и вскрывается во многихъ мѣстахъ, при чемъ появляется лихорадка, а самъ гнойникъ поражается гангреной, съ выдѣленіемъ изъ него омертвѣлой тканевой массы и образованіемъ глубокой, гноящейся язвы, которая трудно заживаетъ, — то заболѣваніе это называется карбункуломъ и должно быть лѣчимо лишь врачемъ.

Карбункулъ или злокачественный чирей, обыкновенно сопровождаемый лихорадкою, сильными болями и угрожающею гангреною, нужно лѣчить частыми пріемами *Арсеникъ* 6 и *Гепаръ* 6, попеременно, черезъ 1/2 часа по 5 капель, или *Ляхезисъ* 6 и *Гепаръ* 6. Карбункулъ въ особенности опасенъ у пожилыхъ людей, когда онъ появляется на затылкѣ или на спинѣ. Мягкая медовая лепешка служитъ хорошимъ мягчительнымъ и очищающимъ средствомъ, а равно предохраняетъ отъ омертвѣнія и поддерживаетъ дѣйствіе *Арсеника*. Если послѣ вскрытія нарыва края его красны, воспалены и опухши, то, кромѣ *Арсеника*, нужно давать еще *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3 поочередно, черезъ 2 часа по

5 капель. Когда боли жгучія, колющія, почти невыносимыя, то *Тарантула* 12, черезъ 2 часа по 5 капель.

Чума.

Находя необходимымъ сообщить краткія свѣдѣнія объ этой ужасной повальной болѣзни, мы предупреждаемъ, что только врачъ можетъ поставить распознаваніе и вести лѣченіе.

Общее тяжелое заболѣваніе всего организма съ крайне высокой температурой тѣла и потерей сознанія.

Вызывается особого рода микроорганизмами — чумными бациллами (палочками).

Болѣзнь собственно крысъ и на людей переносится блохами.

Предохранительныя мѣры. Уничтоженіе крысъ и блохъ въ домахъ. Величайшая чистоплотность и опрятность—тѣла, бѣлья, постельныхъ принадлежностей, жилищъ. Хорошее питаніе. Свѣжій воздухъ. Освѣженіе его ароматическими куреніями. Натираніе тѣла ароматическими маслами.

Форма болѣзни и припадки. Жаръ, бредъ, безпамятство. Воспаленія легкихъ—*легочная* форма чумы. Воспаленіе лимфатическихъ железъ (подъ мышками, въ пахахъ и др.), бубоны,—*бубонная* чума. Воспаленія внутреннихъ органовъ. Упадокъ силъ и дѣятельности сердца, параличъ сердца. Кризисъ въ болѣзни проявляется обильнымъ выдѣленіемъ пота, явленіе благопріятное, позволяющее надѣяться что больной выздоровѣетъ.

Лѣченіе: Предохранительнымъ и излѣчивающимъ средствомъ является *Арсеникъ*. Какъ предохранительное отъ заболѣванія, утромъ и вечеромъ по 5 капель *Арсеникъ* 3. При заболѣваніи принимать возможно чаще *Арсеникъ* 6 по 5 капель. Какъ питье, попеременно *Русъ*×3 и *Бріонія*×3, по 30 капель на стаканъ, попивать глотками по очереди.

При нагноеніи бубоновъ давать *Аписъ* 3, *Меркур. солюб.* 6, попеременно. Въ бубоны втирать *Аписное* масло; вскрыв-

шійся бубонъ промывать растворомъ *Календулы*, 1 чайную ложку тинктуры на стаканъ воды, и покрывать компрессами изъ *Белладоннаго* масла.

При явленіяхъ отравленія крови: *Ляхезисъ* 6, три раза въ день по 2 капли.

Язвы на деснахъ.

Вздутая, сначала красная, а потомъ желтоватая опухоль на деснахъ вблизи больного зуба, которая размягчается, а затѣмъ лопается и отдѣляетъ гной. Этотъ процессъ легко возобновляется при каждой простудѣ. Слѣдуетъ удалять зубъ или давать *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, черезъ 2 часа по костяной ложечкѣ. Въ хроническихъ случаяхъ *Сульфуръ* 6 попеременно съ *Силицеа* 6, черезъ день.

Язвы языка, изъязвленіе языка.

При образованіи узловатостей на языкѣ необходимо немедленно обратиться къ врачу. *Раковыя язвы* должны быть своевременно оперированы. Ракъ языка помѣщается обыкновенно сбоку языка, въ видѣ одного или нѣсколькихъ узловъ, быстро изъязвляющихся. Образовавшіяся язвы очень скоро увеличиваются, имѣютъ твердое дно и изрытые края. Подчелюстныя железы припухаютъ.

Лѣченіе: 1) При отвердѣніяхъ, узловатостяхъ и язвахъ давать вначалѣ: *Белладонна* 3 и *Аписъ* 3, по два раза въ день по 5 капель *).—2) При сильномъ расширеніи венъ: *Гамамелисъ* 3 и *Семпервивумъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.—3) При сифилитическихъ язвахъ: *Меркуріусъ бііодатусъ*×3, *Ацидумъ нитрикумъ* 3 и *Мезереумъ* 3, по 2 раза въ день.—4) При раковидныхъ язвахъ: *Коніумъ* 3, *Арсеникъ* 3, по 2 раза въ день по 5 капель.

*) Медъ снаружи, на язвы языка, очень распространенное народное средство.

Языка воспаленіе. Глосситъ.

Большею частью на сифилитической или туберкулезной почвѣ.

а) Скоротечное воспаленіе характеризуется быстро развивающеюся краснотою и опухолью языка; при этомъ слизистая оболочка языка бываетъ покрыта грязнымъ налетомъ, либо корками и трещинами; появляется зловонное слюнотеченіе; сильныя боли, простирающіяся до ушей; невозможность жевать и глотать.

Лѣченіе: 1) *Белладонна* 3 поперемѣнно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, или *Аконитъ* 3 поперемѣнно съ *Аписъ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель и по костяной ложечкѣ.— 2) При воспаленіи мышцы языка: *Аписъ* 3; если же оно происходитъ отъ пораненія языка: *Арника* 3.—3) При ущемленіи языка: *Коніумъ* 3.—4) При ожогѣ языка: *Кантарисъ* 3.—5) При воспаленіи языка вслѣдствіе ртутнаго лѣченія: *Ацидумъ нитрикумъ* 3.—6) Если угрожаетъ нагноеніе: *Гепаръ сульфурисъ* 3, для предупрежденія, а позже *Силицеа* 6.

б) Длительное воспаленіе языка: неповоротливость языка при разговорѣ и глотаніи, при чемъ боли рѣдко появляются. Если края языка упираются въ неровные острые зубы или куски и корни испорченныхъ зубовъ, трутся объ нихъ, то слѣдуетъ зубы подпилить или удалить, такъ какъ въ противномъ случаѣ могутъ образоваться раковыя изъязвленія.

Лѣченіе: *Аписъ* 3, *Коніумъ* 3, *Силицеа* 6, *Фосфоръ* 3.

Яичекъ воспаленіе. Орхитъ.

Причины: Простуда, ударъ, давленіе и всякое механическое поврежденіе; болѣзни половыхъ органовъ; чаще всего, какъ осложненіе перелоя.

Признаки: Опухоль яичекъ, сильныя тянущія боли, простирающіяся къ нижней части живота; опухоль въ боль-

шинствѣ случаевъ разсасывается, но можетъ осложниться водянкою яичка.

Лѣченіе: При остромъ воспаленіи яичекъ больной долженъ спокойно лежать въ постели; подъ мошонки слѣдуетъ подложить подушечки. Потомъ носить въ теченіе долгаго времени суспензорій и стараться предохранять яички отъ давленія. Если болѣзнь произошла отъ толчка, удара и проч., то можно прикладывать *компрессы изъ раствора Арники* (1 чайную ложку тинктуры на стаканъ холодной воды).

Внутрь: 1) Сначала *Белладонна* 3, попеременно съ *Меркуріусъ солюбилисъ* 6, каждые $1^1/_2$—2 часа по 5 капель.—2) Если болѣзнь произошла отъ механическихъ причинъ (удара, толчка и т. п.): *Арника* 3, попеременно съ *Белладонна* 3.—3) При воспаленіи яичекъ вслѣдствіе слизетеченія изъ мочеиспускательнаго канала (триппера): *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, *Пульсатилла* 3, *Кантарисъ* 3, *Меркуріусъ іодатусъ руберъ* 3.—4) Вслѣдствіе свинки: *Русъ* 3 и *Меркуріусъ солюбилисъ* 3, каждые 2 часа попеременно.—5) При лишаяхъ и сыпяхъ: *Аурумъ муріатикумъ* 3, *Ацидумъ нитрикумъ* 3.—7) При гангренѣ яичекъ: *Арсеникъ* 6.—8) При хронической опухоли и отвердѣніи яичекъ: *Аурумъ* 6, *Силицея* 6, *Клематисъ* 3.—9) При водянкѣ яичекъ: *Кали іодатумъ* 2, *Силицея* 6.—Во всѣхъ случаяхъ давать лѣкарства черезъ 1—2 часа по 5 капель.

Ячмень.

Маленькій нарывчикъ на краю вѣкъ, вслѣдствіе воспаленія сальной железки.

Лѣченіе: Наружно: Компрессы изъ раствора 5 капель *Меркуріусъ коррозивусъ* × 3 въ рюмочкѣ отварной воды.

Внутрь: 1) Если ячмень начинаетъ лишь образовываться: *Пульсатилла* 3.—2) Для ускоренія созрѣванія: *Гепаръ сульфурисъ*×3.—3) Если остаются утолщенія, сопровождаемыя истеченіемъ слизи: *Стафизагрія* 3, *Графитъ* 6, *Калькареа карбоника* 6.—4) Противъ возвратовъ ячменя

Сульфуръ 6, *Калькареа карбоника* 6.—Лѣкарства давать въ острыхъ случаяхъ черезъ 1—2 часа по 5 капель или по костяной ложечкѣ; а въ хроническихъ—утромъ и вечеромъ.

Эклампсія.

Эклампсія у родильницъ встрѣчается въ послѣдніе мѣсяцы беременности, иногда и во время родовъ.

Лѣченіе: При появленіи у беременныхъ въ мочѣ бѣлка и отековъ, нужно давать *Цепа* 2, три раза въ день по 10 капель; а если отъ этого средства не послѣдуетъ быстраго улучшенія, то *Ацидумъ бензоикумъ* 2. — При приступахъ эклампсіи, соединенныхъ съ приливомъ крови къ головѣ и краснотою лица: *Белладонна* 3, черезъ 1/2 часа по 5 капель. При слабости и спячкѣ послѣ приступа: *Арсеникъ* 3, раза 4 въ день по 5 капель.

Экзема. См. сыпи.

Эмфизема или расширеніе легкихъ.

Причины: Длительныя, часто повторяющіяся, чрезмѣрныя напряженія дыхательныхъ органовъ; у дѣтей отъ коклюша, а у взрослыхъ, вслѣдствіе запущенныхъ болѣзней, сопровождаемыхъ кашлемъ. Болѣзнь эта состоитъ въ расширеніи легочныхъ пузырьковъ.

Признаки: Легочная эмфизема развивается медленно. Грудная клѣтка расширена; появляется постоянная одышка, такъ что больные должны отъ времени до времени останавливаться для того, чтобы запастись воздухомъ; голосъ большею частью нечистъ; кашель почти всегда сухой, а при совмѣстномъ бронхіальномъ катаррѣ—мокротный; бываютъ также приступы одышки или астмы, при чемъ развивается слабость, вялость, упадокъ силъ, разстройство пищеваренія. Впослѣдствіи къ этому присоединяется худоба и водянка, начинающаяся съ ногъ.

Лѣченіе: Больной долженъ избѣгать простуды, а потому не выходить во время сырой, туманной погоды; носить шерстяную рубашку и содержать ноги въ теплѣ. Вдыхать слабый водный растворъ соли или, размѣшавши чайную ложку сосноваго экстракта въ стаканѣ кипящей воды, вдыхать выдѣляемые изъ него пары. Пребываніе въ хвойномъ лѣсу или въ горной мѣстности, или на берегу моря. Благотворно дѣйствуетъ лѣченіе сжатымъ воздухомъ, при чемъ воздушный насосъ доставляетъ легкимъ много богатаго кислородомъ воздуха, а также лѣченіе съ помощью Френкелевскаго прибора. Теплыя ванны; холодныя обмыванія тѣла; легочная гимнастика; чистый, свѣжій воздухъ въ жилыхъ комнатахъ и спальнѣ; пульверизація *Лѣсною водою.*

Діэта: Пища должна быть питательная и удобоваримая. Вечеромъ не ѣсть тяжелыхъ кушаній, пироговъ, копченаго мяса, картофеля и т. п.

Внутрь: 1) При одышкѣ, съ пилящими и хрипящими шумами въ груди и прикашлѣ, не прекращающемся ни днемъ, ни ночью: *Нафталинъ*×2, черезъ каждые три часа по костяной ложечкѣ, принимать въ теченіе 8 дней и затѣмъ дѣлать перерывъ; но какъ только прекращается улучшеніе, то возобновить пріемы этого средства.—2) При потрясающемъ кашлѣ, появляющемся преимущественно вечеромъ и ночью и ухудшающемся отъ ѣды, питья, лежанія, холода и сопровождающемся чувствомъ страха, одышкою: *Арсеникумъ* 3 и *Гіосціамусъ* 1, черезъ 2 часа по 5 капель.—3) При сухомъ кашлѣ, возбуждаемомъ щекотаніемъ въ верхней части дыхательнаго горла и который будитъ по утрамъ: *Аралія рацемоза* 3 и *Белладонна* 3, по 2 раза въ день по 5 капель или 5 крупинокъ.—4) При застоѣ въ системѣ воротной вены: *Ликоподіумъ* 30.—5) При эмфиземѣ у стариковъ: *Фосфоръ* 6, *Карбо вегетабилисъ* 3.—6) При водяночныхъ опухоляхъ: *Арсеникумъ* 3, *Кали карбоникумъ* 3, *Аписъ* 3, по 3 раза въ день по 5 капель. Иногда при водянкѣ прекрасно помогаетъ *Гелеборусъ* 3, по 5 капель 3 раза въ день.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ.

Задушеніе парами, испареніями, зловредными газами, чадомъ и т. п.

Пострадавшаго слѣдуетъ немедленно вынести на свѣжій воздухъ и, уложивъ его въ постель, заняться удаленіемъ изъ его тѣла зловредныхъ газовъ, посредствомъ надавливанія снизу вверхъ на грудь и сверху внизъ на животъ, а также вызвать (искусственное) дыханіе. При этомъ холодные компрессы на голову, поливаніе груди и всего тѣла холодною водою, растираніе лица, висковъ и груди уксусомъ или водкою, клистиры изъ холодной воды съ уксусомъ. Если бы, несмотря на это, признаки жизни не появлялись, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ болѣе возбуждающимъ средствамъ. Когда же замѣтны будутъ признаки возвращенія къ жизни и больной начнетъ глотать, то, продолжая принимать всѣ прежнія мѣры, дать ему выпить воды съ виномъ, чаю, кофе и т. п.

Кровотеченіе изъ ранъ.

При кровотеченіи зажать рану пальцемъ или какимъ нибудь инымъ предметомъ (твердымъ шарикомъ, свернутою въ клубокъ корпіею и т. п.). При сильныхъ, опасныхъ кровотеченіяхъ, напримѣръ, отъ глубокаго разрѣза, туго пере-

тянуть мѣсто выше кровоточащей раны косынкою, полотенцемъ, платкомъ, можно также наложить бинтъ и ниже раны, и послать немедленно за врачемъ. Внутрь давать *Арника* 3 и *Гамамелисъ*×3, черезъ 5—10 минутъ по 3 капли, а затѣмъ рѣже.

Мнимая смерть замерзшихъ.

(Отмороженіе, озноблeнія).

Нужно быть весьма осторожнымъ при раздѣваніи замерзшаго, послѣ чего потомъ оттирать его нѣкоторое время снѣгомъ и уложить въ комнатѣ, температура которой не должна превышать 10—12°. Затѣмъ давать нюхать сильно пахучія средства (нюхательную соль, нашатырный спиртъ и т. п.); дѣлать тепловатые клистиры, тепловатыя ручныя и ножныя ванны и тщательно растирать тѣло снѣгомъ. Когда больной придетъ въ себя и будетъ въ состояніи глотать, то дать ему выпить чашку чернаго кофе или чаю, или ложку вина. Такъ какъ иногда удается привести къ жизни замерзшаго лишь послѣ 10—12 часовъ, то не слѣдуетъ рано оставлять попытокъ къ его оживленію. Когда тѣло станетъ гибкимъ и пройдутъ всѣ признаки окоченѣнія, больного можно перенести въ теплую комнату, положить его въ постель и покрыть шерстяными одѣялами; можно также дать ему теплую ванну.

Болѣзненныя озноблeнія смазываются *мазью изъ Абротанумъ* или *Календулы*. Если образовавшіеся отъ озноблинъ волдыри лопнутъ, то ихъ слѣдуетъ обвязать полотняною тряпочкою, смазанною *свѣжимъ бычачьимъ саломъ* или *миндальнымъ масломъ*, смѣшаннымъ съ *тинктурою Гамамелисъ* (1 : 8 ч.). Прикладываніе *Тимоловой мази* оказалось равнымъ образомъ очень полезнымъ.

Мнимая смерть новорожденныхъ.

Передъ самою перевязкою пуповины, мать должна сдѣлать нѣсколько глубокихъ вдыханій или, если это не поможетъ,

то погрузить младенца по шею въ горячую (36° R.) воду, или же приводить къ жизни младенца слѣдующимъ способомъ: послѣ перевязки пуповины берутъ его обѣими руками такимъ образомъ, чтобы спинка лежала на одной рукѣ, причемъ шейка помѣщается между большимъ и указательнымъ пальцами, а бедра его находились въ другой рукѣ. Затѣмъ поднимаютъ одну руку (вмѣстѣ съ лежащимъ на ней ребенкомъ) и опускаютъ другую такъ, чтобы головка младенца была выше его ногъ, а туловище его образовало съ горизонтальною линіею уголъ приблизительно въ 45 градусовъ; потомъ опускаютъ внизъ голову, а ноги поднимаютъ на ту высоту, на которой до того находилась голова, и повторяютъ эти движенія черезъ 3—4 секунды. Въ большинствѣ случаевъ дыханіе появляется уже черезъ 5—6 минутъ.

Болѣе взрослыхъ дѣтей слѣдуетъ прикрѣпить къ доскѣ, положить на бревно или что-либо другое подходящее, чтобы можно было производить съ нимъ такія же движенія вверхъ и внизъ, какъ сказано выше.

Мнимая смерть утопленниковъ.

Никогда не слѣдуетъ помѣщать утопленника головою внизъ. Прежде всего очистить ротъ и носъ отъ слизи, ила, грязи, песку и другихъ веществъ, попавшихъ вмѣстѣ съ водою. Положить его на скамейку или на землю лицомъ внизъ, возбуждать чиханіе нюхательными средствами, производить щекотаніе зѣва, растирать тѣло и поставить клистиръ изъ тепловатой воды съ уксусомъ и т. д. Затѣмъ укладываютъ паціента въ постель, даютъ ему какое-нибудь возбуждающее средство и продолжаютъ сильно растирать тѣло шершавыми полотенцами. По возвращеніи сознанія, утопленника сажаютъ въ ванну и продолжаютъ въ ней растирать его, послѣ чего завертываютъ въ шерстяныя одѣяла и опять укладываютъ въ постель.

Мнимая смерть повѣшенныхъ.

Прежде всего слѣдуетъ быстро, но осторожно разрѣзать веревку, на которой виситъ повѣшенный, затѣмъ освободить его отъ петли и положить на спину такъ, чтобы голова и грудь были выше другихъ частей тѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно опрыскивать лицо его холодною водою, положить холодные компрессы на голову, растирать подошвы и икры щетками. Если лицо повѣшеннаго или задушеннаго красно, вздуто, глаза его выпучены, то, кромѣ холодныхъ компрессовъ на голову, слѣдуетъ поставить клистиръ съ уксусомъ или солью.

Постороннее тѣло, попавшее въ дыхательное горло, носъ, ухо и т. п.

Если что-либо застряло въ дыхательномъ горлѣ, то заставить подавившагося нагнуться впередъ и ударять плоскою рукою между лопатками; даютъ втягивать нюхательный табакъ въ носъ и возбуждаютъ чиханіе, посредствомъ щекотанія перомъ; посредствомъ щекотанія глотки, стараются вызвать рвоту; поливаютъ подавившемуся спину холодною водою. Если не удастся такимъ образомъ удалить предметъ изъ дыхательнаго горла, то необходимо произвести горлосѣченіе (врачемъ), которое вполнѣ безопасно.

Если дитя засунуло себѣ въ носъ горошину, бобъ или что-либо другое, то, раньше всякихъ другихъ попытокъ извлеченія, нужно впрыскивать въ ухо посредствомъ ушной или любой другой спринцовки тепловатую воду, которая и выталкиваетъ застрявшее постороннее тѣло. Если это не приведетъ къ цѣли, то нужно постараться извлечь этотъ предметъ посредствомъ щипчиковъ; или загнуть дамскую шпильку на верхнемъ концѣ, т.-е., тамъ, гдѣ проволока образуетъ загибъ, такъ, чтобы образовался нѣсколько ниже его тупой уголъ; оба острыхъ конца шпильки вставляютъ

въ пробку; затѣмъ крючокъ этотъ осторожно вводятъ такъ, чтобы онъ попалъ позади предмета, и извлекаютъ его наружу; или заставляютъ ребенка глубоко вдыхать, закрывши ему плотно ротъ, для того, чтобы онъ могъ дышать только носомъ: вслѣдствіе чего, отъ напора воздуха во время выдыханія, предметъ можетъ выскочить. Вставить въ свободную ноздрю трубочку, которая плотно приставала бы къ стѣнамъ отверстія, и сильно дуютъ въ нее. Можно также посредствомъ нюхательнаго табаку или щекотанія носа бородкою пера вызвать чиханіе. Если бы все это не помогало, то обратиться къ врачу.

Если насѣкомое попало въ ухо, то вливаютъ въ него нѣсколько капель оливковаго масла и затѣмъ удаляютъ изъ уха насѣкомое посредствомъ вышеуказанныхъ способовъ. Въ случаѣ болей: *Арника* 3 или *Пульсатилла* 3; если бы боли были соединены съ воспаленіемъ уха, то *Белладонна* 3 поперемѣнно съ однимъ изъ указанныхъ средствъ. Если бы что-либо застряло въ зѣвѣ, глоткѣ, то ударяютъ подавившагося между лопатками. Нажавши на языкъ ручкою ложки, стараются извлечь застрявшій предметъ пальцами. Щекотать въ зѣвѣ бородкою пера. Если же предметъ глубоко застрялъ въ горлѣ, то стараются его протолкнуть въ желудокъ; для этого пить воду или растопленное масло и проталкиваютъ предметъ механически гладкимъ деревяннымъ или металлическимъ прутикомъ. Можно также достигнуть того же посредствомъ губки, смазанной оливковымъ масломъ и прикрѣпленной на длинной крѣпкой ниткѣ. Все это слѣдуетъ дѣлать осторожно, не употребляя усилій при проталкиваніи предмета.

Если бы застряла въ горлѣ кость, то ее долженъ удалить врачъ. (Совѣтуютъ проглотить сырое яйцо). Остроконечные предметы, какъ, напр., рыбьи кости, иглы и т. п., не слѣдуетъ вынимать силою пальцами, а нужно проглотить кусокъ грубо разжеваннаго хлѣба, или винную ягоду, или же сушеный черносливъ, а если въ горлѣ застряли маленькіе острые предметы (осколокъ стекла, косточка), то съ цѣлью ихъ удаленія слѣдуетъ глотать шарики изъ мягкаго воска, величиною въ ружейную пулю, смоченные предва-

рительно въ меду. Ихъ можно постараться вытащить петлею, сдѣланною изъ проволоки.

Въ случаѣ, если въ желудокъ или кишку попадаютъ твердые непереваримые предметы, то слѣдуетъ употреблять въ пищу лишь слизистыя кушанья и картофель и не ѣсть ничего горячительнаго, раздражающаго, кислаго. При запорѣ можно ѣсть масло и ставить клистиры изъ теплой воды (26—30° Реом.) или молока. Вмѣстѣ съ тѣмъ растирать животъ; массажъ, въ видѣ разминанія живота, лежаніе на животѣ, умѣренныя движенія; если же проглоченные предметы застрянутъ въ заднемъ проходѣ, то ставить клистиры изъ льняного или оливковаго масла или же изъ молока.

Яды и лѣченіе отравленій *).

Общія замѣчанія. Ядомъ называется всякое химическое вещество; которое при дѣйствіи на организмъ способно причинить серьезный вредъ здоровью или смерть. Цѣль лѣченія сводится къ удаленію яда изъ организма, нейтрализаціи его и къ лѣченію явленій отравленія.

I. Удаленіе яда въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ введенъ чрезъ желудокъ, лучше всего достигается опорожненіемъ желудка, слѣдовательно рвотой и прополаскиваніемъ желудка и кишекъ. Рвоту возбуждаютъ раздраженіемъ корня языка, назначеніемъ теплой мыльной воды, рвотнаго корня (15—20 гр.), рвотнаго камня (1—2 гр.), мѣднаго или цинковаго купороса (3—5 гр.). Принято за правило при отравленіи металлическими ядами назначать рвотный корень, а при отравленіи органическими ядами,—мѣдь и цинкъ. Примѣненіе рвотныхъ требуетъ осторожности, такъ какъ они сильно угнетаютъ нервные центры. Рвоту поддерживаютъ раздраженіемъ неба, наклоненіемъ туловища впередъ и крѣпкимъ поглаживаніемъ подреберій отъ боковъ къ срединѣ, назначеніемъ большихъ количествъ молока, взбитаго бѣлка и т. д. Для промыванія

*) Извлеченіе изъ Календаря для Врачей.

желудка пользуются желудочнымъ зондомъ, состоящимъ изъ каучуковой трубки 8 миллиметровъ ширины и 2 метровъ длины, при чемъ одинъ конецъ трубки закругленъ осторожнымъ обжиганіемъ въ пламени. Смазанный масломъ закругленный конецъ вводится въ глотку и въ желудокъ. Насадивъ воронку, пропускаютъ черезъ нее до $^1/_2$ литра тепловатой воды, затѣмъ быстро опускаютъ ее, пока въ ней еще есть вода, и, перевертывая воронку, даютъ вылиться водѣ въ особый сосудъ. Болѣе одного литра воды заразъ вливать не слѣдуетъ. Промываніе повторяютъ нѣсколькоразъ. Надо помнить, однако, что при отравленіи концентрированными минеральными кислотами и ѣдкими щелочами прополаскиваніе желудка и рвотныя почти безусловно противопоказуются. Но однимъ опорожненіемъ желудка нельзя ограничиться, такъ какъ часть яда могла поступить уже въ кишечный каналъ, а потому немедленно же необходимо позаботиться и объ опорожненіи кишекъ. Съ этой цѣлью предпочтительнѣе прибѣгать къ клистирамъ.

II. **Нейтрализація яда.** Кромѣ удаленія яда изъ организма путемъ опорожненія желудка и кишекъ, необходимо, тамъ, гдѣ это возможно, нейтрализовать ядовитое вещество, т.-е., дать противоядіе. Для того, чтобы помѣшать мѣстному ѣдкому или раздражающему дѣйствію ядовитыхъ веществъ, назначаютъ такъ называемыя обволакивающія: слизистые отвары (льняное сѣмя, салепъ), воду съ бѣлкомъ, эмульсіи, молоко, растительныя масла, крахмалъ, мѣлъ, известь, мелкоистолченный уголь и т. п.

III. **Лѣченіе явленій отравленія** сводится почти всецѣло къ симптоматическимъ пособіямъ, и потому общихъ правилъ нельзя установить. Главная задача—или поддержать угасающую дѣятельность сердца и дыханія, или уменьшить повышенную раздражительность нервной системы.

Азотная кислота (Acidum nitricum), см. сѣрная кислота.

Азотнокислое серебро (Argentum nitricum). *Ляписъ*. Дать внутрь ложку поваренной соли въ стаканѣ воды; просоленый бѣлокъ; молоко, эмульсія; куски льда, клизма изъ молока и поваренной соли; ледъ на желудокъ: камфора, кофе при угнетеніи.

Аконитъ (Aconit). Промываніе желудка, поддерживаніе рвоты слизистыми или мясляными напитками или сѣрнокислымъ цинкомъ; антидотъ—tinct. digitalis по 15—30 капель; для поднятія пульса tinct. Nuc. vom. по 5—10 капель. Согрѣваніе конечностей, растираніе тѣла.

Алкоголь. Чистый воздухъ, ледъ на голову и въ клизмѣ, горячее растираніе кожи, въ крайности рвотное изъ 10 гранъ Ипекакуаны. Пить содовую или сельтерскую воду. Вдыханіе кислорода. Tinct. Nucis vom. 1 до 5 и болѣе капель. При хроническомъ отравленіи симптоматическое лѣченіе.

Алюминій. (Калійные квасцы, Alumen crudum). Мыльная вода, молоко, толченый мѣлъ, щелочи. Припадочное лѣченіе.

Амміакъ. При проглатываніи растворовъ амміака—разведенныя кислоты и уксусъ съ водою. Глотать кусочки льда. Обливаніе спины холодною водою. Горчичникъ на животъ. При отравленіи амміачными парами—вдыханіе горячихъ водяныхъ и уксусныхъ паровъ. Молоко, масляныя эмульсіи, овсянка.

Белладонна. Дурманъ, Бѣлена.—Удаленіе яда и орошеніе кишечника; возбуждающія (кофе, вино, холодныя обливанія головы, горчичники къ икрамъ, клизмы).

Бертолетова соль. Промываніе желудка, впрыскиваніе подъ кожу раствора поваренной соли; пилокарпинъ.

Болиголовъ (Conium). Удаленіе яда промываніемъ желудка или рвотными, искусственное дыханіе и возбуждающія (кофе и кофеинъ). При цикутѣ—апоморфинъ подкожно; отъ судорогъ—хлоралъ гидратъ, вдыханіе хлороформа или эфира.

Бромъ и его соединенія. Промываніе желудка; внутрь крахмальный клейстеръ, растворы бѣлковъ; щелочи.

Бѣлена (Hoyscyamus), см. Белладонна.

Вератринъ. Рвотное изъ цинковаго купороса. Промываніе желудка. Вяжущія (таннинъ, дубовая кора, чай, кофе), опій; іодъ и іодистый калій. Liq. ammonii anis., по 10—15 капель въ слизистомъ отварѣ черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа. Сода, теплое питье.

Геллеборизмъ, см. Чемерица.

Гельземинъ, см. Жасминъ желтый.

Гіосціамусъ, см. Белладонна.

Грибной ядъ (mycetismus). Отравленіе ядовитыми и загнившими съѣдобными грибами. Удаленіе ядовитой пищи промываніемъ желудка, рвотными и слабительными. При отравленіи мухоморомъ—подкожно атропинъ, исключая случаевъ съ сильнымъ возбужденіемъ, гдѣ, равно какъ при поносахъ, умѣстны опій и морфій. При упадкѣ силъ—спиртные напитки, эфиръ, кофе. При бредѣ—холодъ на голову; при сильной рвотѣ—ледъ и кокаинъ; при асфиксіи—вливаніе раствора поваренной соли. Клизмы изъ хлоралгидрата. Нельзя давать уксуса.

Дигиталинъ, см. Наперстянка.

Дурманъ-сѣмя (Datura), см. Белладонна.

Жасминъ желтый (Gelseminum). Искусственное дыханіе, возбуждающія средства, опорожненіе желудка.

Желѣзо (чаще желѣзный купоросъ и хлористое желѣзо). Морфій и Ol. Ricini. Пить много молока и бѣлковыхъ растворовъ. Какъ противоядіе—углекислая магнезія, сода и сахарнокислая известь.

Змѣиный ядъ. Въ Европѣ ядовиты слѣдующія змѣи: гадюка обыкновенная, рыжеватая и черноватая, кавказская куфія или щито-мордникъ, казюлька. Для удаленія и разрушенія яда—кровотеченія изъ раны, насѣчки, кровососныя банки; обмываніе раны, особенно спиртными жидкостями, выдавливаніе, высасываніе (небезопасно для высасывающаго); иссѣченіе укушеннаго мѣста или отнятіе мелкихъ членовъ (пальцевъ); выжиганіе каленымъ желѣзомъ и порохомъ, прижиганіе ѣдкимъ кали, хромовою и азотною кислотами, но эти вещества разрушаютъ и живую ткань. Въ качествѣ противоядія змѣиному яду впрыскиваютъ въ рану и подъ кожу возлѣ нея 1—2% растворъ марганцовокислаго калія, а еще лучше свѣже-процѣженный 2% растворъ хлорной извести (20—30 куб. с.). Послѣ выжиганія или впрыскиванія извести лигатуру снимаютъ. Для укрѣпленія силъ даютъ больному нѣсколько стакановъ глинтвейна и закутываютъ его въ теплыя одѣяла, чтобы вызвать потъ. Симптоматическое лѣченіе.

Іодъ и его соединенія. Крахмальный или мучной клейстеръ, молоко, яичный бѣлокъ, при одновременномъ промываніи желудка; жженая магнезія съ водой (1 : 8) пить по рюмкѣ.

Кали ѣдкое, см. Щелочи ѣдкія.

Калій азотнокислый, см. Селитра.

Калабарскій бобъ. Рвотныя и промываніе желудка. Какъ химическое противоядіе, можно испробовать іодистый калій, осаждающій растворъ физостигмина даже при сильномъ разведеніи (1 : 2500). Искусственное дыханіе. Возбуждающія.

Кальцій (жженая или ѣдкая известь, известковое молоко). Поддерживаніе рвоты; жирныя масла, молоко и бѣлокъ. Въ видѣ противоядія разведенныя растительныя кислоты, а также сахарный сиропъ для образованія сахарно-кислой извести.

Каломель, см. Ртуть.

Камфора. Промываніе желудка, рвотныя; растираніе тѣла; тепло къ конечностямъ; то холодные, то горячіе души на грудную клѣтку. Избѣгать масляныхъ веществъ и спиртныхъ напитковъ.

Кантарисъ. (Воспрещается употребленіе жирныхъ и эфирныхъ маселъ, способствующихъ всасыванію). Удаленіе яда при жидкихъ препаратахъ (Tinctura или Collodium Cantharid.)—желудочнымъ насосомъ, при отравленіи порошкомъ—рвотныя (апоморфинъ), такъ какъ порошокъ крѣпко пристаетъ къ слизистой оболочкѣ; для удаленія изъ кишекъ—клистиры, впрыскиваніе глицерина (мушки находятъ въ изверженіяхъ даже на 4 день послѣ отравленія); противъ болей Tinct. Opii s. по 10 капель черезъ $^1/_2$ часа въ слизистомъ отварѣ, клистиры изъ опія; при боляхъ въ мочевыхъ путяхъ—кровососныя банки къ области почекъ, горячія ванны или полуванны, теплыя впрыскиванія въ пузырь; при упадкѣ силъ эфиръ и камфора подкожно. Если развились альбуминурія и воспаленіе почекъ, нужно вводить много жидкости (сахарной воды, сельтерской воды, или слизистыхъ отваровъ); противъ цистита—салолъ.

Карболовая кислота. При отравленіи чрезъ ротъ—промываніе желудка водою или уксусомъ пополамъ съ водою, обволакивающія средства (бѣлковая вода, миндальное или оливковое масло, молоко, слизистое питье), кусочки льда; известковая вода. Химическое противоядіе—Calcarea saccharata и другіе препараты извести. Для приготовленія известковаго сахара 15 ч. гашеной извести смѣшиваютъ съ 2 ч. сахара и водою до 1000 ч. Растворъ этотъ содержитъ 0,5% водной

окиси кальція. Искусственное дыханіе, вдыханіе кислорода и подкожныя впрыскиванія эфира. Для связыванія фенола даютъ и сѣрнокислый натръ.

Квасцы, см. Алюминій.

Керосинъ, см. Углеводороды.

Кислоты, см. названіе ихъ.

Клещевинныя и кротоновыя сѣмена. Промываніе желудка, обволакивающія (масла, бѣлокъ, молоко), теплыя ванны и компрессы, возбуждающія (подъ кожу эфиръ; внутрь вино). Избѣгать амміачныхъ препаратовъ, помогающихъ образованію кротоновой кислоты.

Кобальтовыя соли. Отваръ крахмала изъ 4—5 грм. Kali sulfurati; уксусъ съ водою и сахаромъ.

Кокаинъ. Удаленіе яда, послѣ чего для связыванія оставшагося даютъ таннинъ вмѣстѣ съ углекислымъ или уксуснокислымъ натромъ (иначе дубильнокислый кокаинъ растворится въ соляной кислотѣ).

Кокуллусъ, см. Пикротоксинъ.

Колбасный ядъ, см. Пищевыя вещества.

Колоквинтъ. (Fructus colocynthidis, горькая тыква). Промываніе желудка. Маслянистыя или слизистыя микстуры съ опіемъ или морфіемъ. Согрѣвающіе компрессы на животъ. При обильныхъ поносахъ и судорогахъ въ икрахъ, вливаніе 6—7% раствора поваренной соли, съ добавленіемъ къ нему при упадкѣ силъ спирта (1 : 100).

Кольхикумъ (безвременникъ, Colhicum autumnale). Промываніе желудка, каломель, Ol. Ricini. Дубильная кислота даетъ съ кольхициномъ нерастворимый осадокъ. Для клистировъ таннинъ 1 : 3000 воды. Опій.

Коніумъ, см. Болиголовъ.

Конопля индійская (Cannabis indica). Рвотное—теплый растворъ поваренной соли. Теплыя ванны, немного хлоралъ гидрата, чтобы ускорить наступленіе сна.

Креозотъ и гваяколъ. Промываніе желудка, рвотныя; бѣлковыя вещества (взбитые бѣлки, молоко). Позднѣе возбуждающія средства. Можно испытать сѣрнокислый натръ.

Кротоновое масло, см. Клещевинныя сѣмена.

Кротонъ хлоралъ—анэстезирующее. Лѣченіе см. Хлороформъ.

Крѣпкая водка, см. Азотная кислота.

Кубеба, см. Перецъ.

Кукольванъ, см. Пикротоксинъ.

Купоросное масло, см. Азотная кислота.

Кураре. Южно-американскій стрѣльный ядъ. Искусственное дыханіе; 20 гранъ Zinc. sulf. въ 4 унціяхъ воды, столовыми ложками до рвоты, которую поддерживаютъ льнянымъ отваромъ. Какъ противоядіе, чайными ложками растворъ таннина (1 : 8), галлусовая кислота, іодъ. Въ легкихъ случаяхъ—возбуждающія средства (кофеинъ, амміачныя соли, спиртъ). Холодъ на голову и спину. Горчичники на животъ. Клизма изъ оливковаго масла.

Ластовичная трава, см. Чистотѣлъ.

Лукъ морской, см. Сцилла.

Ляписъ, см. Азотнокислое серебро.

Майскіе жучки, см. Кантарисъ.

Метиловый спиртъ, см. Алкоголь.

Минный газъ, см. Окись углерода.

Молочай. Опорожненіе желудка, ледъ, слизистыя вещества: возбуждающія.

Морфій (и Опій). Промываніе желудка и кишекъ; рвотныя (сѣрнокислый цинкъ, мѣдь или ипекакуана) вмѣстѣ съ горчичниками на область желудка, раздраженіемъ кожи и холодными обливаніями головы. Съ цѣлью связать оставшійся еще морфій даютъ животный уголь. Больного можно удержать отъ сна впрыскиваніями холодной воды въ носъ и въ ротъ. Въ болѣе легкихъ случаяхъ помогаетъ кофе, неусиливающій, подобно спиртнымъ напиткамъ, коматознаго состоянія. При наступленіи комы—искусственное дыханіе, сильныя раздраженія кожи и возбуждающія средства; если дыханіе и кровообращеніе сильно угнетены, нужно впрыснуть нѣсколько миллигрм. сѣрнокислаго атропина (мѣриломъ служитъ наступленіе ровнаго дыханія) или стрихнинъ. Wood назначаетъ поперемѣнно то и другое средство. Избѣгать кислотъ.

Мускаринъ, см. Грибной ядъ.

Мушки шпанскія, см. Кантарисъ.

Мышьякъ (Acid. arsenicosum) и его соединенія. Промываніе желудка, рвотное изъ 20 гранъ ипекакуаны, если нужно. Поддерживаніе рвоты теплымъ молокомъ или смѣсью молока со сбитымъ яичнымъ бѣлкомъ. Внутрь послѣ рвоты „противоядіе мышьяка“ (по новой фармакопеѣ: Rp. Ferri sulf. oxyd. solut. 8 ч., Magnes. ustae 3 ч., Aq. 60 ч.; прописывается просто Antidotum arsenici) каждыя 5 минутъ по ложечкѣ, до прекращенія рвоты, или по разсчету (каждая столовая ложка нейтрализуетъ около 1 грана мышьяковистой кислоты); противоядіе ставятъ въ ледяную воду. Можно давать жженую магнезію, размѣшавъ ее съ 20-кратнымъ количествомъ воды, въ молочную жидкость: даютъ ее, нагрѣтую, по 3—5 столовыхъ ложекъ каждыя 5—10 минутъ. Пить много молока съ бѣлкомъ или съ известковою водою. Возбуждающія. Избѣгать кисловатыхъ напитковъ, углекислыхъ щелочей и нашатыря.

Мѣдныя соединенія. Рвотныя. Рвота поддерживается молокомъ съ яичнымъ бѣлкомъ, взбитымъ въ пѣну; промываніе желудка водою съ прибавленіемъ желѣзисто-синеродистаго калія, который превращаетъ мѣдь въ нерастворимую соль. Въ качествѣ противоядія даютъ кашицу изъ 7 драхмъ Ferri hydrogenio reducti, 4 драхмы сѣрнаго цвѣта и воды—внутрь по столовой ложкѣ, сильно взбалтывая, или сахарный сиропъ съ жженою магнезіею; животный уголь. Избѣгать маслянистаго и кислаго.

Наперстянка (Digitalis purp.). Спиртные напитки, нитроглицеринъ по 2—10 капель 1% раствора. Если есть рвота, обильное питье должно быть запрещено. Больной во все время долженъ спокойно лежать въ постели въ виду возможности обмороковъ.

Нашатырный спиртъ, см. Амміакъ.

Нефть, см. Углеводороды.

Никотинъ, см. Табакъ.

Нитроглицеринъ (Glonoin). Промываніе желудка, отваръ льняного сѣмени, пить много воды; на голову—холодъ. Черный кофе, спорынья. Свѣжій воздухъ, искусственное

дыханіе; втиранія горчичнаго спирта. Иногда—кровопусканіе, возбуждающія.

Окись углерода (угарный, свѣтильный и минный газы). Свѣжій воздухъ, оживляющія средства, холодныя обливанія головы, согрѣваніе тѣла, искусственное дыханіе. Крѣпкій черный кофе и вливаніе поваренной соли подъ кожу. Нитроглицеринъ (2—10 кап. 1% раств.).

Олово (Stannum). Рвотное изъ ипекакуаны и поддержаніе рвоты молокомъ. Жженая магнезія съ молокомъ. Ледъ. Клизма изъ молока съ опіемъ. Наркотическія втиранія въ кожу живота.

Омегъ пятнистый, см. Болиголовъ.

Опій, см. Морфій.

Острая водка, см. Соляная кислота.

Пасленовыя растенія (Dulcamara). Удаленіе яда промываніемъ желудка и орошеніями кишечника. Химическое противоядіе—танинъ. При преобладаніи кишечныхъ явленій—препараты опія, азотно-кислый висмутъ.

Перецъ и *кубеба* (Piper nigrum et cubeba). Причины отравленія — эфирныя масла, а въ перцѣ — смола хавицинъ. Промываніе желудка; апоморфинъ подкожно; ледъ внутрь.

Пикриновая кислота. Промываніе желудка; внутрь молочный сахаръ въ большихъ количествахъ (1/4—1/2 ф. въ день), растворъ двууглекислаго калія (1 : 24), черезъ 1/2 часа, Ol. Ricini.

Пикротоксинъ (кукольванъ). Рвотное изъ 1,25 цинковаго купороса въ 120,0 воды, черезъ 5 минутъ по столовой ложкѣ до появленія рвоты, которую поддерживаютъ отваромъ льняного сѣмени. Клизма съ уксусомъ. Противъ судорогъ внутрь или въ видѣ клизмы хлоралъ. Тепло на животъ и холодъ на голову.

Пилокарпинъ. Противоядіемъ считается атропинъ подкожно изъ раствора 1 : 100 около 20 капель или гоматропинъ (Fronmüller).

Пирогалловая кислота и *пирогаллолъ.* Вдыханіе кислорода, подкожныя впрыскиванія эфира и въ видѣ противо-

ядія—сѣрнокислый натръ. Горчичники на животъ. Чай съ ромомъ или черный кофе.

Пищевыя вещества (животнаго происхожденія). Различаютъ пять формъ отравленія, zootrophoxismus: 1) *gastricus* 2) *typhoides*, 3) *tropeinicus*, 4) *paralyticus* и 5) *exanthematicus*.— *1-я* самая частая, вслѣдствіе употребленія испорченнаго мяса вызывающаго воспаленіе желудка и кишекъ (гнойное воспаленіе серозныхъ оболочекъ). Отравленіе можетъ наступить также послѣ употребленія внутренностей животнаго (печень), мяса птицъ или рыбъ (домашняя холера), ракушекъ, гарнелей, копченаго мяса животныхъ, птицъ и рыбъ, а также испорченнаго куринаго бѣлка. Холероподобные припадки могутъ наступить послѣ употребленія молока, выдѣляемаго коровами за три дня до отела и въ первые дни послѣ отела и больными коровами (воспаленіе вымени, гнилостно-гнойные процессы, сибирская язва) и вообще испортившагося молока, съ которымъ въ кишечникъ вносятся микрофиты, синяго молока и молока коровъ, кормленныхъ водочной бардой. *2-я форма* наблюдается при отравленіи мясомъ больныхъ животныхъ, особенно телятъ, одержимыхъ воспаленіемъ пупочныхъ венъ, а также послѣ употребленія ядовитыхъ сыровъ и устрицъ; похожа на брюшной тифъ. Послѣ гастрическихъ явленій появляется бредъ, оцѣпенѣлость, буроватый налетъ на языкѣ, кашель съ кровавой мокротой, носовыя кровотеченія. *3-я форма* обнимаетъ отравленіе колбасой, особенно кровяной и ливерной, соленой рыбой (осетриной, стерлядью, бѣлугой) и животныхъ консервовъ (маринованной рыбой, долго стоявшаго жаркаго), а иногда наблюдается послѣ употребленія ядовитыхъ сыровъ. *4-я параличная форма* вызывается употребленіемъ ракушекъ, въ коихъ особый алкалоидъ (метилотоксинъ), и тропическихъ рыбъ изъ рода tetrodon, у которыхъ во внутренностяхъ развивается особый ядъ (фугинъ). Наступаетъ общій параличъ, заканчивающійся смертью черезъ нѣсколько часовъ. Изъ припадковъ отмѣтимъ психическое возбужденіе и родъ опьянѣнія, головокруженіе и шатаніе, тошноту, рвоту, охлажденіе тѣла, расширеніе и неподвижность зрачковъ, одышку; сознаніе сохраняется. *5-я высыпная форма* развивается чаще всего послѣ употребленія испор-

ченной рыбы, слизняковъ, устрицъ, раковъ и гарнелей, и выражается внезапнымъ появленіемъ на кожѣ красноты или скарлатиноподобной сыпи.

Лѣченіе: Промываніе желудка, рвотныя и слабительныя; какъ antisepticum—резорцинъ, салолъ; при боляхъ въ животѣ, тепло-влажные компрессы, при рвотѣ—ледъ, при упадкѣ силъ—возбуждающія; при zootr. tropeinicus—хорошее питаніе и укрѣпляющія (хинная корка, хининъ); при язвахъ въ полости рта и горла—полосканія изъ настойки Catechu 1 : 100 ч. воды, при запорахъ—промыванія кишки или слабительныя (карлсбадская соль). При параличной формѣ—немедленное назначеніе рвотныхъ, проносныхъ и мускуса.

Плавиковая кислота, см. Фтористоводородная кислота.

Плевелъ, см. Куколь.

Поташъ, см. Щелочи углекислыя.

Птомаины, см. Пищевыя вещества.

Рвотный камень, см. Сурьма.

Рвотный корень (Rad. Ipecacuanhae). Промываніе желудка, глотать ледъ, сельтерская вода, танинъ и содержащія его вещества.

Рожки, см. Спорынья.

Ртуть. Молоко, бѣлковый растворъ; какъ противоядіе, рекомендуютъ свѣже осажденное сѣрнистое желѣзо, жженую магнезію, желѣзныя опилки, древесный уголь.

Рыбный ядъ, см. Пищевыя вещества.

Салициловая кислота и ея соли. Потогонныя (пилокарпинъ, пуншъ). Для уменьшенія раздраженія почекъ—углекислыя и двууглекислыя щелочи.

Салолъ. Слабительныя и промываніе кишекъ. Потогонныя.

Сантонинъ. Удаленіе яда изъ желудка и кишекъ и непремѣнно слабительное (дѣтямъ каломель съ ялаппой 0,05 : 0,1—0,3. При судорогахъ полезенъ хлоралъ или эфиръ, а при спячкѣ—холодныя обливанія въ теплой ваннѣ и искусственное дыханіе.

Свинцовыя соли (свинцовый уксусъ, сахаръ, краски и бѣлила). Рвотное изъ ипекакуаны, затѣмъ 10% водный растворъ сѣрнокислаго натра и магнезіи съ прибавленіемъ взбитаго яичнаго бѣлка или молока. Промывательное изъ

этихъ солей и клещевиннаго масла. При сильной колике молоко, масляныя средства внутрь и въ клистире. Прованское масло, даваемое по 1—2 стакана въ сутки въ теченіе 4—8 дней, прекращаетъ боли, улучшаетъ сонъ, аппетитъ и состояніе нервной системы.

Свѣтильный газъ, см. Окись углерода.

Селитра калійная. Поддержаніе рвоты и промываніе желудка (рвотныя опасны въ виду слабости сердца). Если рвота очень сильна, можно назначить кусочки льда, слизистое питье съ опіемъ и припарки на животъ. Для поднятія дѣятельности сердца—крѣпкое вино.

Серебро, см. Азотнокислое серебро.

Синильная кислота и ея соли (также горькій миндаль, вода и масло горькихъ миндалей, персиковыя и вишневыя наливки). Рвотное изъ 20 гранъ ипекакуаны; если возможно, промываніе желудка жидкостью, содержащею перекись водорода и марганцовокислый калій (0,3%). Холодныя обливанія головы и позвоночника въ теплой ваннѣ. Искусственное дыханіе.

Синій купоросъ, см. Мѣдныя соединенія.

Сода, см. Щелочи углекислыя.

Соляная кислота, см. Сѣрная кислота.

Спирты, см. Алкоголь.

Спорынья и ея препараты. При остромъ отравленіи—промываніе желудка или рвотное (ипекакуана) и поддерживаніе ея льнянымъ отваромъ; слабительныя, позднѣе—вяжущія (таннинъ). Растворъ камфоры въ эфирѣ (0,6 : 15,0) по 20 капель на сахарѣ съ ромашкою, теплыя ванны. Салициловый натръ (4,0 : 100,0 воды), салолъ. При комѣ — возбуждающія (вино, кофе, уксусный эфиръ, растворъ камфоры въ эфирѣ (0,6 : 15,0) по 20 капель).

Стрихнинъ и препараты чилибухи (Nux vomica). Въ тяжелыхъ случаяхъ—совмѣстное примѣненіе хлороформа до наркоза и хлоралъ подкожно или въ клизмахъ по 1,0—1,5, а потомъ внутрь 1,0—2,5; въ общемъ довольно 4,0. Временемъ наркоза или сна пользуются для того, чтобы примѣнить желудочный зондъ или рвотныя. Если послѣ приступа судорогъ дыханіе прекратилось, — искусственное дыханіе.

Больной долженъ быть защищенъ отъ шума. Избѣгать уксуса и кофе.

Сулема, см. Ртуть.

Сурьма (рвотный винный камень можетъ вызвать отравленіе уже въ дозѣ 0,5—1,0). Поддержаніе рвоты и промываніе желудка и кишечника. Отваръ дубовой коры или таннинъ; черный кофе. Яичный бѣлокъ. Содовые порошки и кусочки льда. Обволакивающія.

Сырный ядъ, см. Пищевыя вещества.

Сѣра. Слабительныя или же средства, примѣняемыя при отравленіи сѣроводородомъ или сѣрными щелочами.

Сѣрная кислота. Обильное введеніе жидкости съ примѣсью бѣлка или масла. Мыло, известь, исключая солей, богатыхъ углекислотой. Не давать рвотныхъ. Возбуждающія средства. Лѣченіе болей въ желудкѣ (ледъ внутрь и снаружи на животъ).

Табакъ (алкалоидъ никотинъ, въ дыму и сокѣ—коллидинъ, пиридиновыя основанія, маслянистое ядовитое вещество, синильная кислота, окись углерода и пр.). Рвотное изъ ипекакуаны; таннинъ въ водѣ, слизистое питье или молоко; смѣсь перекиси водорода съ водою (2:100) по чайной ложкѣ или разведенная хлорная вода (1:3) съ отваромъ льняного сѣмени, растворъ іода въ іодистомъ кали, холодныя обливанія.

Трихинозное мясо. Если въ желудкѣ еще не переварено мясо, то рвотное; затѣмъ—каломель или ялаппа съ каломелемъ; поваренной соли нѣсколько столовыхъ ложекъ, одну за другой черезъ $^1/_4$ часа. Останавливать поносъ не слѣдуетъ. Ol. Terebinth. малыми, частыми дозами, сантонинъ.

Трупный ядъ. При пораненіи руки тотчасъ перетянуть туго конечность выше раны, затѣмъ тщательно обмыть и сдѣлать энергическое прижиганіе ляписомъ, кислотой, ѣдкой щелочью, карболовой кислотой, іодомъ и т. п.

Углеводороды (болотный газъ, парафины, нефть, керосинъ, бензинъ). Удаленіе больного изъ вредной атмосферы. Искусственное дыханіе и возбуждающія. При внутреннемъ отравленіи—опорожненіе желудка и кишекъ.

Углекислота можетъ вызвать явленія задушенія при содержаніи ея въ воздухѣ свыше 5%. Явленія и лѣченіе, см. Окись углерода.

Уксусная кислота. Магнезія съ большимъ количествомъ воды или мыльная вода. Противъ наружныхъ ожоговъ—обмываніе щелочными растворами.

Укушеніе бѣшеными животными. Тотчасъ послѣ укушенія пострадавшій долженъ самъ высосать рану (когда нѣтъ во рту и на губахъ ссадинъ) и перетянуть членъ выше раны, какъ можно туже, чѣмъ попало, выжать крови сколько можно, и затѣмъ глубоко прижечь рану раскаленнымъ желѣзомъ (хотя гвоздемъ, ключемъ) или ѣдкимъ кали или хотя ляписомъ, но какъ можно глубже. На мѣстахъ, недоступныхъ перетягиванію, слѣдуетъ накинуть кровососную банку или просто рюмку или стаканъ (надъ зажженной бумагой) и потомъ прижечь. Рану не заживлять.

Фосфоръ. Ядовитъ только желтый или кристаллическій фосфоръ. Смертельная доза=0,05. Промываніе желудка 0,1—0,3% воднымъ растворомъ марганцовокислаго калія (Antal). Апоморфинъ подъ кожу и рвотное изъ 4—8 гранъ Cupr. sulf. или изъ ипекакуаны и въ большомъ количествѣ отвара льняного сѣмени. Неочищенное терпентинное масло по 1,0—2,0 нѣсколько разъ въ день въ капсюляхъ или въ слизистой жидкости. Вливаніе щелочнаго раствора поваренной соли со скипидаромъ (Robert). Избѣгать жирныхъ маслъ и молока.

Хлоралъ гидратъ. Промываніе желудка теплою (40,5° Ц.) водою; отравленныхъ согрѣвать всѣми средствами; искусственное дыханіе.

Хлороформъ. При внутреннемъ отравленіи—промываніе желудка и кишекъ (можно спасти человѣка даже послѣ употребленія 60—120 грм.) и рвотныя (сѣрнокислый цинкъ и рвотный корень). Послѣ этого искусственное дыханіе и возбуждающія средства. Для раздраженія кожи—опрыскиваніе лица и груди холодною водою (химическихъ раздражителей избѣгать), растираніе щетками. Возбуждающія средства (эфиръ, вино). Чистый воздухъ, кусокъ льда въ rectum. Горчичники на затылокъ. Нѣсколько капель эфира на брюшные

покровы вызываетъ вдыхательныя движенія (Halls). Вдыханіе амилъ нитрита (Hill), расширяющаго мозговые сосуды.

Хромовая кислота (также хромовокислые кали и свинецъ). 30,0 Ferri pulverati съ 180,0 сахарнаго сиропа, по столовой ложкѣ; углекислая магнезія; уксуснокислый свинецъ (0,05 pro dosi), а также растворъ 15,0 соды въ 360,0 молока. Послѣ примѣненія противоядія слѣдуетъ произвести промываніе желудка.

Царская водка, см. Азотная кислота.

Цинковый или *бѣлый купоросъ* и *хлористый цинкъ* дѣйствуютъ, какъ всѣ сильные металлическіе яды. Поддержаніе рвоты тепловатою водою или молокомъ, таннинъ, молоко съ яичнымъ бѣлкомъ.

Цитварное сѣмя, см. Сантонинъ.

Ціанистыя соединенія, см. Синильная кислота.

Чемерица бѣлая, см. Вератринъ.

Черемица черная (Helleborus niger, viridis, foetidus). Промываніе желудка и кишекъ; апоморфинъ: вливаніе поваренной соли.

Чилибуха (Nux vomica), см. Стрихнинъ.

Шпанскія мушки, см. Кантаристъ.

Щавелевая кислота. Все, известь содержащее: мѣлъ, известковое молоко, затѣмъ—промываніе желудка. Возбуждающія. Противъ отложенія въ почкахъ—обильное питье (молоко, минеральныя воды). Не давать калійныхъ солей и амміака.

Щелочи ѣдкія (ѣдкій натръ и кали). Лимонадъ изъ растительныхъ кислотъ и, если возможно, промываніе желудка подкисленной водой. Если прошло болѣе часа послѣ отравленія, то химическія противоядія являются запоздавшими и иногда приносятъ вредъ вслѣдствіе новаго раздраженія тканей. Масло или масляная эмульсія. Куски льда, молоко, слизистое питье.

Щелочи углекислыя. Лѣченіе то же, что и при ѣдкихъ щелочахъ и при поташѣ,—возбуждающія средства.

Эфирныя масла. Рвотное (ипекакуана), слизистое питье. Растираніе кожи. Черный кофе. Теплыя ванны.

Эфиръ. Чистый воздухъ, искусственное дыханіе; растираніе тѣла; опрыскиванія холодной водой; раздражающія на кожу.

Ядъ перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ (hymenopterismus). Сюда принадлежитъ ядъ насѣкомыхъ, снабженныхъ на задней части тѣла жаломъ и ядовитымъ пузырькомъ, какъ то пчелъ (apis mellifica), шмеля (bombus terrestris), осы (vespa vulgaris), шершня (vespa dabro). Осторожное удаленіе жала пинцетомъ; примачиваніе нашатырнымъ спиртомъ (1 ч. на 5—10 ч. воды) или растворомъ углекислаго амміака (1 : 5—10 ч. воды) для нейтрализаціи находящейся въ ядѣ кислоты (муравьиной); примочки изъ свинцовой воды или ледъ. При ужаленіи во рту и глоткѣ—промываніе или полосканіе изъ нашатырнаго спирта (liq. ammon. caust. 2,0, Aq. dest. 180,0, по столовой ложкѣ для полосканія черезъ каждыя 5—15 мин.) или углекислаго амміака; крѣпкіе растворы поваренной соли и куски льда. Если ужалена значительная поверхность тѣла, полезна щелочная ванна ($1^1/_2$—$2^1/_2$ фунта углекислаго натра).

Ярь мѣдянка, см. Мѣдныя соединенія.

ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВНѢЙШИХЪ ЛѢКАРСТВЕННЫХЪ СРЕДСТВЪ

СЪ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ

ИХЪ ФИЗІОЛОГИЧЕСКАГО ДѢЙСТВІЯ.

1. Аконитъ.
2. Аписъ.
3. Арника.
4. Арсеникъ.
5. Аурумъ.
6. Баптизія.
7. Белладонна.
8. Бріонія.
9. Вератрумъ.
10. Гамамелисъ.
11. Геллеборусъ.
12. Гельземініумъ.
13. Гепаръ сульфурисъ.
14. Гіосціамусъ.
15. Графитъ.
16. Дрозера.
17. Дулькамара.
18. Евфразія.
19. Игнація.
20. Ипекакуана.
21. Кали карбоникумъ.
22. Калькареа карбоника.
23. Календула.
24. Камомилла.
25. Кантарисъ.
26. Карбо.
27. Каустикумъ.
28. Коккулюсъ.
29. Коніумъ.
30. Коффеа.
31. Кроталюсъ.
32. Купрумъ.
33. Ликоподіумъ.
34. Ляхезисъ.
35. Меркуріусъ солюбилисъ.
36. Нуксъ вомика.
37. Пульсатилла.
38. Русъ.
39. Силицеа.
40. Спигелія.
41. Спонгія.
42. Стафизагрія.
43. Сульфуръ.
44. Тартарусъ эметикусъ.
45. Туйя.
46. Феррумъ.
47. Фитолакка.
48. Фосфоръ.
49. Фосфори ацидумъ.
50. Хина.

Аконитъ.

(Aconitum Napellus).

Общее. Смотря по величинѣ дозы, у взрослаго человѣка преобладаютъ или явленія повышенной функціональной энергіи нервной системы до степени рѣзко выраженной экзальтаціи или явленія угнетенія жизнедѣятельности до почти временной утраты пульса, холодной кожи и слабости, доходящей до обморока. Лихорадочное возбужденіе достигаетъ наивысшей степени, начиная съ вечера и до середины ночи, какъ это наблюдается также при Белладоннѣ, Желѣзѣ, Игнаціи и Пульсатиллѣ. При рѣзко выраженномъ чувствѣ жара обнаженіе тѣла непріятно, какъ вообще нахожденіе на свѣжемъ воздухѣ и умѣренное движеніе вызываютъ ухудшеніе болѣзненныхъ припадковъ. Состояніе духа подавленное, затемненное, печальное, доходящее до сильнѣйшаго безпокойства, тоски и даже до приступовъ рѣзко выраженной боязни смерти; все это чередуется съ припадками сильнаго безпокойства, отвращенія, нетерпѣнія, безпорядочной торопливости въ движеніяхъ и занятіяхъ. Сонъ безпокоенъ, часто прерывается страшными сновидѣніями, соединенными съ судорожными движеніями тѣла.

Кожа, подкожная клѣтчатка и мускулатура представляютъ различныя болѣзненыя явленія: ощущенія зуда въ лицѣ, рукахъ, концахъ пальцевъ, жженія тамъ и сямъ, съ высыпаніемъ маленькихъ пузырьковъ и образованіемъ маленькихъ, какъ отъ укуса или на подобіе коревыхъ, красненькихъ пятнышекъ. Ощущеніе холода, гусиной кожи, смѣняющееся чувствомъ жара, опуханія и напряженія тканей, съ выступленіемъ пота; соотвѣтственно такимъ измѣненіямъ, лицо является то ярко пылающимъ, то осунувшимся, смертельно блѣднымъ. Замѣчательно явленіе значительной слабости, ощущеніе упадка силъ какъ всѣхъ мышцъ, такъ и отдѣльныхъ мышечныхъ группъ, въ суставахъ ощущаются тупыя, пронизывающія или постоянныя боли. Разслабленіе сочленовныхъ связокъ, члены болтаются туда и сюда.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы: переполненіе кровью мозга и мозговыхъ оболочекъ. При вставаніи головокруженіе, дерганіе

и качаніе головы изъ стороны въ сторону, ощущеніе слабости мозга при малѣйшей попыткѣ къ разговору или движенію, тяжести и полноты въ головѣ съ ухудшеніемъ послѣ употребленія кофе или спиртныхъ напитковъ и послѣ душевныхъ напряженій. Давящая, колющая головная боль, боль во лбу. Боли въ подглазничныхъ, зубныхъ нервахъ; боли въ челюстномъ суставѣ и судорога, частое заиканіе. Затрудненное мышленіе, разсѣянность, безпамятность, прерывистый, безпорядочный ходъ мыслей, разстроенныя умственныя способности, безумныя идеи, бредъ, наклонность къ самоубійству.

Органъ зрѣнія. Вначалѣ суженіе зрачка, затѣмъ расширеніе. Ослабленіе зрѣнія или даже временная потеря его, переполненіе сосудовъ соединительной оболочки кровью, съ обильнымъ слезотеченіемъ, свѣтобоязнью, чувствомъ жара и сухости въ глазахъ.

Спинномозговые нервы: переполненіе кровью сосудовъ оболочекъ спинного мозга съ образованіемъ воспалительнаго выпота; боли въ поясницѣ, по ходу спинныхъ нервовъ, ломота въ крестцѣ и тазовой области. Болевыя ощущенія въ плечахъ, локтевомъ сочленіи, ощущеніе царапанія, онѣмѣнія въ рукахъ, съ параличными явленіями. Рвущія боли по ходу сѣдалищнаго нерва, въ особенности въ тазобедренномъ и колѣнномъ сочлененіяхъ, распространяющіяся до подошвъ ногъ.

Органы кровообращенія.

Сердце и кровеносные сосуды. Бурныя и жестокія сокращенія сердца, сильнѣйшее напряженіе оболочекъ сосудовъ (расширеніе послѣднихъ вслѣдствіе переполненія кровью). Частый, твердый и напряженный пульсъ; усиленное, неправильное сердцебіеніе; судорожное сжатіе мелкихъ артерій. Сильное лихорадочное состояніе со знобомъ, жаромъ и потомъ, высокая температура тѣла; вечернее повышеніе температуры. Приливъ крови къ различнымъ органамъ; склонность мелкихъ кровеносныхъ сосудовъ къ разрывамъ и отсюда появленіе кровотеченій, особенно изъ слизистыхъ оболочекъ носа и бронховъ. Ощущеніе сильнаго сердцебіенія съ чувствомъ сильнаго безпокойства; щемящая, сверлящая, колющая боль въ области сердца, ощущенія тяжести и давленія.

Органы дыханія.

Насморкъ; катарръ горла, ощущеніе щекотанія въ горлѣ, распространяющагося внизъ по воздухоноснымъ трубкамъ, раздраженіе доводитъ до кашля, сухое, короткое покашливаніе, чувствительность гортани. Приливы крови къ легкимъ, переполненіе кровью слизистой оболочки бронховъ и легкихъ съ разрывомъ мелкихъ сосудовъ и кровотеченіями.

Дыханіе имѣетъ дурной запахъ, шумное, громкое дыханіе съ открытымъ ртомъ; короткое, затрудненное дыханіе, одышка, поверхностное, слабое, длительное дыханіе, хрипы; ощущеніе сильнаго давленія и сжиманія. Воспаленіе легкихъ и плевры, боли и колотья при дыханіи.

Пищеварительные органы.

Полость рта: ощущеніе жара, жженія, сухости, вкусовое ощущеніе какъ бы отъ перца, усиленное отдѣленіе слюны; ощущеніе покалыванія и жара въ деснахъ, языкѣ, мягкомъ небѣ. Видъ зѣва покраснѣвшій съ ощущеніемъ жженія и судорожнаго сжатія. Отсутствіе аппетита и отвращеніе къ пищѣ, вкусъ испорченъ, рѣзкій, горькій, дурной; сильная жажда, вода пріятна.

Желудокъ: отрыжка, выхожденіе сладковатой жидкости, наклонность ко рвотѣ; рвота слизью, желчью, кровью. Боли въ желудкѣ послѣ употребленія пищи и напитковъ; ощущенія тяжести, давленія и напряженія въ подложечкѣ съ чувствомъ безпокойства.

Кишечный каналъ: катарръ кишечника, преимущественно двѣнадцатиперстной кишки съ затрудненнымъ отдѣленіемъ желчи; желтуха; жидкій, слизисто-желчный стулъ; глинообразный стулъ; задержаніе стула. Метеоризмъ, вздутіе толстой кишки, вѣтры, колики. Незначительный частый стукъ съ позывами. Опуханіе и чувствительность слизистой оболочки прямой кишки, боли въ заднемъ проходѣ; геморроидальныя кровотеченія. Воспалительныя пораженія брюшины съ сильною болѣзненностью живота при дотрогиваніи и движеніяхъ.

Моче-половые органы.

Переполненіе кровью почекъ, затрудненное мочеиспусканіе съ болѣзненными ощущеніями, позывы на мочу. Моча содержитъ много уратовъ (мочекислыхъ солей), примѣсь крови. Мочеиспусканіе учащено, непроизвольное мочеиспусканіе.

Мужскіе половые органы: усиленный приливъ крови съ повышенной чувствительностью, зудъ въ крайней плоти, опуханіе сѣмянныхъ канатиковъ, боли, распространяющіяся до яичекъ.

Женскіе половые органы: болѣе продолжительныя регулы, кровотеченія изъ матки, половое возбужденіе, переполненіе кровью и катарръ слизистой оболочки съ отдѣленіемъ желтоватаго секрета.

Примѣненіе у больныхъ.

Примѣняется при лихорадочномъ повышеніи температуры въ самомъ началѣ заболѣванія, чѣмъ раньше, тѣмъ лучше, и тѣмъ чаще, чѣмъ сильнѣе лихорадка, особенно при лихорадкахъ катарральныхъ и ревматическихъ. Примѣненія аконита въ теченіе двухъ или трехъ дней достаточно, особенно при простудномъ заболѣваніи, для того чтобы прервать начинающееся разстройство.

Средство слѣдуетъ имѣть въ виду въ свѣжихъ случаяхъ: ревматической головной, зубной и личной боли, болей въ колѣнномъ и локтевомъ сочлененіяхъ, болей въ груди, колотья въ бокахъ, боляхъ различныхъ мышечныхъ группъ; при катарральномъ пораженіи соединительной оболочки глазъ, слизистой оболочки бронховъ, желудочнокишечнаго канала, мочевого пузыря, при кровотеченіяхъ изъ носа, легкихъ, желудка и матки; при воспалительныхъ пораженіяхъ плевры и брюшины, при воспаленіи околосердечной сумки, сердца и большихъ кровеносныхъ сосудовъ.

Аписъ.

(Apis mellifica—ядъ пчелъ).

Общее. Вслѣдствіе ужаленія пчелы развиваются *мѣстно*, жгучая боль, быстрое опуханіе кожи и подкожной клѣтчатки, съ яркою краснотою и центральнымъ затвердѣніемъ болѣе блѣд-

наго цвѣта, все это постепенно проходитъ, а въ болѣе неблагопріятныхъ случаяхъ можетъ развиться тяжелое воспаленіе, съ переходомъ въ омертвѣніе тканей. Изъ *общихъ* явленій слѣдуетъ отмѣтить: чувство жара во всемъ тѣлѣ, судорожныя подергиванія мышцъ, безпокойство, тоску, значительную разбитость, обморочный упадокъ силъ, пульса, теплоты тѣла, чувство давленія въ желудкѣ, тошнота, рвота, даже смертельный исходъ.

Ухудшеніе всѣхъ припадковъ вечеромъ и ночью; лѣвая половина тѣла, кажется, поражается сильнѣе правой.

Сильная сонливость, наклонность къ дремотѣ днемъ, чувство сильнѣйшей слабости.

Сонъ разстраивается живыми, безпокойными сновидѣніями: бормотанье и громкій разговоръ во снѣ; чувство сильной разбитости и усталости даже послѣ продолжительнаго сна, очень глубокій и крѣпкій сонъ только подъ утро; нежеланіе встать.

Состояніе духа безпокойное и плаксивое, очень чувствительное и раздражительное, упадокъ духа, подавленность, равнодушіе.

Кожа и подкожная клѣтчатка.

Блѣдная, холодная кожа при низкой температурѣ тѣла. Зудъ и жженіе по всему тѣлу; крапивная высыпь, красныя пятна, рожистое воспаленіе; водяночныя припуханія.

Нервная система.

Пчелинымъ ядомъ, главнымъ образомъ, поражается головной и спинной мозгъ: параличная слабость интеллектуальныхъ силъ, съ одной стороны, съ другой—состояніе экзальтаціи съ бредовыми идеями и бредомъ, какъ послѣдствіе пораженія мозга.

Голова болитъ, тяжела, кружится; сильныя головныя боли въ половинѣ головы и на прочихъ мѣстахъ, кожа очень чувствительна къ дотрогиванію.

Органы кровообращенія.

Вначалѣ возбужденіе и ускореніе дѣятельности сердца, позднѣе, а равно и послѣ большихъ дозъ, замедленіе сердцебіенія съ малою энергіею сокращеній; пульсъ—малъ, рѣдокъ, неправиленъ, въ результатѣ параличъ сердца.

Органы дыханія.

Катарральное пораженіе слизистой оболочки гортани и бронховъ, съ охриплостью голоса и жестокими приступами кашля, особенно ночью. Грудь болѣзненна съ ощущеніемъ сжатія и давленія, астматическіе припадки и колотья въ бокахъ, что указываетъ на переполненіе кровью легкихъ и воспалительное состояніе легочной плевы.

Органы пищеваренія.

Ощущеніе значительной сухости въ полости рта, болѣзненныя, легко кровоточащія десны, языкъ опухаетъ и воспаляется, наощупь сухъ и шершавъ, по краямъ покрытъ мелкими пузырьками, очень болѣзненными; чувство жженія во всей глоткѣ.

Воспаленіе мягкаго неба, опуханіе небныхъ железъ съ сильными болями и затрудненнымъ глотаніемъ.

Скопленіе большого количества вязкой слизи въ горлѣ. Отсутствіе аппетита, отрыжка, тошнота, позывъ на рвоту. Рвота пищей и желчью. Боли въ лѣвой подреберной области; крайняя чувствительность и боли желудка. Ощущеніе жженія и болей въ полости живота, чувство вздутія. Вначалѣ въ теченіе сутокъ задержка стула, затѣмъ стулъ кашицеобразный, жидкій и, наконецъ, водянистый, свѣтложелтаго цвѣта. Обильное отдѣленіе жидкихъ желчныхъ, темнобурыхъ массъ съ примѣсью слизи и крови, позывы на стулъ.

Моче-половые органы.

Катарральное пораженіе почекъ и слизистой оболочки мочевого пузыря; сильные позывы на мочу, которая отдѣляется съ трудомъ, каплями; чувство жара, жженія, давленія при мочеиспусканіи; мочи немного, она сильно насыщенна, темнаго цвѣта. Обильное отдѣленіе водянистой, соломенно-желтой мочи.

Примѣненіе у больныхъ.

Примѣняется какъ при лихорадочныхъ, такъ и безлихорадочныхъ заболѣваніяхъ, какъ-то: кожныхъ высыпаніяхъ, рожистомъ

воспаленіи кожи, ревматическихъ пораженіяхъ небольшихъ суставовъ съ блѣдными или блѣдно-красными опуханіями ихъ окружности, при воспаленіи языка, мягкаго неба и миндалинъ, дифтерійномъ пораженіи зѣва, воспаленіи и катаррѣ слизистой оболочки желудка и кишечнаго канала, катаррѣ почекъ и мочевого пузыря, водянкѣ вслѣдствіе болѣзни почекъ, воспаленіи матки и яичниковъ, маточномъ кровотеченіи въ первые мѣсяцы беременности со склонностью къ выкидышу. Наконецъ, это средство оказывается весьма полезнымъ при воспалительномъ пораженіи наружныхъ оболочекъ глазъ, а именно при воспаленіи соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока, воспаленіи и помутнѣніи роговицы.

Арника.

(Arnica montana).

О б щ е е. Болѣзненно чрезмѣрная чувствительность всего тѣла съ безпокойствомъ; мышечныя боли, какъ послѣ удара, раздавливанія, съ сильною разбитостью, разслабленіемъ до полнаго безсилія; конвульсивныя подергиванія мышцъ и дрожь, ощущеніе болѣзненныхъ уколовъ, какъ бы отъ электрическаго тока, приливы крови къ различнымъ частямъ, ухудшеніе вслѣдствіе всякаго рода возбужденія и дѣятельности.

Подавленное, мрачное, раздражительное состояніе духа.

Сильная сонливость, сонъ неспокойный.

На кожѣ ощущеніе ползанія мурашекъ, зудъ, жженіе, фурункулезныя пораженія (чирьи), опуханіе клѣтчатки на лицѣ.

Нервная система.

Главное дѣйствіе на продолговатый мозгъ, вслѣдствіе чего разстраивается иннервація сердца и сосудовъ, равно и процессъ дыханія. Переполненіе кровью сосудовъ мозга. Интеллектуальная сфера подавлена; недостатокъ вниманія, разсѣянность, отвращеніе къ серьезнымъ занятіямъ, отсутствіе памяти и пр. Головныя боли, головокруженіе, шумъ въ ушахъ. Поражены и двигательные и чувствительные нервы—*невралгіи* всякаго рода.

Органы кровообращенія.

Сильное сердцебіеніе. Переполненіе кровью различныхъ частей тѣла. Сосуды сначала расширены,потомъ сужены. Лихорадочное состояніе съ ознобомъ, жаромъ и потомъ.

Органы дыханія.

Насморкъ, носовое кровотеченіе. Катарръ гортани и бронховъ, охриплость, приступы ночного кашля, переполненіе легкихъ кровью, кровь въ мокротѣ, колотья въ плеврѣ.

Органы пищеваренія.

Полость рта суха, сильная жажда, дурной вкусъ, языкъ сухъ, со слизистымъ налетомъ. Усиленное слюнотеченіе. Отсутствіе аппетита, тошнота и рвота, отрыжка горькимъ съ запахомъ гнилыхъ яицъ, иногда рвота кровью, судороги желудка. Вздутіе живота, колики,

Позывы на стулъ, твердый трудный стулъ, запоръ, опорожненіе слизистыми массами съ вѣтрами, рѣзью и натуживаніемъ.

Моче-половые органы.

Судорога пузыря, позывы безъ выдѣленія, отхожденіе мочи каплями; непроизвольное мочеиспусканіе, обильное и увеличенное отдѣленіе мочи; очень темная, насыщенная, смѣшанная съ кровью моча.

Повышенное половое чувство съ эрекціями, ночныя поллюціи. Преждевременное наступленіе мѣсячныхъ, обильныя съ болями мѣсячныя; отхожденіе свернувшейся крови съ тошнотою.

Примѣненіе у больныхъ.

При расширеніи болѣе крупныхъ и мелкихъ сосудовъ, при увеличенномъ напорѣ крови, при разрывѣ мелкихъ сосудовъ (капилляровъ) и кровоизліяніяхъ, происшедшихъ или вслѣдствіе измѣненія сосудистыхъ стѣнокъ (въ мозгу) или вслѣдствіе

внѣшнихъ механическихъ причинъ—удара, толчка, раздавленія, паденія (сотрясеніе мозга, отдѣльныхъ частей или всего тѣла). Особенно при носовыхъ кровотеченіяхъ, легочномъ, маточномъ послѣ сотрясенія и растяженія тѣла; при коклюшѣ, если верхняя часть туловища горяча, а нижняя (животъ и нижнія конечности) холодна. При судорогѣ желудка, при вздутіи живота, при судорогѣ мочевого пузыря, непроизвольномъ мочеиспусканіи, кровавой мочѣ. Еще примѣняется при охриплости вслѣдствіе сильнаго напряженія голосовыхъ связокъ послѣ громкаго разговора, пѣнія и т. п.

Арсеникъ.

(Arsenicum album, Мышьякъ).

Общее. Данныя произведенныхъ съ этимъ средствомъ испытаній показали, что мышьякъ оказываетъ вліяніе и производитъ измѣненія не только въ составѣ крови, въ частности—красныхъ кровяныхъ тѣлецъ, но и въ строеніи и отправленіи нервныхъ клѣтокъ. Въ той и другой области измѣненія наступаютъ почти одновременно.

Картина дѣйствія мышьяка измѣняется смотря по тому, примѣнялись ли короткое время очень маленькія дозы или—долгое время большія.

Простое чувство слабости достигаетъ степени почти паралича и полнаго упадка всѣхъ силъ, незначительное ускореніе кровообращенія—до приступа сильнаго лихорадочнаго движенія, незначительныя разстройства растительной сферы—до рѣзко выраженной дискразіи, кахексіи, разложенія и распада тканей, омертвѣнія. Въ началѣ дѣйствія малыхъ дозъ преобладаетъ характеръ возбужденія, позднѣе—и тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше доза,—характеръ угнетенія, явленіе паралича. Замѣчательна періодичность, которая проявляется въ появленіи измѣненій, которыя представляютъ ясно выраженный перемежающійся типъ. Типъ этотъ измѣнчиваго характера, промежутки рѣдко совершенно свободны.

Боли, появляющіяся въ различныхъ группахъ нервовъ, характеризуются больными, какъ ощущеніе жженія, и успокаи-

ваются примѣненіемъ сухого тепла. Кромѣ того, дѣйствіе мышьяка сопровождается слѣдующими явленіями:

Болѣзненное состояніе сопровождается чувствомъ сильнаго безпокойства, тоски (предсмертнаго томленія) и потемнѣніемъ сознанія.

Отъ примѣненія тепла наступаетъ облегченіе. Болѣзненныя явленія наступаютъ при полномъ покоѣ (сидѣніи или лежаніи) и даже ухудшаются при покойномъ положеніи тѣла, улучшаются при стояніи и ходьбѣ и вообще всякомъ движеніи (обратное крайне рѣдко). Приступы наиболѣе рѣзко выраженныхъ симптомовъ сопровождаются различными второстепенными проявленіями. Нѣкоторыя болѣзненныя явленія, какъ возбужденіе, безпокойство, удушье, головокруженіе, ухудшаются въ часы предъ полночью, а другія, какъ, напр., невралгіи, въ часы послѣ полуночи; очень рѣдко наблюдается появленіе припадковъ въ дообѣденные часы.

Результаты *вскрытія* также различны, смотря потому, послѣдовала ли смерть вскорѣ или послѣ продолжительнаго дѣйствія принятой большой дозы мышьяка. Въ первомъ случаѣ бросаются въ глаза явленія воспаленія желудочно-кишечнаго канала: слизистая оболочка желудка представляется мѣстами красною, воспаленною, размягченною, набухшею съ бѣловатыми опуханіями и помутнѣніями эпителія (какъ при холерѣ), пронизанною кровоизліяніями въ подслизистой ткани, тѣ же измѣненія въ кишечномъ каналѣ; изъязвленія и омертвѣніе встрѣчаются рѣдко.

Наблюдаются также опуханія желудочныхъ и кишечныхъ фолликулъ съ зернистою инфильтраціею и начинающимся жировымъ перерожденіемъ. Сосуды слизистой оболочки бронховъ и легочной ткани переполнены кровью; эндокардъ (внутренняя оболочка сердца) покрыта кровоизліяніями.

Если же смерть послѣдуетъ долгое время спустя послѣ отравленія мышьякомъ, то кровь представляется жидкою, темноокрашенною, въ мозгу—выпоты, легочная плева—покраснѣвшая, въ ея полости—серозный выпотъ, сердце мягко, эндокардъ экхимозированъ; иногда также печеночная ткань пропитана свѣтложелтымъ красящимъ веществомъ желчи, сердце растянуто, паренхима селезенки разрыхлена.

Состояніе духа характеризуется меланхоліей съ приступами душевнаго отчаянія, доводящаго до попытокъ самоубійства, а также потемнѣніемъ сознанія.

Сонъ безпокойный, часто прерывается, дѣло доходитъ до безсонницы, отсюда чувство разбитости съ наклонностью ко сну днемъ; во время сна частые приступы пробужденія отъ испуга, живые, безпокойные сны, бредъ.

Кожа и подкожная клѣтчатка, вслѣдствіе пораженія нервовъ и сосудовъ, представляетъ много измѣненій: сыпи, красныя пятна, пузырьки, кровоизліянія, наклонность къ образованію язвъ, опуханіе (Oedema) кожи и подкожной клѣтчатки (отечность). Обезцвѣчиваніе и выпаденіе ногтей и волосъ,

Нервная система.

Пораженія ея выражаются состояніемъ возбужденія чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ, повышеніемъ чувствительности до появленія рѣзкихъ болей, судорожными подергиваніями, конвульсіями и корчами. Слѣдующею стадіею будетъ— пониженіе энергіи отправленія, уменьшеніе чувствительности, обманы чувствъ, сильная разбитость, дрожаніе и параличи отдѣльныхъ членовъ. Разстройства душевной сферы: равнодушіе, разсѣянность, ослабленіе мышленія и памяти, отвращеніе къ какому-либо усилію, желаніе устранить всякую возможность чувственныхъ воспріятій.

Въ мозгу наблюдается приливъ крови, выраженное воспалительное состояніе, отсюда чувство значительной тяжести, жара, распуханія, боли въ головѣ, приступы головокруженія до безпамятства, состояніе оглушенія. Рвущія боли по ходу различныхъ нервовъ (напр., тройничнаго), наступающія припадками. Воспаленіе оболочекъ и тканей входящихъ въ составъ глаза.

Судороги и болѣзненность спинныхъ мышцъ. Дрожаніе рукъ и ногъ. Слабость и параличное состояніе конечностей.

Органы кровообращенія.

Лѣвое сердце и артеріальная система поражаются по преимуществу; воспалительное состояніе сердечныхъ мышцъ съ ихъ оболочкою, недостаточность митральныхъ клапановъ и эксцентрическая гипертрофія; аневризма аорты; оболочки сосудовъ обнаруживаютъ наклонность къ жировому перерожденію; капиллярныя кровоизліянія въ сердечныхъ мышцахъ съ размягченіемъ ткани.

Скопившаяся послѣ смерти въ лѣвомъ желудочкѣ сердца кровь представляется темнаго, почти чернаго цвѣта и кашицеобразной консистенціи. Въ связи съ этимъ стоятъ: ускоренное, сильное серцебіеніе, иногда совершенно безпорядочное, съ чувствомъ тоски особенно по ночамъ; рѣзко ощутимо, сильное біеніе сердца, при маломъ, едва ощутимомъ пульсѣ; бурные, неправильные, и болѣзненные толчки сердца. Затѣмъ короткія, слабыя сокращенія сердца; очень замедленный, полный пульсъ.

Лихорадочныя явленія: жестокій ознобъ, послѣ котораго кожа горяча, суха; при ощущеніи внутренняго жгучаго жара, поверхность кожи холодна и конечности также холодны; холодный, обильный потъ; лихорадочные приступы являются періодически и имѣютъ только двѣ выраженныя стадіи—озноба и жара или озноба и пота. Типъ ихъ ремиттирующій и интермиттирующій (перемежающійся).

Органы дыханія

Насморкъ съ жидкимъ, острымъ, разъѣдающимъ отдѣленіемъ.

Катарръ горла и бронховъ съ охриплостью и небольшимъ тягучеслизистымъ отдѣленіемъ; припадки кашля или короткое покашливаніе съ небольшимъ, тягучимъ выдѣленіемъ слизи, которая съ трудомъ выплевывается, иногда въ ней встрѣчаются полоски крови. Припадки ухудшаются вечеромъ и ночью и соединены съ тошнотою, безпокойствомъ и затрудненнымъ дыханіемъ. Бронхіальный катарръ и астма (удушье); расширеніе легочныхъ пузырьковъ (эмфизема). Легкія переполнены кровью; сжатіе груди и одышка. Воспалительное состояніе плевры съ водянистымъ или сукровичнымъ выпотомъ.

Пищеварительные органы.

Выраженная сухость слизистой оболочки съ сильною жаждою, но заразъ жидкости можетъ быть введено лишь нѣсколько глотковъ. При другихъ обстоятельствахъ увеличенное отдѣленіе слюны съ примѣсью крови изъ десенъ. Очень сухой языкъ мало чувствителенъ къ механическимъ и вкусовымъ раздраженіямъ; ощущеніе колотья въ корнѣ языка и жженія въ кончикѣ и по краямъ

его. Воспаленіе мягкаго неба съ наклонностью слизистой оболочки къ изъязвленію и омертвѣнію.

Дурной, соленый, горькій вкусъ. Отсутствіе аппетита. Катарръ и воспаленіе желудка, съ образованіемъ язвъ. Рвота и поносъ, со вздутіемъ живота. Жидкій ѣдкій стулъ съ натуживаніемъ желтоватозеленаго цвѣта иногда съ примѣсью крови. Катарральныя пораженія толстыхъ кишекъ, боли въ прямой, (проктальгіи). Болѣзненныя, особенно ночью, геморроидальныя шишки.

Моче-половые органы.

Почки переполнены кровью, катарръ почекъ, мочевого пузыря, мочеиспускательнаго канала. Моча содержитъ бѣлокъ; увеличенное мочеотдѣленіе съ выдѣленіемъ сахара. Воспалительное состояніе половыхъ органовъ, катарры, бѣли, усиленіе регулъ съ болями.

Примѣненіе у больныхъ.

Примѣненіе мышьяка показано въ тѣхъ острыхъ и хроническихъ болѣзняхъ, въ которыхъ происходятъ глубокія измѣненія въ сосудистой и нервной системахъ. Такимъ образомъ, это средство примѣняется при болѣзненныхъ разстройствахъ нервной системы: головныхъ боляхъ, невралгіяхъ—личной, нервовъ конечностей, сѣдалищной, съ дрожаніемъ, подергиваніемъ и утратою чувствительности; при припадкахъ эпилептическихъ судорогъ, головокруженіи, обморокѣ, меланхоліи съ припадками тоски, при душевномъ разстройствѣ съ попытками къ самоубійству, безсонницѣ съ упадкомъ и истощеніемъ душевныхъ силъ; далѣе—при воспаленіи глазъ, при хроническомъ насморкѣ съ упадкомъ силъ, воспаленіи зѣва, гнилостнаго характера, при охриплости, кашлѣ, одышкѣ, астматическихъ приступахъ, судорогѣ и воспаленіи сердца, при гриппѣ, при воспаленіи легкихъ и плевры, при воспаленіи и образованіи язвъ слизистой оболочки желудочно-кишечнаго канала, при боляхъ и судорогѣ желудка, при поносахъ, коликахъ въ прямой кишкѣ, осложненіи геморроидальными страданіями вслѣдствіе воспаленія венъ, при воспаленіи подкожной клѣтчатки, женскихъ грудныхъ железъ.

Далѣе, его примѣненіе показано при холерѣ, перемежающейся болотной лихорадкѣ, при тифоидальныхъ, септическихъ лихорадкахъ, при піэміи (зараженіи крови), скорбутѣ, при Верлгофовой пятнистой болѣзни, при пузырчатой рожѣ, злокачественной скарлатинѣ, при кори, при оспѣ съ значительнымъ упадкомъ силъ, при различныхъ кожныхъ сыпяхъ безъ лихорадки, при заболѣваніи почекъ и вызванной этою болѣзнью водянкѣ, при малокровіи съ ослабленіемъ всѣхъ отправленій; наконецъ, при сифилитическихъ язвахъ съ гнилостнымъ распадомъ, при сильно болѣзненныхъ язвахъ всякаго рода съ отдѣленіемъ злокачественнаго, разлагающагося гноя, при затяжныхъ менструальныхъ кровотеченіяхъ, при коликахъ матки, при бѣляхъ, дурно пахнущихъ, разлагающихся. Итакъ, это средство находитъ себѣ примѣненіе во всѣхъ тѣхъ разстройствахъ, которыя перечислены выше при описаніи его дѣйствія на отдѣльные органы и ткани.

Аурумъ.

(Золото).

Общее. Отправленія растительной сферы существенно усиливаются: аппетитъ увеличивается, пищевареніе ускоряется, увеличивается отдѣленіе мочи, усиливается половое чувство, температура тѣла повышается, потребность въ движеніяхъ усиливается,— таково дѣйствіе малыхъ дозъ. Послѣ большихъ дозъ хлористаго золота наблюдаются: тошнота, рвота, поносы, колики, сжатіе въ груди, конвульсіи, параличъ сердца.

Общія болѣзненныя явленія: при лежаніи ломящія боли въ крестцѣ и колѣняхъ, боли въ костяхъ головы, туловища и конечностяхъ; ухудшеніе большинства болей при дотрогиваніи, иногда также при движеніи. Усиленная чувствительность къ впечатлѣніямъ всякаго рода; утомленность.

Сонъ безпокойный, сильная сонливость днемъ, особенно послѣ пріема пищи, возбужденіе и безсонница, легкое засыпаніе и необыкновенно раннее пробужденіе, непріятные, пугающіе сны.

Настроеніе духа неровное, угнетенное, меланхолическое.

Безпокойное стремленіе къ занятіямъ безъ выдержки; припадки тоски и душевнаго разстройства съ наклонностью къ самоубійству.

Ползанье мурашекъ, зудъ, пятна, сыпи *кожи.*

Нервная система.

Приливы къ мозгу. Голова тяжела, болитъ, пылающее лицо съ выступающими глазами. Личныя боли съ опуханіемъ кожи и подкожной клѣтчатки.

Пораженіе чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ выражается невралгичеекими болями—межреберными, спинными, поясничными, ломотою въ мышцахъ верхнихъ и нижнихъ конечностей, болѣзненностью по преимуществу локтеваго сустава, костей кисти и колѣнъ, съ ощущеніемъ тупости и разслабленія этихъ частей.

Органы кровообращенія.

Неправильныя сокращенія сердца, то очень слабыя, то очень сильныя и бурныя; ускоренный пульсъ. Застои крови въ большихъ артеріяхъ и венахъ, обѣднѣніе кровью мелкихъ сосудовъ.

Умѣренная лихорадка съ предшествующимъ ощущеніемъ зноба, холодныя конечности, ослабленіе транспираціи (кожнаго дыханія), обильный ночной потъ непріятнаго проницающаго запаха.

Послѣдовательное дѣйствіе: повышенное ощущеніе тепла во всей поверхности кожи съ пониженною чувствительностью къ холоду вслѣдствіе значительнаго расширенія кровеносныхъ сосудовъ.

Органы дыханія.

Жестокій льющій насморкъ. Незначительный катарръ большихъ бронховъ съ отдѣленіемъ и выкашливаніемъ вязкой слизи. Приливы крови къ легкимъ; тяжелое дыханіе, ночные приступы безпокойства и щемленія въ груди, тупыя боли и колотья въ груди при вдыханіи.

Органы пищеваренія.

Усиленіе отдѣленія слюны; непріятный, дурной запахъ изо рта. Разрыхленіе, опуханіе и воспаленіе десенъ съ зубною болью.

Болѣзненное глотаніе и скопленіе вязкой слизи въ глоткѣ. Непріятный, горькій вкусъ, сильная жажда, отвращеніе къ мясной пищѣ, желаніе пить кофе, необыкновенная жадность при ѣдѣ, сильный аппетитъ, послѣ ѣды улучшеніе состоянія духа. Отрыжка послѣ питья; послѣ ѣды незначительныя ощущенія давленія въ желудкѣ и болѣзненное чувство голода. Скопленіе газовъ, вздутіе живота, съ болями и коликами тамъ и сямъ. Ощущеніе напряженія въ мышцахъ живота, давящія боли въ паховомъ кольцѣ, какъ будто должна выйти грыжа.

Стулъ вялый съ твердыми, трудно отходящими массами; умѣренный, кашицеобразный, частый стулъ; ночные поносы съ жженіемъ въ заднемъ проходѣ; болѣзненныя геморроидальныя шишки.

Моче-половые органы.

Частые позывы съ незначительнымъ выдѣленіемъ мочи.

Обильное выдѣленіе своеобразно пахнущей мочи съ буровато-слизистымъ осадкомъ; много мутной, бѣловатой мочи со слизистымъ осадкомъ.

Повышенная половая страсть, эрекціи и поллюціи.

Преждевременное наступленіе мѣсячныхъ съ обильнымъ отдѣленіемъ.

Примѣненіе у больныхъ.

Главнымъ образомъ употребляется въ хроническихъ болѣзняхъ съ безлихорадочнымъ теченіемъ или незначительнымъ вечернимъ повышеніемъ температуры; у лицъ съ возбужденно-мрачнымъ или подавленно-меланхолическимъ настроеніемъ съ приступами сильной душевной тоски и безпричиннымъ стремленіемъ къ смерти, какъ при мышьякѣ. Далѣе, — при пятнистыхъ кожныхъ высыпяхъ съ инерильтраціей ткани, при сифилитическомъ и золотушномъ насморкѣ, воспаленіи и образованіи язвъ слизистой оболочки носа, при дурномъ запахѣ изо рта, при воспаленныхъ, разрыхленныхъ деснахъ; при вздутіяхъ живота, ослабленіи пупартовой связки и опасности прорыва грыжи чрезъ паховое кольцо; при воспаленіи яичниковъ, матки, яичекъ; при

многихъ золотушныхъ пораженіяхъ, особливо при хроническихъ воспаленіяхъ глазъ.

Баптизія.

(Baptisia tinctoria).

Общее. Сильная сонливость и утомленіе, безпокойный сонъ съ страшнымъ снами, очень глубокій, крѣпкій сонъ, граничащій съ обморокомъ; нервозная чувствительность и раздражительность; сильная слабость и упадокъ силъ; длительное лихорадочное состояніе. Мышечныя боли, подергиванія въ отдѣльныхъ мышечныхъ группахъ, судороги, необыкновенное ощущеніе жженія въ подошвѣ; боли въ конечностяхъ.

Особенное. Боли во лбу и вискахъ, склонность къ головокруженію, невозможность умственной работы, безпорядочное ослабленное мышленіе; ощущеніе, какъ будто голова слишкомъ велика и слишкомъ тяжела; опущеніе вѣкъ, болѣзненность глазъ съ воспалительною краснотою. Шумъ въ ушахъ и ослабленіе слуха.

Насморкъ съ отдѣленіемъ густой слизи и болѣзненностью носа; охриплость до потери голоса, кашель, судорога голосовой щели; затрудненное дыханіе, одышка съ сильнымъ сердцебіеніемъ.

Языкъ опухшій и сухой или покрытъ желтоватою слизью; слизистая оболочка мягкаго неба сильно красная, миндалины опухши, въ зѣвѣ скопленіе слизи и изъязвленія; глотаніе затруднено.

Отсутствіе аппетита, горькій вкусъ, тошнота, позывы на рвоту. болѣзненныя ощущенія въ желудкѣ; рвота кислыми и желчными массами, вздутіе живота, колики, печень очень чувствительна и болѣзненна при давленіи. Темныя, жидкія, слизистыя или кровянистыя массы извергаются при стулѣ (поносъ послѣ большихъ дозъ); воспалительное состояніе тонкихъ и толстыхъ кишекъ. Моча очень красная и жгучая въ незначительномъ количествѣ, болѣзненныя ощущенія въ почкахъ сильныя.

Раннія и обильныя мѣсячныя кровотеченія, острыя, дурно пахнущія бѣли съ образованіемъ язвъ въ рукавѣ и на шейкѣ матки.

Примѣненіе у больныхъ.

Употребляется при гастрическихъ, желчныхъ и тифозныхъ лихорадкахъ, при поносахъ и разстройствахъ кишечника, при

дифтерійномъ пораженіи зѣва, въ тяжелыхъ случаяхъ гриппа (инфлуенца).

Белладонна.

(Atropa Belladonna).

О б щ е е. По Böcker'у, экстрактъ свѣжихъ листьевъ этой травы, принимаемый ежедневно въ количествѣ 4—8 сантиграммъ., оказываетъ въ здоровомъ организмѣ такого рода вліяніе на отдѣленіе мочи, что моча становится богаче твердыми составными частями вообще, въ частности мочевиною, слизью, экстрактивными веществами и не огнеупорными минеральными солями, бѣднѣе же мочевою кислотою и огнеупорными солями. Выдыхаемый легкими воздухъ вначалѣ относительно богаче углекислотою, затѣмъ содержаніе послѣдней падаетъ до нормы и вновь увеличивается тотчасъ же по прекращеніи пріемовъ средства. Изслѣдованія крови показываютъ уменьшеніе твердыхъ составныхъ частей плазмы (серума и волокнины), изъ чего вмѣстѣ съ результатами изслѣдованія мочи можно заключать о повышенной фильтраціи. Изъ микроскопическаго изслѣдованія красныхъ кровяныхъ тѣлецъ, въ соединеніи съ увеличеннымъ выдѣленіемъ углекислоты, можно заключить о повышенной дыхательной функціи красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. Вслѣдствіе этого происходитъ болѣе скорый распадъ послѣднихъ и превращеніе въ составныя части желчи, благодаря повышенной энергіи печеночныхъ клѣтокъ, а потому, отдѣленіе желчи увеличивается. Отсюда слѣдуетъ предположить, что белладонна вызываетъ значительныя измѣненія въ крови, а именно въ ея плазмѣ и красныхъ кровяныхъ шарикахъ. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что вызываемыя белладонною измѣненія иннерваціи стоятъ въ причинной связи съ измѣненіемъ качества крови, а также можно заключить, что нервныя клѣтки равнымъ образомъ подвергаются прямому воздѣйствію белладонны.

Характернымъ для вызываемыхъ белладонною болѣзненныхъ явленій представляется ухудшеніе въ послѣполуденные и вечерніе часы, крайне повышенная чувствительность къ холодному воздуху, а потому ухудшеніе нервныхъ болей отъ холода, при чемъ на

одномъ мѣстѣ боли вдругъ достигаютъ наибольшей силы, затѣмъ внезапно прекращаются, чтобы появиться на другомъ.

Настроеніе духа по преимуществу подавленное и угнетенное, меланхолія достигаетъ степени полнаго отвращенія къ жизни, равнодушіе, плаксивость, припадки тоски смѣняются приступами судорожнаго смѣха.

Сонъ до полуночи большею частью очень безпокойный, съ кошмарами; позднѣе глубокій съ бредомъ или имѣетъ сходство съ обморокомъ; крѣпкій, покойный сонъ съ головною болью при пробужденіи.

Кожа напряжена, горяча, лицо пылаетъ и одутловато или смертельно блѣдно и впало.

Воспалительныя опуханія лимфатическихъ железъ—затылочныхъ, подмышечныхъ, паховыхъ и слюнныхъ железъ: подчелюстныхъ, околоушныхъ, язычныхъ и мягкаго неба.

Нервная система.

Дѣйствіе средства сначала производитъ состояніе возбужденія, а затѣмъ угнетеніе и ослабленіе, до степени паралича. Мозгъ и мозговыя оболочки переполняются кровью, пропитываются выпотомъ, жестокія головныя боли во лбу и вискахъ, головокруженіе, сонливость, безпамятство; сильное біеніе шейныхъ и височныхъ артерій, переполненіе кровью венъ. Конвульсіи и тетаническіе приступы. Ослабленное мышленіе, обманъ чувствъ (галлюцинаціи), возбужденная фантазія, бредъ, безумныя идеи, приступы бѣшенства съ наклонностью бить и кусать, наклонность къ самоуничтоженію, умопомѣшательство, слабоуміе, идіотизмъ.

Сокращеніе личныхъ мышцъ, личныя боли, судорожное сжатіе челюстей, скрежетаніе зубами. Расширеніе зрачковъ, переполненіе глазного яблока кровью, ослабленное, мутное зрѣніе. Воспалительное состояніе слухового органа, шумъ въ ушахъ, ослабленіе слуха. Судороги спинныхъ мышцъ, выпрямляющія судороги и конвульсіи. Чувство ослабленія и паралича конечностей. Невральгіи различныхъ группъ нервовъ туловища и конечностей, переходящія внезапно съ одного мѣста на другое, съ ухудшеніемъ въ предполночные часы и подъ вліяніемъ холодной и сырой погоды.

Органы кровообращенія.

Вначалѣ усиленное сердцебіеніе съ ускореннымъ, полнымъ пульсомъ, позднѣе (по мѣрѣ увеличенія выпотовъ въ мозгу) задержанный, малый пульсъ при холодной, блѣдной кожѣ. Судорога сердца; усиленная пульсація большихъ артерій, застои крови въ большихъ венныхъ стволахъ.

Явленія сильной лихорадки съ покраснѣвшею, горячею кожею головы и груди, холодными руками и ногами; ощущеніе зноба преобладаетъ; потоотдѣленіе со всей поверхности тѣла — при большихъ дозахъ, чаще потѣніе лишь нѣкоторыхъ частей тѣла, при сухости и даже охлажденіи прочей поверхности тѣла. Вечернее повышеніе лихорадки съ сильною продолжительною жаждою.

Органы дыханія.

Катарръ носа съ опуханіемъ и незначительнымъ водянистымъ отдѣленіемъ со слизистой оболочки, съ обманами, обонянія, опуханіе подслизистой ткани. Катарръ гортани и бронховъ съ незначительнымъ слизистымъ отдѣленіемъ, ощущеніе царапанья въ горлѣ, сухой, грубый, лающій кашель; охриплость. Переполненіе кровью сосудовъ слизистой оболочки бронховъ, мѣстами наблюдаются разрывы ихъ, при кашлѣ выдѣляется кровь. Переполненіе кровью легочной ткани, одышка, давящая боль при дыханіи съ вечернимъ и ночнымъ ухудшеніемъ.

Органы пищеваренія.

Полость рта. Переполненіе кровью и опуханіе слизистой оболочки и подкожной клѣтчатки, языкъ воспаленъ, опухъ, сосочки его выстоятъ, слизистая оболочка большею частью суха и покраснѣвши, иногда покрыта незначительнымъ количествомъ пѣнистой слизи.

Катарръ мягкаго неба, воспалительное опуханіе миндалинъ, сильная жажда, при попыткахъ глотанія судорожная задержка; затрудненное и болѣзненное глотаніе. Гнилостный, дурной вкусъ, отвращеніе къ пищѣ, даже при чистомъ языкѣ. Кровотеченіе изъ

капилляровъ десенъ и слизистой оболочки полости рта. Тошнота, отрыжка, изжога.

Острый желудочный катарръ, доходящій до степени воспаленія желудка, съ жестокими болями въ желудкѣ, вздутіемъ желудка, тошнотою и рвотою. Чувство давленія въ области желудка, значительная чувствительность области желудка къ давленію.

Судорога грудобрюшной преграды, икота.

Катарръ и воспаленіе кишекъ, съ пораженіемъ серозной оболочки. Воспаленіе брюшины—съ вздутіемъ живота, крайнею чувствительностью и болѣзненностью его покрововъ, особенно при дотрогиваніи.

Частые позывы на стулъ, судорожное натуживаніе, затѣмъ параличная слабость кишечной мускулатуры съ послѣдовательнымъ запоромъ. Колики, судорожныя движенія кишекъ. Послабленіе, вначалѣ незначительное, кашицеобразными массами, затѣмъ водянистое, со множествомъ желчи, окрашенное въ зеленый или желтый цвѣтъ.

Воспаленіе прямой кишки, позывы на стулъ безъ выдѣленія и съ натуживаніемъ.

Параличъ жома задняго прохода, незначительныя, непроизвольныя выдѣленія кала. Сильное жженіе и зудъ слизистой оболочки задняго прохода съ выдѣленіемъ крови.

Печень: переполненіе кровью, воспаленіе, увеличенное выдѣленіе желчи.

Селезенка увеличена и болѣзненна.

Моче-половые органы.

Почки. Переполненіе кровью, опухоли, болѣзненность. Увеличенное выдѣленіе мочи. Моча водяниста, прозрачна, чиста; продолжительная поліурія.

Катарръ почекъ, мочевого пузыря и мочеиспускательнаго канала, переполненіе кровью, незначительный выпотъ. Позывы и натуживаніе при мочеиспусканіи; судороги мочевого пузыря, болѣзненное и затрудненное выдѣленіе мочи. Ослабленіе мышечнаго жома пузыря, непроизвольное выдѣленіе мочи, ночное недержаніе мочи.

Половые органы — переполненіе кровью и увеличенное выдѣленіе, безъ эрекцій и безъ повышенія полового чувства.

Приливы къ маткѣ, слишкомъ раннія и сильныя мѣсячныя, крайне дурно пахнущая менструальная кровь, колики въ маткѣ.

Примѣненіе у больныхъ.

Примѣняется главнымъ образомъ въ начальномъ періодѣ острыхъ воспалительныхъ процессовъ, устраняя приливы крови и предупреждая развитіе воспаленія. Въ хроническихъ болѣзняхъ Белладонна примѣняется въ припадкахъ судорогъ и въ состояніяхъ параличной слабости. Въ частности примѣняется при острыхъ кожныхъ болѣзняхъ: рожа, краснуха, корь, скарлатина; при воспалительномъ опуханіи железистыхъ органовъ; при катарральныхъ пораженіяхъ различныхъ слизистыхъ оболочекъ, при воспаленіи языка, мягкаго неба, глотки, судорогѣ горла, желудка, при катаррѣ и воспаленіи желудочно-кишечнаго канала, при воспаленіи печени и почекъ, опуханіи и болѣзненности селезенки, катаррѣ и судорогѣ мочевого пузыря, воспалительномъ опуханіи сѣмянныхъ канатиковъ и железъ, при воспаленіи матки и яичниковъ, при воспаленіи глаза и уха, при воспаленіи мозга и его оболочекъ, при катаррѣ дыхательныхъ путей, кашлѣ, охриплости; при кровотеченіяхъ изъ капилляровъ слизистой оболочки различныхъ органовъ, при невралгіяхъ, судорогахъ, соединенныхъ съ воспалительными явленіями,—при коклюшномъ кашлѣ.

Бріонія.

(Bryonia alba).

Общее. Въ большихъ дозахъ Бріонія производитъ боли въ животѣ, обильный водянистый стулъ, даже рвоту. У животныхъ большія дозы: воспаленіе желудка съ черными пятнами на слизистой оболочкѣ, воспаленіе толстыхъ кишекъ. Свѣжій сокъ растенія, при попаданіи на кожу, производитъ на ней красноту, боль, воспалительныя явленія, образованіе пузырьковъ. Характерно пораженіе нервной системы, откуда производятся измѣненія въ кожѣ слизистой оболочкѣ и серозной.

Вызванныя Бріоніей боли и болѣзненныя явленія ухудшаются движеніями тѣла, легкимъ прикосновеніемъ, и на свѣжемъ воздухѣ, улучшаются при покоѣ, сильнымъ давленіемъ на больное мѣсто и нахожденіемъ въ комнатѣ.

Настроеніе духа возбужденное, мрачнаго характера, съ наклонностью къ слезамъ.

Сонъ безпокойный, со смѣняющимися приступами зноба и дрожи. Безпокойные, страшные сны, полныя представленій о дневныхъ занятіяхъ.

Кожа: желтушное окрашиваніе всей поверхности кожи, сильный зудъ, высыпь маленькихъ узловъ и пузырьковъ, легкое отслаиваніе эпителія съ образованіемъ изъязвленій на сгибательной сторонѣ членовъ; величиною съ чечевицу красныя пятна, частью исчезающія подъ давленіемъ, частью остающіяся. Летучій жаръ, опуханіе лица. Опуханіе носа и кровотеченія изъ носа.

Нервная система.

Головной мозгъ и головные нервы. Состояніе сильнаго возбужденія, съ разслабленіемъ, безпокойствомъ, затѣмъ явленія упадка, умственной слабости, забывчивости. Состояніе прилива съ давящими болями во лбу, въ вискахъ пульсирующая боль, колотье и давленіе по всему черепу. Головокруженіе съ наклонностью упасть назадъ, общею слабостью, всего хуже рано утромъ.

Глаза красны, опухшіе, катарръ глазъ и соединительной оболочки, слезотеченіе, отдѣленіе слизистое.

Нервы спинного мозга.

Ревматическія воспалительныя пораженія различныхъ мышечныхъ группъ съ болями и параличнымъ состояніемъ. Опухоль мягкихъ частей и боли въ колѣнномъ суставѣ. Нервныя боли въ затылкѣ, спинѣ, крестцѣ, ревматическія суставныя боли въ суставахъ локтевомъ и кистевомъ, со слабостью и дрожаніемъ рукъ и пальцевъ. Также боли въ сочлененіяхъ нижнихъ конечностей, съ слабостью, чувствомъ усталости и дрожаніемъ ногъ.

Выраженное лихорадочное состояніе: ускоренный пульсъ, вечернее повышеніе, знобъ отъ легкаго до потрясающаго; летучій жаръ, чувство дрожи въ отдѣльныхъ частяхъ (головѣ, груди и ладоняхъ); общій жаръ въ теченіе короткаго времени съ преобладающимъ ощущеніемъ зноба.

Обильный ночной потъ сильно кислаго запаха, также наклонность къ потѣнію во время дня на свѣжемъ, холодномъ воздухѣ, при умѣренномъ движеніи.

Дыхательные органы.

Усиленное чиханіе рано по утру и сильный текучій насморкъ.

Катарръ гортани и дыхательной трубки, охриплость, скопленіе большого количества вязкой слизи, кашлевое раздраженіе при переходѣ со свѣжаго воздуха въ теплую комнату, приступы кашля съ труднымъ отдѣленіемъ мокроты, сухой кашель; кашель съ кровянистою мокротою. Учащенное дыханіе, тяжелое, короткое, поверхностное, сжатіе груди; ощущенія болѣзненнаго давленія и колотья въ груди при глубокомъ дыханіи и кашлѣ.

Пищеварительные органы.

Полость рта: болѣзненныя десны съ ощущеніемъ выхожденія всѣхъ зубовъ, зубная боль, улучшающаяся на свѣжемъ воздухѣ, обложенный слизью языкъ, много пѣнообразной слюны. Затрудненное глотаніе вслѣдствіе воспалительнаго пораженія слизистой оболочки неба и миндалинъ. Испорченный, дурной, горькій вкусъ, отсутствіе аппетита. Чувство голода безъ вкусоваго ощущенія и аппетита; жестокая жажда днемъ и ночью; послѣ питья отрыжка, тошнота; послѣ ѣды давленіе въ желудкѣ, тошнота и рвота съѣденнымъ. Изжога, отрыжка, тошнота и рвота слизью и желчью. Ощущеніе давленія и опуханія въ области желудка; болѣзненныя ощущенія, колотья въ подреберіи справа и слѣва; болѣзненныя ощущенія въ полости живота, въ его покровахъ, въ кишечникѣ, вздутіе живота. Запоры, смѣняющіеся съ поносами; мягкій, водянистый и кровянистый стулъ, поносъ; непроизвольное отхожденіе жидкаго стула ночью во снѣ. Долго продолжающееся жженіе въ заднемъ проходѣ послѣ стула; выпаденіе прямой кишки.

Моче-половые органы.

Катарръ мочевого пузыря и судорога его мышцъ; частый позывъ на мочу при маломъ наполненіи пузыря, побужденіе къ возможно быстрому мочеиспусканію, невозможность долго задерживать мочу, жженіе при мочеиспусканіи, непроизвольное отхожденіе мочи при движеніяхъ. Повышенное мочеотдѣленіе.

Мужскіе половые органы. Зудъ и высыпь на членѣ, колющія ощущенія въ яичкахъ при сидѣніи.

Женскіе половые органы: ощущеніе колотья въ маткѣ, слишкомъ раннее наступленіе мѣсячныхъ.

Примѣненіе у больныхъ.

Примѣняется по преимуществу при острыхъ и лихорадочныхъ заболѣваніяхъ катарральнаго и ревматическаго характера, а именно: при катаррѣ гортани и бронховъ съ тяжелыми приступами кашля, болями въ груди, колотьями въ бокахъ; при воспаленіяхъ плевры и околосердечной сумки; при мышечномъ ревматизмѣ, остромъ суставномъ ревматизмѣ; при боляхъ въ желудкѣ, желудочно-кишечномъ катаррѣ; при воспаленіи печени; при коликахъ и воспаленіи кишекъ; при воспаленіи брюшины; при судорогѣ и катаррѣ мочевого пузыря; при гастрической и тифозной лихорадкѣ; при перемежающейся лихорадкѣ трехдневнаго типа; при ревматическихъ боляхъ головы и лица; при воспаленіяхъ глаза уха, кожи и подкожной клѣтчатки; при накожныхъ лихорадочныхъ сыпяхъ.

Вератрумъ.

(Veratrum album).

Общее. Важнѣйшее дѣйствіе—крайнее угнетеніе функціональной энергіи нервной системы. Небольшое возбужденіе быстро смѣняется угнетеніемъ, параличемъ двигательной сферы, чрезмѣрная чувствительность, экзальтація—потерей чувствительности, душевною тупостью. Итакъ, прежде всего разстраивается жизне-

дѣятельность нервныхъ элементовъ, а за нимъ слѣдуетъ измѣненіе крови и соковъ тѣла.

Состояніе духа — въ началѣ экзальтація, маніакальный бредъ, затѣмъ угнетеніе, упадокъ духа, меланхолія, апатія.

Нервная система.

Слабость мышленія и памяти. Судороги, конвульсіи, обмороки. Головокруженіе, головныя боли. Приливы крови къ головѣ. Болѣзненность, слабость, параличъ мышцъ, суставовъ.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, замедленный, малый пульсъ. Параличъ сердца. Лихорадочные пароксизмы: ознобъ, жаръ, потъ.

Органы дыханія.

Насморкъ, катарръ гортани и бронховъ, приступы сухого кашля. Астма, судороги въ груди.

Органы пищеваренія.

Жженіе во рту и горлѣ. Отрыжка, жажда, отвращеніе отъ теплой пищи, боли въ желудкѣ и кишкахъ, поносы со рвотою и приступами дурноты. Въ концѣ дѣйствія—запоръ.

Моче-половые органы.

Усиленное и непроизвольное мочеиспусканіе. Уменьшеніе выдѣленія. Боли въ каналѣ и пузырѣ, болѣзненность яичекъ, эрекціи.

Возвращеніе задержанныхъ мѣсячныхъ, раннее наступленіе, съ повсемѣстными болями и сильной жаждою.

Примѣненіе у больныхъ.

Вератрумъ примѣняется для излѣченія свѣжихъ и острыхъ заболѣваній, не носящихъ характера воспаленія, съ преобладающимъ пораженіемъ нервной системы, выражающемся въ періодическихъ приступахъ, при внезапныхъ упадкахъ энергіи нервныхъ отправленій, при обморокахъ, при слабости и угрожающемъ параличѣ сердца, при судорогахъ и параличныхъ состояніяхъ

членовъ, при душевныхъ болѣзняхъ—меланхоліи, маніи, и слабоуміи, при перемежающейся лихорадкѣ, періодически появляющихся нервныхъ боляхъ, при астмѣ, коклюшѣ, рвотѣ съ охлажденіемъ конечностей, при боляхъ въ желудкѣ и кишкахъ, водянистыхъ поносахъ, припадкахъ рвоты и поноса, холерѣ (вмѣстѣ съ Арсеникомъ и Купрумъ), накожныхъ сыпяхъ съ сильнымъ зудомъ.

Гамамелисъ.

(Hamamelis virginica).

По наблюденіямъ американскихъ врачей дѣйствіе этого средства имѣетъ много сходства съ дѣйствіемъ Арники и Пульсатилла, только его дѣйствіе на венозную систему является болѣе рѣзкимъ.

Наблюдается приливъ крови къ головѣ, переполненіе кровью сосудовъ оболочекъ мозга, давящія головныя боли.

Воспалительное состояніе глазъ съ выступленіемъ крови изъ капилляровъ безъ боли.

Частыя кровотеченія изъ носа.

Боли въ крестцѣ и пахахъ, въ суставахъ конечностей.

Катарральныя пораженія гортани и бронховъ, переполненіе кровью легкихъ, съ разрывомъ сосудовъ, кровотеченіе. Сжиманіе груди, одышка.

Воспалительныя пораженія слизистой оболочки рта, зѣва, пищевода, желудка.

Боли въ области печени и селезенки. Вздутіе живота, колики. Слизистый стулъ; запоры, съ позывами, твердыя темнобурыя каловыя массы, покрытыя слизью. Кашицеобразный стулъ. Опуханіе геморроидальныхъ шишекъ.

Катарръ почекъ, незначительное выдѣленіе темной мочи, позывы на мочу, жженіе въ каналѣ при мочеиспусканіи.

Половое возбужденіе, поллюціи, затѣмъ слабость и разслабленіе, исчезновеніе полового чувства.

Маточныя кровотеченія между двумя періодами регулъ, приливы къ маткѣ и яичникамъ, болѣзненныя мѣсячныя.

Примѣненіе у больныхъ.

При кровотеченіяхъ изъ различныхъ органовъ: изъ носа, бронховъ, легкихъ, желудка, кишечника, матки и мочевого канала; при воспаленіи венъ и варикозныхъ узкахъ, геморроидальныхъ шишкахъ; при воспалительныхъ пораженіяхъ матки и яичниковъ, при невралгіи мошонки; при ревматическихъ пораженіяхъ суставовъ безъ значительной лихорадки; послѣ механическихъ насилій съ изліяніемъ крови въ клѣтчатку и поврежденіемъ различныхъ тканей. Какъ для Арники, такъ и здѣсь находитъ примѣненіе снаружи тинктура растенія.

Геллеборусъ.

(Helleborus niger).

Общее. По наблюденіямъ v. Schroff'a Геллебореинъ поражаетъ первично гангліи Plexus coeliacus (узлы симпатической системы кишечника) и сердца, до полнаго паралича этого органа.

Большая тяжесть и чувствительность мышцъ всѣхъ членовъ, боли различнаго рода на различныхъ частяхъ тѣла, разслабленіе мускулатуры, параличи, анестезіи. Дрожанія, подергиванія мышцъ, конвульсивныя движенія, судороги, внезапное паденіе безъ потери сознанія съ холоднымъ потомъ на лбу, холодными конечностями, замедленнымъ пульсомъ и суженными зрачками; приступы дурноты. Выступленіе крови изъ тканей, выпаденіе волосъ, ногтей. Ухудшеніе и частью наступленіе разстройствъ вечеромъ, улучшеніе на свѣжемъ воздухѣ. Сонъ глубокій съ сильною сонливостью днемъ, безпокойныя сновидѣнія; къ утру сонъ дѣлается неспокойнымъ.

Покойное, сосредоточенное настроеніе духа; сильное возбужденіе съ бредомъ и умопомѣшательствомъ, слабость воли, нерѣшительность.

Кожныя пораженія, шелушеніе, пузырьки, струпья, желтоватое окрашиваніе лица, блѣдное, осунувшееся лицо, водяночное опуханіе кожи и подкожной клѣтчатки, Болѣзненность отдѣльныхъ железъ

Нервная система.

Мозгъ. Ослабленіе и разстройство интеллектуальныхъ отправленій, слабость памяти, воли. Головокруженіе, оглушеніе, боли головы, пульсація артерій, переполненіе кровью мозга. Подергиванія вѣкъ, воспалительное опуханіе вѣкъ, переполненіе кровью сосудовъ соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока, свѣтобоязнь, расширеніе зрачковъ.

Боли (одной половины лица) въ носу, ухѣ, зубахъ.

Боли въ лопаткахъ, спинѣ, поясницѣ и крестцѣ.

Болѣзненныя подергиванія различныхъ мышцъ, суставовъ. Боли въ подошвахъ и большомъ пальцѣ ноги.

Органы кровообращенія.

Въ началѣ усиленное сердцебіеніе и учащеніе пульса, затѣмъ замедленный малый, дрожащій пульсъ, давящее ощущеніе въ сердцѣ, неправильный пульсъ, параличъ сердца.

Лихорадочное состояніе: ознобъ, приступы жара, повсемѣстный потъ по утру; холодный потъ; жаръ въ лицѣ.

Органы дыханія.

Чиханіе рано утромъ съ опуханіемъ верхней губы, раздраженіе слизистой оболочки носа (щекотаніе въ носу), текучій насморкъ. Стягиваніе въ гортани, приступы сухого покашливанія, кашель съ сильнымъ чиханіемъ; приступы задушенія, тяжелое дыханіе, ощущеніе колотья и рѣзи въ груди при дыханіи.

Пищеварительные органы.

Языкъ движется съ трудомъ, болѣзненъ и покрытъ мелкими пузырьками, слюнотеченіе, затрудненное глотаніе; слизистый вкусъ съ сильною жаждою, повышенный аппетитъ и голодъ, отвращеніе къ пищѣ при нормальныхъ вкусовыхъ ощущеніяхъ. Пустая отрыжка, наклонность ко рвотѣ, тошнота и рвота съ приступами дурноты и поносами, рвота слизью и желчью. Жженіе, судороги, боли въ желудкѣ. Вздутіе живота, колики, вѣтры, позывы на стулъ, трудное опорожненіе съ незначительнымъ отхожденіемъ твердыхъ массъ

съ болями въ прямой кишкѣ. Сильный поносъ желчноокрашенными массами, съ тошнотою, рѣзью въ животѣ (и также рвотой), непроизвольное отхожденіе кала, выдѣленіе студенистой слизи, кровянистый стулъ.

Моче-половые органы.

Катарръ почекъ; незначительное отдѣленіе мочи, сильные позывы, очень насыщенная, темная моча, ослабленіе мышцъ пузыря, затрудненное и замедленное истеченіе мочи.

Отсутствіе полового чувства. Ускоренное наступленіе мѣсячныхъ.

Примѣненіе у больныхъ.

При душевныхъ болѣзняхъ съ сильными приливами къ головѣ, при воспаленіи мозговыхъ оболочекъ, конвульсіяхъ, эпилептическихъ судорогахъ, при сердечныхъ разстройствахъ, угрожающихъ параличемъ, при поносѣ и рвотѣ, разстройствахъ кишечника, при катаррѣ почекъ и слабости (атоніи) пузыря, при хроническихъ накожныхъ заболѣваніяхъ, при злокачественной перемежающейся лихорадкѣ, при скарлатинозной водянкѣ.

Гельземіумъ.

(Gelsemium sempervirens).

Общее. Сильная слабость и усталость; общее чувство недомоганія и истощеніе, ощущеніе легкости тѣла, чувство паралича рукъ и ногъ, внезапно наступающія, стрѣлою проходящія по нервнымъ стволамъ боли; параличи разнаго рода и судороги.

Сонъ неспокойный, полный сновидѣній; глубокій обморочный сонъ, — безсонница вслѣдствіе живого хода мыслей, сонливость днемъ и продолжительный глубокій сонъ утромъ. Раздражительное и нетерпѣливое состояніе духа, безучастное и недовольное.

Зудъ кожи, съ высыпью пузырьковъ и пустулъ, пятнистая кожная сыпь, похожая на скарлатину и корь. Цвѣтъ лица или необыкновенно блѣдный или сильно красный, иногда желтушный. Опуханіе справа паховыхъ лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы: параличное состояніе душевныхъ отправленій, неясное, запутанное мышленіе, невозможность фиксаціи вниманія на опредѣленномъ предметѣ, отвращеніе отъ рѣчи и всякаго умственнаго напряженія, состояніе оглушенія, маніакальные приступы, бредъ. Переполненіе кровью мозга и мозговыхъ оболочекъ, головокруженіе, головныя боли, пульсація артерій, параличное опущеніе верхняго вѣка, лицевыя боли, орбитальная невралгія, судорожное сжатіе челюстей. Невозможность рѣчи вслѣдствіе паралича Nervi hypoglossi.

Боли въ глазномъ яблокѣ, циліарная невралгія, переполненіе кровеносныхъ сосудовъ соединительной оболочки глазъ, желтушное окрашиваніе глазного яблока. Расширеніе зрачка, потеря конвергенціи глазъ — двойное зрѣніе, помутнѣніе и ослабленіе зрѣнія, временная утрата возможности видѣть.

Шумъ въ ушахъ, временная утрата слуха. Кровотеченіе изъ носа, высмаркиваніе кровянистой слизи.

Боли въ мышцахъ затылка, спины, особенно въ поясничной и крестцовой области. Ревматоидныя боли въ мышцахъ и суставахъ верхнихъ и нижнихъ конечностей, слабость и онѣмѣніе въ обѣихъ рукахъ, параличъ сгибательныхъ мышцъ, менѣе выпрямляющихъ; жаръ и сухость ладоней—холодныя руки.

Мышечныя и суставныя боли въ нижнихъ конечностяхъ, сильныя, быстро появляющіяся, стрѣляющія боли по нервамъ, тяжесть ногъ, невѣрная походка, начинающійся параличъ; судорожныя подергиванія въ различныхъ мышечныхъ пучкахъ; холодныя голени и ступни.

Органы кровообращенія.

Ускоренная дѣятельность сердца съ полнымъ и частымъ пульсомъ; замедленныя и слабыя сокращенія сердца съ малымъ, нитевиднымъ пульсомъ; неправильныя движенія сердца съ исчезающимъ пульсомъ, возвращеніе припадковъ чрезъ 8—10 дней. Лихорадочное состояніе съ ознобомъ и жаромъ.

Органы дыханія.

Насморкъ. Охриплость, временное исчезновеніе голоса (парезъ голосовыхъ связокъ), ощущеніе царапанія и болей въ гортани и бронхахъ, кашель, хрипы, судорога голосовой щели, короткій и сухой кашель. Боли въ груди при глубокомъ дыханіи и кашлѣ, легкое и поверхностное дыханіе, стягивающія боли въ нижней части груди.

Пищеварительные органы.

Сухость полости рта, языкъ обложенъ желтымъ налетомъ, трудно движется, неполный параличъ языка; воспаленіе железъ зѣва, затрудненіе глотанія, скопленіе вязкой слизи въ зѣвѣ, болѣзненность при поворачиваніи языка, судорога глотанія, сильная жажда, дурной вкусъ, смѣна усиленія и пониженія аппетита.

Тошнота, глотательныя движенія, отрыжка воздухомъ и выбрасываніе изъ желудка кислой жидкости, жгучія и колющія боли въ желудкѣ, урчаніе.

Боли печени, переполненіе кишечника газами, урчаніе въ животѣ, выдѣленіе вѣтровъ.

Жидкія и желчныя испражненія съ судорогами въ заднепроходной мышцѣ; трудно отходящій, кашицеобразный стулъ свѣтложелтаго цвѣта. Геморроидальныя боли.

Моче-половые органы.

Затрудненное мочеиспусканіе, прерывистая струя; учащенное и усиленное выдѣленіе свѣтлой и водянистой мочи; частые позывы; непроизвольное отхожденіе мочи днемъ и ночью. Ощущеніе царапанія въ мочевомъ каналѣ при мочеиспусканіи. Поллюціи безъ эрекцій, вялость и охлажденіе половыхъ органовъ. Боли, чувство тяжести и давленія въ маткѣ съ выдѣленіемъ бѣлей; болѣзненное появленіе мѣсячныхъ, за день до регулъ сильная мигрень со рвотою и болями.

Примѣненіе у больныхъ.

При заболѣваніяхъ, какъ лихорадочныхъ, такъ и безъ лихорадки: при перемежающейся лихорадкѣ, при катарральныхъ, гастрическихъ, тифозныхъ и ревматическихъ лихорадкахъ, при скарлатинѣ и кори; при воспалительныхъ пораженіяхъ мозга и мозговыхъ оболочекъ, при приступахъ помѣшательства, меланхоліи, при различнаго рода невралгіяхъ и параличахъ, страданіяхъ глазъ и ушей; при пораженіяхъ печени съ желтухою, при коликахъ и поносахъ; при судорогахъ пузыря, непроизвольномъ мочеиспусканіи—недержаніи мочи, катарральныхъ пораженіяхъ слизистой оболочки мочевого канала, невралгіи мошонки, разслабленіи половыхъ частей съ потерями сѣмени, коликахъ въ маткѣ съ болями, періодическихъ мигреняхъ.

Гепаръ сульфурисъ.

(Hepar sulfuris calcareum).

Общее. Ощущеніе общей разбитости всѣхъ членовъ и сильнаго утомленія уже рано утромъ съ нежеланіемъ вставать послѣ хорошаго сна; усталость, разбитость, разслабленіе, тяжесть, ломота, сонливость, приступы сердцебіенія и дурноты цѣлый день; чрезмѣрная чувствительность и раздражительность всей нервной системы; свѣжій воздухъ кажется непріятнымъ, дрожаніе колѣней, жженіе подошвъ при ходьбѣ, колотья въ колѣнкахъ при покоѣ и движеніи, сверлящія, тянущія, рѣжущія, давящія боли въ различныхъ частяхъ тѣла, опуханіе ихъ, съ краснотой и жаромъ; временная желтуха.

Сонъ продолжительный и похожій на обморочное состояніе, трудное засыпаніе, безпокойный сонъ и безсонница при очень возбужденной фантазіи.

Состояніе духа: сильное возбужденіе, приступы тоски и жестокости, недовольство собою и другими, угнетеніе, отчаяніе, меланхолическіе приступы съ попытками къ самоубійству.

Шершавость кожи, цвѣтеніе ея, шелушеніе эпителіальнаго слоя, воспаленіе мальпигіева слоя, небольшія поврежденія нагнаиваются

и долго не заживаютъ. Всевозможныя формы сыпей. Выпаденіе волосъ.

Воспаленіе и образованіе нарывовъ въ подмышечныхъ железахъ, воспалительныя припуханія и болѣзненность паховыхъ железъ, опуханіе миндалинъ.

Нервная система.

Мозгъ. Состояніе возбужденія, затѣмъ упадокъ энергіи, съ ослабленіемъ мышленія и памяти. Головокруженіе, тяжесть и боли головы, приливъ крови.

Боли въ глазныхъ впадинахъ, воспаленіе вѣкъ и мейбомієвыхъ железъ (Blepharitis ciliaris) со слизистымъ отдѣленіемъ; жженіе, жаръ и болѣзненность глазного яблока, воспаленіе соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока (конъюнктивитъ), свѣтобоязнь, ослабленіе силы зрѣнія.

Воспаленіе наружнаго слухового прохода, шумы въ ушахъ, усиленное отдѣленіе сѣры.

Воспалительная краснота, жаръ и опуханіе носа.

Боли въ мышцахъ затылка, спины, груди, поясницѣ и крестцѣ. Боли въ суставахъ, дрожаніе конечностей, жженіе, зудъ въ ладоняхъ и подошвахъ.

Органы кровообращенія.

Сильное сердцебіеніе и колющія боли въ области сердца. Наклонность волосныхъ сосудовъ (капилляровъ) къ разрывамъ и кровотеченію. Сильное лихорадочное движеніе: потрясающій ознобъ, затѣмъ жаръ и потъ; жгучій, лихорадочный жаръ съ сильною жаждою, съ боязнью раскрыться и потѣющими руками; легкое потоотдѣленіе по всему тѣлу при малѣйшемъ движеніи, продолжительное потѣніе головы. Жестокій, потрясающій ознобъ съ сонливостью, бредомъ, рвотой и поносомъ.

Органы дыханія.

Частое чиханіе, насморкъ, воспалительное опуханіе носа, отдѣленіе дурнопахнущей слизи.

Слабость голосового аппарата, трудность громкаго разговора, щекотаніе въ гортани, скопленіе слизи, кашель съ наклонностью ко рвотѣ, выдѣленіе крови.

Позывы на глубокіе вздохи, сжатіе груди и короткое дыханіе; переполненіе кровью; ощущенія давленія, растяженія, жара и болѣзненнаго колотья въ груди.

Органы пищеваренія.

Воспалительное опуханіе, разрыхленіе, кровоточивость десенъ, зубная боль, усиливающаяся при дотрогиваніи; воспаленіе слизистой оболочки рта, усиленное слюнотеченіе. Воспаленіе железъ въ зѣвѣ, разстройство глотанія.

Ненормальный вкусъ, параличъ вкусового чувства, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ пищѣ, позывы на кислое и соленое, сильная жажда. Частыя пустыя отрыжки, вздутіе области желудка; тошнота и рвота желчными и слизистыми массами рано утромъ, кислая рвота послѣ обѣда, давленіе и тяжесть въ желудкѣ при малѣйшемъ пріемѣ пищи. Вздутіе живота, вѣтры, колющія боли въ области печени при ходьбѣ; колики, болѣзненное урчаніе въ животѣ.

Сильные позывы безъ опорожненія на низъ, позывы съ труднымъ испражненіемъ, вслѣдствіе ослабленной дѣятельности кишекъ только при помощи единственнаго давленія брюшныхъ мышцъ; частый, небольшой стулъ, жидкій стулъ съ рѣзью; частый желчный стулъ съ примѣсью крови и слизи, съ болью и натуживаніемъ. Выхожденіе геморроидальныхъ шишекъ, кровотеченія изъ геморроидальныхъ венъ.

Моче-половые органы.

Слабость мышцъ мочевого пузыря, медленное истеченіе мочи; болѣзненное колотье въ мочевомъ каналѣ съ труднымъ и болѣзненнымъ отдѣленіемъ мочи—странгурія и дизурія; медленное мочеиспусканіе съ недостаточнымъ опорожненіемъ пузыря; обильное мочеиспусканіе, по окончаніи—нѣсколько капель крови, жженіе въ мочевомъ каналѣ. Половое возбужденіе съ болѣзненными эрекціями; уменьшенное половое чувство, разслабленіе половыхъ

частей, выдѣленіе сока предстательной железы при испражненіи. Маточныя кровотеченія, задержанныя и скудныя мѣсячныя.

Примѣненіе у больныхъ.

При золотушныхъ пораженіяхъ—кожи, глазъ, ушей, при хроническомъ насморкѣ, воспаленіи полости рта и миндалинъ, опуханіи железъ, задержкѣ выдѣленій (которыя должны подвергнуться всосанію, или удаленію процессомъ нагноенія), язвахъ съ недостаточнымъ нагноеніемъ, язвахъ десенъ (попеременно съ Силицеа), при отравленіи ртутью, ртутной кахексіи, при катаррахъ гортани и бронховъ, съ наклонностью къ кровотеченіямъ, для предупрежденія послѣднихъ, при катаррахъ желудка и кишекъ съ опуханіемъ мезентеріальныхъ железъ золотушнаго характера, при образованіи язвъ въ кишечникѣ, затяжномъ хроническомъ воспаленіи прямой и толстыхъ кишекъ послѣ поноса, при слабости мышцъ мочевого пузыря, въ частности—при парезѣ детрузора пузыря (мышцы, запирающей пузырь), при воспаленіи мочевого канала и пузыря, главнымъ образомъ, хроническомъ, при геморроидальныхъ разстройствахъ пузыря и прямой кишки, при опуханіи печени, катаррѣ желчнаго протока съ желтухою, при воспаленіи почекъ, особенно при скарлатинѣ, съ послѣдующей водянкою (къ сему Геллеборусъ); при пережемающейся лихорадкѣ, хроническаго характера, при застарѣлыхъ формахъ подагры и ревматизма суставовъ, при подергиваніяхъ мышцъ и невралгіяхъ, общихъ судорогахъ, даже эпилептическихъ, частыхъ приступахъ головокруженія и дурноты, параличѣ отдѣльныхъ нервныхъ вѣтвей.

Гіосціамусъ.

(Hyosciamus niger).

Общее. Имѣютъ извѣстный интересъ изслѣдованія проф. Ф. Шроффа объ отношеніи гіосціамина къ родственнымъ алколоидамъ: атропину (Белладонна) и датурину (Страмоніумъ). Всѣ три алколоида имѣютъ между собою сходство въ томъ отношеніи, что они расширяютъ зрачекъ, производятъ сухость рта, зѣва, гортани, бронховъ, внѣшнихъ покрововъ, отсюда охриплость, за-

трудненное глотаніе: въ большихъ дозахъ они обусловливаютъ отяжелѣніе головы, головокруженія, галлюцинаціи, бредъ; въ малыхъ—ослабляютъ дѣятельность сердца и уменьшаютъ частоту пульса, въ большихъ дозахъ послѣ быстро появляющагося уменьшенія частоты пульса наступаетъ столь быстрое повышеніе сверхъ нормы.

Различія въ дѣйствіи этихъ алколоидовъ наблюдаются слѣдующаго рода: гіосціаминъ превосходитъ атропинъ и датуринъ въ своемъ мѣстномъ дѣйствіи на глазъ—расширеніи зрачка, при равныхъ количествахъ болѣе быстромъ и интенсивномъ и держащемся болѣе долгое время; въ остальныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ датуринъ превосходитъ вдвое атропинъ, гіосціаминъ дѣйствуетъ слабѣе этихъ алколоидовъ. Датуринъ и атропинъ въ большихъ дозахъ постоянно производятъ эритему (покраснѣніе) кожи, почти, какъ при скарлатинѣ; подобное дѣйствіе при гіосціаминѣ наблюдается очень рѣдко; атропинъ и датуринъ производятъ экстатическое состояніе, буйный бредъ, припадки бѣшенства, съ послѣдующими явленіями упадка и истощенія силъ; при гіосціаминѣ и то, и другое состояніе отсутствуютъ, является наклонность къ покою и сну, и лишь послѣ большой дозы наступаетъ вышеописанное состояніе. Датуринъ и атропинъ въ большихъ дозахъ производятъ разслабленіе (параличъ) запирающихъ мышцъ задняго прохода и мочевого пузыря, чего при гіосціаминѣ не наблюдается или крайне рѣдко, что тѣмъ болѣе кажется страннымъ, что гіосціаминъ парализуетъ сфинктеръ зрачка (сжимающую мышцу) болѣе сильно, чѣмъ атропинъ и датуринъ. Слѣдовательно, гіосціаминъ—вещество не тождественное съ атропиномъ и датуриномъ; что видно изъ того, что гіосціаминъ легко растворяется въ водѣ, а датуринъ и атропинъ легко растворяются только въ спиртѣ. Хотя гіосціаминъ и имѣетъ снотворныя свойства, однако, отъ опія онъ отличается отсутствіемъ задерживающаго стулъ дѣйствія, при чемъ онъ скорѣе дѣйствуетъ послабляющимъ образомъ, чѣмъ пріостанавливающимъ. При продолжительномъ употребленіи наблюдается кромѣ того сильныя кровотеченія изъ матки, поты и своеобразныя накожныя сыпи.

Большинство разстройствъ особенно выступаютъ послѣ обѣденнаго времени и особенно сильно въ вечерніе часы.—Необходимая наклонность ко сну, сны наяву, продолжительный и глу-

бокій сонъ, обморочный сонъ со скрипѣніемъ зубовъ, позднѣе засыпаніе съ раннимъ пробужденіемъ, безпокойный сонъ.

Состояніе духа: возбужденное до состоянія экстаза, припадки безумія. Подавленное состояніе, меланхолія, тупое равнодушіе.

Зудъ, жженіе, краснота кожи, высыпи. Воспалительныя опуханія слюнныхъ и миндалевидныхъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы. Возбужденіе и разслабленіе. Умопомѣшательство. Бредъ. Ослабленіе мышленія и памяти.

Приливы крови къ головѣ. Боли головныя. Головокруженіе. Приступы эпилептическихъ судорогъ.

Судорога глазныхъ мышцъ, выпячиваніе и вращеніе глазъ. Приливъ крови, катарръ, со слизистымъ отдѣленіемъ; сильное расширеніе зрачковъ; ослабленіе остроты зрѣнія, близорукость, обманы зрѣнія: ярко окрашенные предметы, двойное зрѣніе.

Боли, шумъ въ ушахъ, ослабленіе слуха, глухота.

Приливы крови и переполненіе кровью кровеносныхъ сосудовъ носа, носовыя кровотеченія, отсутствіе обонянія.

Судорожныя сокращенія мышцъ затылка и спины, боли въ поясницѣ и крестцѣ. Дрожаніе, ревматическія боли въ рукахъ. Параличъ и охлажденіе ногъ, боли въ суставахъ.

Органы кровообращенія.

Усиленныя, бурныя, неправильныя сокращенія сердца. Ускоренный, полный и сильный пульсъ; малый, нѣсколько ускоренный пульсъ,—медленный, малый, едва ощутимый пульсъ, уменьшеніе числа ударовъ съ 85 до 59 въ теченіе одного часа. Лихорадочное состояніе: продолжительный, сильный ознобъ съ послѣдующимъ потомъ, усиленный напоръ крови къ кожѣ съ ощущеніемъ сильнаго жара, до жженія, сильный жаръ съ жестокою жаждою, повсемѣстный сильный потъ.

Органы дыханія.

Частое чиханіе безъ насморка, сухость слизистой оболочки носа.

Ощущеніе жара и колющія боли въ гортани, нечистый голосъ съ хрипѣніемъ, сухое покашливаніе съ ощущеніемъ поцарапыва-

нія въ горлѣ; судорожный сухой кашель съ ночнымъ ухудшеніемъ особенно при лежаніи, проходитъ при вставаніи, откашливается зеленовато-слизистая мокрота. Сжиманіе въ груди, короткое дыханіе, при вздохѣ—колотье въ груди.

Органы пищеваренія.

Зубная боль (скрипѣніе зубами во снѣ), запахъ изо рта, воспаленіе слизистой оболочки рта, слюнотеченіе, сухость въ зѣвѣ и глоткѣ, затрудненное глотаніе вслѣдствіе воспаленія миндалинъ, Отвращеніе къ питью, послѣ питья конвульсіи съ потерею сознанія. Отсутствіе аппетита при нормальныхъ вкусовыхъ ощущеніяхъ. Отрыжка. Мутитъ. Тошнота безъ рвоты. Рвота массою слизи и желчи. Боли и воспаленіе желудка. Вздутіе живота. Колики. Рѣдкіе вѣтры съ позывами на стулъ. Запоры. Отхожденіе твердыхъ каловыхъ массъ. Поносъ съ урчаніемъ въ кишкахъ, рѣзью; слизистый и желчный стулъ, непроизвольныя испражненія. Геморроидальныя истеченія.

Моче-половые органы.

Задержаніе мочи, вслѣдствіе недѣятельности мышцъ пузыря,—частые позывы съ незначительнымъ и болѣзненнымъ выдѣленіемъ мочи—позднѣе обильное и частое мочеиспусканіе.

Половое возбужденіе, эрекціи, состояніе, близкое къ сатиріазису. Временная утрата половой силы.

Нимфоманія, воспалительное состояніе слизистой оболочки половыхъ органовъ. Слишкомъ ранее (на 14 дней) наступленіе мѣсячныхъ, сильное мѣсячное кровотеченіе.

Примѣненіе у больныхъ.

При воспалительномъ раздраженіи и переполненіи кровью мозга и мозговыхъ оболочекъ съ конвульсивными движеніями или мышечными подергиваніями и тетаническими явленіями—каталепсіи; при воспалительныхъ пораженіяхъ тканей глаза съ краснымъ окрашиваніемъ предметовъ и двойнымъ зрѣніемъ, при ночныхъ боляхъ въ ушахъ, глухотѣ, лицевыхъ боляхъ; при душевныхъ разстройствахъ съ характеромъ извращенія и помѣшательства, при эротическо-экстатическомъ состояніи, нимфоманіи

и сатиріазисѣ; при ночныхъ припадкахъ судорожнаго кашля, улучшающагося отъ вставанія; при потерѣ обонянія съ кровотеченіемъ изъ носу; при боляхъ и воспаленіи желудка и тонкихъ кишекъ, съ тошнотою и рвотою, коликахъ, поносахъ; при судорогѣ и параличѣ мочевого пузыря, половомъ возбужденіи, слишкомъ раннихъ и обильныхъ мѣсячныхъ, маточномъ кровотеченіи, при ревматическихъ и подагрическихъ пораженіяхъ нервныхъ стволовъ и суставовъ.

Графитъ.

(Graphites).

Общее. Колющія, жгущія, тянущія и давящія боли въ различныхъ частяхъ тѣла; разбитость, разслабленіе, внезапный упадокъ силъ, дурнота и ощущеніе приближающагося обморока при малѣйшемъ движеніи на свѣжемъ воздухѣ; боязнь свѣжаго воздуха, сильная чувствительность къ сквозняку. Сонъ безпокойный, сонливость днемъ.

Возбужденное состояніе духа, отвращеніе къ работѣ, наклонность плакать.

Краснота и зудъ кожи, съ высыпаніемъ пузырьковъ, содержащихъ жидкость; всевозможныя формы кожныхъ сыпей: папулы, узелки, бляшки, пузырьки, гнойнички, чирьи и пр.

Воспалительное опуханіе и болѣзненность подчелюстныхъ, слюнныхъ, миндалевидныхъ, лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы. Уменьшенная энергія умственныхъ отправленій: разсѣянность, забывчивость, слабость мышленія. Головокруженіе. Головныя боли. Судорога различныхъ личныхъ мышцъ. Параличи лицевыхъ нервовъ. Трудность движеній языка и разговора, невралгіи орбитальныхъ нервовъ. Воспалительное опуханіе вѣкъ, краснота и зудъ края вѣкъ. Воспалительное пораженіе соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока со слизистымъ отдѣленіемъ, усиленнымъ слезотеченіемъ, особенно на свѣжемъ воздухѣ, свѣтобоязнь, близорукость, двойное зрѣніе.

Шумъ въ ушахъ, тугоухость, гное—и кровотеченіе изъ уха. Боли въ мышцахъ, суставахъ, невралгіи. Онѣмѣніе конечностей, особенно пальцевъ.

Органы кровообращенія.

Сильное сердцебіеніе, съ пульсаціей артеріи; лихорадочный ознобъ, приступы какъбы перемежающейся лихорадки, потрясающій знобъ, затѣмъ жаръ съ холодными ногами безъ періода потоотдѣленія.

Органы дыханія.

Чиханіе при сухости слизистой оболочки носа, смѣняющееся слизеотдѣленіе, то жидкое, то густое. Катарръ гортани, бронховъ, вечеромъ охриплость, частый короткій и сухой кашель, выкашливаніе слизи, сжатіе груди при движеніи на свѣжемъ воздухѣ.

Органы пищеваренія.

Воспалительное опуханіе и легкая кровоточивость десенъ, зубная боль (особенно ночью), ухудшающаяся отъ тепла. Запахъ мочи изо рта и носа, обложенный языкъ, усиленное слюнотеченіе, воспаленіе мягкаго неба и миндалинъ, затрудненіе глотанія, скопленіе слизи въ горлѣ. Непріятный вкусъ, мѣняющійся аппетитъ, отвращеніе къ мясной пищѣ, жажда послѣ холоднаго питья, изжога, отрыжка, тошнота съ истеченіемъ воды изо рта, рвота по утрамъ большимъ количествомъ слизи при хорошемъ аппетитѣ; рвота съѣденною пищею, судорога желудка, жженіе, колотье и давленіе въ желудкѣ, ощущеніе холода и пустоты въ желудкѣ.

Вздутіе живота, боли въ кишечникѣ, колики съ урчаніемъ. Отхожденіе вонючихъ вѣтровъ, позывы съ затрудненнымъ опорожненіемъ, нѣсколько разъ повторяющееся отхожденіе кашицеобразныхъ массъ. Жидкія, слизистыя испражненія съ небольшою примѣсью крови; твердыя, комкообразныя каловыя массы, покрытыя слизью; отсутствіе позывовъ на стулъ, геморроидальныя боли въ заднемъ проходѣ. Выпаденіе прямой кишки безъ позывовъ на стулъ, какъ при параличѣ; зудъ въ заднемъ проходѣ.

Моче-половые органы.

Ощущеніе жженія въ мочевомъ каналѣ, позывы съ рѣзью, отхожденіе мочи каплями, странгурія и дизурія; ночные позывы на мочу, частое и обильное мочеотдѣленіе, непроизвольное мочеиспусканіе, ночное недержаніе мочи, ощущеніе жженія и саднѣнія въ мочевомъ каналѣ при мочеиспусканіи.

Тянущія боли въ мошонкѣ, эрекціи безъ сладострастныхъ мыслей, исчезновеніе ощущенія половыхъ наслажденій.

Колики въ маткѣ, опуханіе яичниковъ съ сильными болями, опаздываніе мѣсячныхъ на 3, 7, 9, 11 дней, прекращеніе ихъ, ускореніе на 2—3 дня съ отхожденіемъ жидкой крови и болями въ крестцѣ, исчезающими при движеніи. Послѣ регулъ сильныя, жидкія бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

При хроническихъ болѣзненныхъ разстройствахъ, а именно: при различныхъ накожныхъ сыпяхъ, выпаденіи и посѣдѣніи волосъ, поврежденіяхъ кожи, изъязвленіи сосковъ, при хроническомъ насморкѣ, катаррѣ бронховъ, хроническомъ воспаленіи глазъ, при ячменѣ и воспаленіи вѣкъ, при воспаленіи наружнаго слухового прохода, ушной раковины, шумѣ въ ушахъ, глухотѣ; при хроническомъ опуханіи железъ, при хроническомъ желудочно-кишечномъ катаррѣ, опуханіи печени, судорогѣ желудка, коликахъ и газахъ, неправильномъ стулѣ, геморроидальныхъ разстройствахъ, выпаденіи прямой кишки; при судорогѣ и катаррѣ мочевого пузыря, при ночномъ недержаніи мочи, непроизвольномъ отхожденіи мочи; при скрытой, перемежающейся лихорадкѣ, водяночныхъ опухоляхъ, ревматическихъ и подагрическихъ припадкахъ, при явленіяхъ паралича отдѣльныхъ мозговыхъ нервовъ, различныхъ судорожныхъ состояніяхъ; при неправильныхъ мѣсячныхъ и бѣляхъ, ненормальномъ состояніи (возбужденія или угнетенія) половыхъ органовъ.

Дрозера.

(Drosera rotundifolia).

Общее. Члены колетъ иглами, особенно въ суставахъ, слабость, боли въ мышцахъ, ухудшеніе ночью или въ ранніе утренніе часы.

Сонъ прерывается кошмарами.

Лихорадочное состояніе: ознобъ ежедневно до полудня, длительное состояніе жара, послѣ полуночи потъ.

Состояніе духа неспокойное, тоскливое, раздражительное и подавленное.

Нервная система.

Головная боль надъ глазами при каждомъ шагѣ и при наклоненіи головы, облегченіе при подпираніи головы, боли при жеваніи, подергиванія личныхъ мышцъ.

Ревматическія боли въ затылкѣ, спинѣ, между крыльцами, въ поясницѣ, въ крестцѣ, въ суставахъ, въ костяхъ верхнихъ и нижнихъ конечностей.

Органы дыханія.

Чиханіе, текучій насморкъ, катарръ гортани и дыхательныхъ трубокъ, кашлевое раздраженіе, выкашливаніе слизи, охриплость, сжатіе груди, ночные приступы кашля съ рвотою и кровотеченіемъ. Судороги грудобрюшной преграды.

Органы пищеваренія.

Воспаленіе слизистой оболочки полости рта и языка съ образованіемъ язвъ, слюнотеченіе, изжога, отсутствіе аппетита, рвота передъ пищею, послѣ ѣды тошнота; рвота желчью и кровью, большею частью рано утромъ или ночью. Рѣзи въ животѣ съ поносомъ, кашицеобразный стулъ, выдѣленіе кровянистой слизи при испражненіи, съ болями въ животѣ и крестцѣ.

Мочевые органы.

Частые позывы съ незначительнымъ выдѣленіемъ, по каплямъ,—обильное выдѣленіе водянистой мочи.

Примѣненіе у больныхъ.

При нервныхъ пораженіяхъ глазъ и ушей, tic douloureux, ревматическихъ боляхъ, при отсутствіи аппетита, слизистой и желчной рвотѣ рано утромъ или натощакъ, рвотѣ кровью съ коликой, при коклюшѣ, особенно, когда приступы являются рѣдко днемъ, а большею частью ночью и сопровождаются кровотеченіями изъ носа и рта, при лихорадкѣ съ приступами въ утренніе часы.

Дулькамара.

(Solanum dulcamara).

О б щ е е. Дѣйствующее начало—соланинъ, по изслѣдованіямъ v. Schroff'a, даетъ слѣдующіе результаты: въ малыхъ дозахъ—повышенная кожная чувствительность, угнетеніе безъ предшествующей стадіи возбужденія, сонливость, учащеніе пульса. Въ большихъ дозахъ—быстрое и значительное учащеніе пульса, затрудненное дыханіе, сжатіе груди, отрыжка, тошнота, позывы на рвоту безъ таковой, урчаніе въ животѣ; царапаніе въ горлѣ, охриплость, слюнотеченіе, боль головы и головокруженіе, конечности холодны, кожа суха и зудитъ, отхожденія стула и мочи безъ измѣненія. Послѣ очень большихъ дозъ—рвота, поносъ, потъ, высыпи на кожѣ, усиленное мочеотдѣленіе, конвульсіи и параличъ. Смерть слѣдуетъ вслѣдствіе паралича легкихъ.

Ухудшеніе въ вечерніе и ночные часы и подъ вліяніемъ свѣжаго воздуха.

Сонъ безпокойный, прерывистый, сонливость днемъ.

Настроеніе духа измѣнчивое, съ характеромъ нетерпѣнія.

Жаръ, зудъ и жженіе кожи, в ы с ы п и; опуханіе лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы: разстройство умственной сферы, головныя боли, особенно во лбу и вискахъ—утромъ и вечеромъ, головокруженіе, наклонность къ обморокамъ. Разговоръ затрудненъ, вслѣдствіе трудной подвижности языка. Воспаленіе соединительной оболочки глазъ. Шумъ въ ушахъ. Очень сильное кровотеченіе изъ носа (свѣтло-красная кровь изъ лѣвой ноздри).

Мышечныя боли, боли въ суставахъ, особенно въ тазобедренномъ, колѣнномъ и голено-стопномъ, при ходьбѣ исчезающія и возвращающіяся въ покоѣ, боль въ подошвѣ, при ходьбѣ не исчезающая.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, ускоренный пульсъ, лихорадочное состояніе, ознобъ и чувство холода по всему тѣлу, жаръ и волны крови съ безпокойствомъ, повсемѣстный сильный потъ, но больше всего на головѣ и спинѣ; приступы лихорадки съ сухимъ жаромъ и бредомъ.

Органы дыханія.

Насморкъ, короткій, сухой кашель, кашель съ тупымъ колотьемъ въ груди и отхаркиваніемъ вязкой слизи; кашель кровью. Сильное стѣсненіе груди при вдыханіи и выдыханіи.

Органы пищеваренія.

Десны разрыхлены и губчаты съ ощущеніемъ оскомины на зубахъ, параличъ языка, выдѣленіе большого количества вязкой, пѣнистой слюны. Жженіе и боли въ глоткѣ. Дурной вкусъ, отсутствіе аппетита, голодъ и отвращеніе къ пищѣ. Изжога, отрыжка вязкой слизи, сильная тошнота и рвота вязкой слизью, вздутіе желудка, урчаніе въ животѣ съ рѣзью, отхожденіе вѣтровъ, позывы на стулъ безъ стула или крайне трудное опорожненіе твердыми небольшими массами кала. Слизистый поносъ желтоватаго или зеленоватаго цвѣта въ теченіе нѣсколькихъ дней съ сильными вѣтрами, рѣзью.

Моче-половые органы.

Судорога пузыря, трудное и болѣзненное мочеиспусканіе, жженіе въ каналѣ. Мутная, дурно пахнущая моча, увеличенное выдѣленіе бѣловатой или красноватой, слизистой, свѣтлой или клейкой мочи съ бѣлымъ или краснымъ осадкомъ.

Возбужденіе половое, усиленныя мѣсячныя, запаздываніе и скудость мѣсячныхъ.

Примѣненіе у больныхъ.

При острыхъ и хроническихъ накожныхъ болѣзняхъ, при опуханіи железъ послѣ простуды или золотушнаго характера, при ревматическихъ пораженіяхъ глазъ и ушей, въ частности при параличѣ зрительнаго нерва, верхняго вѣка, губныхъ мышцъ; при нервныхъ боляхъ въ ухѣ, лицѣ; при параличѣ языка, затрудненномъ глотаніи, ревматическихъ боляхъ нервныхъ, мышечныхъ, суставныхъ. Параличи конечностей; при катарральныхъ пораженіяхъ съ сильнымъ отдѣленіемъ слизи и даже крови, при катаррѣ желудка со слизистою рвотою, при поносахъ съ рѣзью въ животѣ и вѣтрами (особенно послѣ охлажденія), при катаррѣ пузыря, судорогѣ его и параличѣ.

Евфразія.

(Euphrasia).

Общее. Летучія, зудящія покалыванія то тутъ, то тамъ по всей кожѣ; боли въ суставахъ, трубчатыхъ костяхъ конечностей, мышцахъ. Большая слабость въ ногахъ. Вечернее ухудшеніе болѣзненныхъ явленій. Сонъ прерывистый, сонливость днемъ.

Гипохондрическое и раздражительное настроеніе духа съ неохотою что-либо дѣлать. Лихорадочное состояніе незначительно, частое познабливаніе, летучій жаръ, красное лицо, холодныя ноги, ночные поты.

Нервная система.

Головная боль съ ощущеніемъ жара, тяжелыя вѣки, судорожное миганіе и сжиманіе вѣкъ, ощущеніе жженія, рѣзи въ глазахъ съ слезотеченіемъ, катарральное воспаленіе соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока, помутнѣніе и ослабленіе зрѣнія.

Боли въ ушахъ.

Затрудненный разговоръ, заиканіе.

Органы дыханія.

Чиханіе, текучій насморкъ, съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи. Катарръ дыхательныхъ трубокъ. Трудное откашливаніе слизи, особенно днемъ, со спазмами дыханія.

Пищеварительные органы.

Кровоточивость десенъ; дурной запахъ изо рта. Голодъ безъ аппетита; отрыжка послѣ пріема пищи. Рѣзи въ животѣ. Запоръ.

Мочевые органы.

Частое отхожденіе свѣтлой мочи.

Примѣненіе у больныхъ.

При насморкѣ съ обильнымъ слизетеченіемъ, головною болью, при слабости памяти и затрудненномъ разговорѣ; воспаленіи вѣкъ, при катаррѣ глазъ съ обильнымъ, слизисто-гнойнымъ отдѣленіемъ, поверхностномъ воспаленіи роговицы и ея помутнѣніи, при слабости зрѣнія; при кашлѣ съ отхаркиваніемъ вязкой слизи.

Игнація.

(Ignatia).

Общее. Ощущеніе подергиваній въ тѣлѣ, боли различнаго характера въ мышцахъ и суставахъ, а равно въ надкостной плевѣ, обнаруживающіяся болѣе при движеніи, чѣмъ во время

покоя, измѣняющіяся съ измѣненіемъ положенія тѣла; чрезвычайная чувствительность кожи къ сквозняку и свѣжему воздуху, боязнь наружнаго воздуха и какого-либо напряженія душевнаго или тѣлеснаго.

Ощущеніе біенія на различныхъ частяхъ туловища и царапанія по членамъ. Необыкновенная разбитость, чувство усталости, тяжести членовъ при движеніи, невѣрная, качающаяся походка, дрожь во всемъ тѣлѣ, дурнота, конвульсивныя подергиванія и судороги, тетанусъ, смерть.

Большинство разстройствъ обнаруживается рано утромъ, на вольномъ воздухѣ и послѣ большихъ пріемовъ пищи; усиливаются послѣ употребленія кофе, спиртныхъ напитковъ и куренія табаку. Сонъ безпокойный и ночью легкій; а днемъ необыкновенно крѣпкій, продолжительный, но не дающій облегченія; тяжелыя сновидѣнія, со стонами, вздохами и разговоромъ во снѣ.

Состояніе духа: необыкновенная раздражительность съ наклонностью къ жестокимъ и гнѣвнымъ выходкамъ; состояніе меланхоліи съ наклонностью къ слезамъ; частая смѣна разнообразныхъ настроеній.

Болѣзненная чувствительность кожи къ дотрогиванію, кровоизліянія, изъязвленія, высыпи, выпаденіе волосъ.

Опуханіе лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы. Затрудненныя мышленіе и рѣчь, разсѣянность, ослабленіе памяти, безсмысленность. Оглушеніе, головокруженіе, сильныя головныя боли (Clavus hystericus) съ приливами крови. Подергиванія личныхъ мускуловъ; судорога височныхъ мышцъ; затрудненныя движенія языка.

Воспалительное опуханіе вѣкъ съ усиленнымъ отдѣленіемъ мейбоміевыхъ железъ. Катарръ соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока со слизистымъ отдѣленіемъ, обильное слезотеченіе, жгучія боли; глазная невралгія (циліарная). Мѣняющееся то суженіе, то расширеніе зрачка.

Зудъ, боли, біеніе въ ушахъ, шумы, ослабленіе слуха.

Болѣзненныя ощущенія въ носу, носовыя кровотеченія.

Болѣзненность шейныхъ позвонковъ, затылочная судорога. Боли спины, поясницы, крестца, боли въ суставахъ, мышцахъ.

Органы кровообращенія.

Ощущенія колотья въ области сердца, сердцебіеніе.—Лихорадка умѣренная, перемежающагося типа; приступы озноба, жара и слабости, летучій жаръ.

Органы дыханія.

Насморкъ. Сухость и царапанье въ горлѣ. Легкій катарръ гортани и бронховъ. Кашель съ незначительною мокротою. Затрудненное дыханіе. Потребность глубоко вздохнуть, сжиманіе въ въ груди, приливъ крови къ легкимъ.

Органы пищеваренія.

Зубная боль. Воспалительное опуханіе мягкаго неба и миндалинъ, ощущеніе въ глоткѣ посторонняго тѣла, слюнотеченіе. Отсутствіе аппетита, отвращеніе отъ теплой пищи, молока, кислаго, отъ табаку. Отрыжка, тошнота, позывы на рвоту. Судорога и боли въ желудкѣ. Вздутіе живота, боли, колики, урчаніе. Сильное натуживаніе съ выхожденіемъ прямой кишки, сильные вѣтры. Трудное отхожденіе мягкихъ клееобразныхъ массъ, вялость кишечной мускулатуры, водянистый, глинообразный, слизисто-острый жидкій стулъ, непроизвольный жидкій стулъ.

Боли въ прямой кишкѣ (безъ геморроидальныхъ разстройствъ), опуханіе и кровотеченіе изъ кишекъ.

Моче-половые органы.

Ощущеніе раздраженія и давленія въ пузырѣ, особенно во время ходьбы и послѣ ѣды; боли въ мочевомъ каналѣ при ходьбѣ, жженіе въ немъ при мочеиспусканіи, частые позывы, усиленное, обильное мочеиспусканіе. Зудъ половыхъ частей, усиленный позывъ, выдѣленіе сока простаты при разслабленныхъ органахъ, безсиліе. Боли въ маткѣ, возбужденіе, преждевременныя мѣсячныя, отхожденіе сгустковъ черной крови, запаздываніе мѣсячныхъ, бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

У лицъ нервнораздражительныхъ, истерическихъ, у дѣтей, дѣвушекъ, женщинъ нѣжнаго тѣлосложенія, склонныхъ къ меланхоліи. При приступахъ дурноты, судорогъ, слабости, при эпилепсіи, параличахъ вслѣдствіе испуга, потрясенія. При нервныхъ боляхъ головы, туловища и членовъ, при мигрени при глазной (циліарной) невралгіи, при спинныхъ неврозахъ суставовъ, дрожаніи и подергиваніи мышцъ; при воспалительныхъ состояніяхъ вѣкъ, носа, губъ, при катаррѣ соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока, при катаррѣ бронховъ съ временною охриплостью, сухомъ кашлѣ, судорогѣ голосовой щели, приливахъ крови къ легкимъ, при нервномъ сердцебіеніи, необыкновенной пульсаціи различныхъ артерій. При судорогѣ глотки, затрудненномъ глотаніи, опуханіи железъ, судорогѣ желудка, коликахъ, судорогѣ прямой кишки съ выпаденіемъ изъ заднаго прохода; при катаррѣ тонкихъ кишекъ съ желтухою, жидкихъ желтовато-слизистыхъ и бѣлыхъ испражненіяхъ, съ незначительнымъ содержаніемъ желчи или полнымъ ея отсутствіемъ. При судорогѣ мочевого пузыря и разстройствахъ мочеиспусканія преходящаго характера; при болѣзненныхъ мѣсячныхъ, при судорогѣ матки, бѣляхъ; при сильной раздражительности со слабостью половыхъ частей. При перемежающейся лихорадкѣ.

Ипекакуана.

(Cephaëlis Ipecacuanha).

Общее. Ипекакуана дѣйствуетъ первично на нервныя волокна и клѣтки головного, спинного мозга и гангліозную нервную систему. Вслѣдствіе пораженія продолговатаго мозга, какъ сосудодвигательнаго центра, происходятъ разстройства артеріальной сосудистой системы такого рода, что въ результатѣ получается состояніе мѣняющагося кровенаполненія, то отлива, то прилива въ отдѣльныхъ сосудистыхъ областяхъ. Съ этимъ состояніемъ то обѣдненія кровью, то переполненія ею сосудовъ мозга

рука объ руку идетъ ненормальное отправленіе его функцій, выражающееся въ различныхъ разстройствахъ въ мышцахъ и слизистыхъ оболочкахъ. Боли въ костяхъ и мышцахъ, хрустѣніе суставовъ, судороги сгибательныхъ и выпрямляющихъ мышцъ, разрывы мелкихъ сосудовъ и кровотеченія носовыя, желудочныя, изъ мочевого канала, матки, бронховъ, легкихъ. Чрезвычайная чувствительность къ колебаніямъ температуры; періодичность и наступленіе приступами многихъ разстройствъ.

Сонъ глубокій и крѣпкій, съ живыми сновидѣніями; разбитость и сонливость днемъ.

Душевное состояніе: равнодушное, сосредоточенное, подавленное; повышенная раздражительность.

Зудъ и сыпи кожи.

Нервная система.

Отвращеніе къ душевнымъ напряженіямъ, медленное, затрудненное теченіе представленій, вялость мышленія. Головныя боли, головокруженіе, блѣдное лицо съ черными кругами подъ глазами.

Катарръ соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока. Расширеные зрачки.

Глухота съ ощущеніемъ давленія.

Ревматическія боли въ туловищѣ и членахъ, слабость рукъ и ногъ.

Органы кровообращенія.

Болѣзненныя ощущенія въ области сердца, сердцебіеніе, незначительное ускореніе пульса, судорожное и параличное состояніе сосудистой мускулатуры съ временнымъ переполненіемъ или обѣднѣніемъ кровью, особенно въ маленькихъ артеріяхъ и капиллярной сѣти, разрывы и кровотеченіе изъ переполненныхъ сосудовъ.

Умѣренная лихорадка: ознобъ, жаръ и потъ.

Органы дыханія.

Чиханіе, насморкъ, носовыя кровотеченія. Чрезвычайная чувствительность и катарръ слизистой оболочки гортани и бронховъ, сухой кашель, откашливаніе густой слизистой мокроты, съ при-

мѣсью крови. Сжиманіе въ груди, одышка, боязнь задушенія, судорога голосовой щели, особенно вечеромъ и ночью.

Пищеварительные органы.

Раздраженіе слизистой оболочки губъ, языка и полости рта, усиленное слюнотеченіе, затруднительное глотаніе, катарръ зѣва съ опуханіемъ миндалинъ. Отрыжка, тошнота, позывы на рвоту, рвота; рвота съ примѣсью крови, пищевою кашицею, слизистыми и желчными массами; сильныя боли въ желудкѣ. Судорожныя и болѣзненныя ощущенія въ правой и лѣвой подреберной области, рѣжущія боли въ животѣ въ области пупка, сильныя колики. Повторныя жидкія испражненія съ массою слизи и желчи, стулъ съ примѣсью крови, рѣжущія боли въ прямой кишкѣ при послабленіи.

Моче-половые органы.

Частые позывы, незначительное выдѣленіе очень насыщенной мочи съ осадкомъ мочекислой соли, выдѣленіе крови съ рѣзью въ пузырѣ и мочевомъ каналѣ. Истеченіе слизи изъ канала, тянущія боли въ мошонкѣ.

Ощущенія сжиманія и давленія въ маткѣ, преждевременное наступленіе мѣсячныхъ (на 14 дней раньше), маточное кровотеченіе. Задержаніе крови въ концѣ періода.

Примѣненіе у больныхъ.

При острыхъ заболѣваніяхъ безъ значительной лихорадки, при катаррахъ бронховъ съ судорожнымъ и царапающимъ кашлемъ, при коклюшѣ, при кашлѣ со рвотою и приступами задушенія, припадкахъ астмы, одышки, кровотеченіи изъ легкихъ; при катаррѣ желудка со рвотою слизью и болью, при рѣзи въ животѣ, поносахъ съ слизисто-желчнымъ или кровянистымъ выдѣленіемъ; при судорогахъ пузыря съ кровавою мочею, при приливахъ крови къ маткѣ и маточныхъ кровотеченіяхъ. При перемежающейся лихорадкѣ, преходящихъ припадкахъ судорогъ, подавленныхъ кожныхъ сыпяхъ съ холодной кожей, холодныхъ чле-

нахъ и постоянномъ познабливаніи, приливахъ къ мозгу, расширенномъ зрачкѣ и глухотѣ.

Кали карбоникумъ.

(Kali carbonicum).

Общее. Ощущенія мурашекъ по всѣмъ членамъ, особенно въ ногахъ при сидѣніи, съ тянущими ощущеніями въ голеняхъ, ощущеніе біенія на различныхъ частяхъ тѣла, ощутимое пульсированіе артерій чрезъ все тѣло до большого пальца ноги, приливы крови съ краснотою лица. Боли различнаго рода и подергиванія во всѣхъ членахъ, сокращенія отдѣльныхъ мышечныхъ пучковъ, неожиданно наступающій припадокъ судорогъ съ большою слабостью и разбитостью, ломота членовъ, чрезмѣрная чувствительность, отяжелѣніе и разбитость всего тѣла, быстрое утомленіе послѣ небольшого движенія, выдѣленіе пота и приступъ дурноты. Блѣдное, втянутое, страдальческое лицо. Чрезвычайная боязнь свѣжаго воздуха и небольшого охлажденія. Ночные поты. Ухудшеніе нѣкоторыхъ разстройствъ отъ свѣжаго воздуха, вечеромъ или рано утромъ.

Сонъ послѣ поздняго засыпанія до утра, безпокойный, не дающій отдыха, съ частыми пробужденіями. Сильная сонливость днемъ, особенно въ вечерніе часы.

Настроеніе духа: безпокойство и нетерпѣніе, раздражительность, суетливость, наклонность къ гнѣвнымъ выходкамъ. Равнодушіе, подавленность, плаксивость. Малѣйшее приносновеніе вызываетъ испугъ.

Зудъ повсемѣстно въ кожѣ, высыпи разнаго рода, шелушеніе эпителія, поверхностные панариціи, т.-е., нарывы и изъязвленія у ногтей пальцевъ рукъ и ногъ. Сухость и выпаденіе волосъ. Опуханіе слюнныхъ и лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ: Разсѣянность и трудный ходъ мыслей, неспособность отыскивать подходящія выраженія, частыя оговорки, безсмыслен-

ность; приступъ дурноты. Головокруженіе, тяжесть и боли въ головѣ, приливы крови съ жаромъ и краснотою лица.

Опуханіе кожи и клѣтчатки между носомъ, бровями и верхнимъ вѣкомъ. Катарральныя пораженія соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока. Свѣтобоязнь. Слезотеченіе. Ослабленіе зрѣнія.

Краснота, жаръ и зудъ въ ушахъ, обильное отдѣленіе сѣры, воспалительныя опуханія въ ушахъ, шумы, временное притупленіе слуха.

Воспаленіе носа, носовое кровотеченіе.

Спинной мозгъ.

Всевозможныя мышечныя, суставныя и нервныя боли разнаго рода повсюду.

Органы кровообращенія.

Судорожныя боли въ области сердца, дѣлающіяся особенно ощутимыми при глубокомъ вдыханіи, усиленный и ускоренный пульсъ, замедленный, падающій пульсъ; лихорадочное состояніе, усиленный сухой жаръ, съ предшествующимъ знобомъ, но безъ послѣдующаго пота; наклонность къ потѣнію днемъ при незначительномъ тѣлесномъ и душевномъ напряженіи, ночные поты, перемежающійся типъ. Ощущенія пульсаціи въ различныхъ областяхъ сосудистой системы.

Органы дыханія.

Частыя чиханія, текучій насморкъ, особенно вечеромъ; слизи и гноетеченіе изъ носа. Охриплость, безголосость, царапаніе въ горлѣ и бронхахъ, короткій и сухой кашель, кашель въ вечерніе и ночные часы, приступами, съ болью въ груди; припадки кашля рано утромъ (3—5 час.) съ тошнотою, выдѣленіе слизистой мокроты. Застои крови въ легкихъ.

Пищеварительные органы.

Воспалительное набуханіе и легкая кровоточивость десенъ, зубная боль, разрыхленіе зубовъ, дурной запахъ изо рта. Опуханіе, высыпи съ образованіемъ язвочекъ, кровотеченіе верхней

и нижней губъ; изъязвленіе слизистой оболочки полости рта, усиленное слизе-и слюнотеченіе. Катарръ и воспалительное опуханіе мягкаго неба, миндалинъ, глотки, затрудненное глотаніе съ болью.

Отсутствіе аппетита и голодъ, отвращеніе къ хлѣбу и мясу, желаніе кислаго. Кислая отрыжка, выбрасываніе воды изъ желудка, жженіе, тошнота, рвота, съ болью въ желудкѣ. Жженіе, рѣзь, судороги въ желудкѣ.

Вздутый животъ съ болѣзненностью стѣнокъ живота къ дотрогиванію; боли въ животѣ, колики, частые позывы на стулъ съ отхожденіемъ вѣтровъ или незначительнаго количества твердыхъ каловыхъ массъ; мягкій, жидкій стулъ, отхожденіе свѣтлоокрашенныхъ или сѣрыхъ массъ съ чувствомъ большой разбитости, поносы съ рѣзью, примѣсь слизи, вялость кишечника съ труднымъ отхожденіемъ незначительнаго количества твердыхъ массъ; передъ и послѣ стула истеченіе изъ задняго прохода бѣловатой слизи, опуханіе и выхожденіе геморроидальныхъ шишекъ, боли въ прямой кишкѣ, натуживаніе въ заднемъ проходѣ.

Моче-половые органы.

Ощущеніе давленія и колотья справа и слѣва въ области почекъ, продолжительныя боли въ почкахъ при сидѣніи. Тянущія и рѣжущія боли въ шейкѣ мочевого пузыря. Частые позывы съ замедленнымъ мочеиспусканіемъ, съ отхожденіемъ нѣсколькихъ капель, частое мочеиспусканіе понемногу (ночью), прерывистая струя мочи. Слизетеченіе изъ канала (сокъ предстательной железы?). Мутная моча, съ осадками.

Боли, опуханія половыхъ частей, съ повышеніемъ температуры, пониженіе полового чувства, отсутствіе эрекцій, рѣдкое появленіе ранѣе частыхъ поллюцій. Болѣзненное возбужденіе, эрекціи. Жженіе, зудъ и колотье въ маткѣ и яичникахъ. Раннее наступленіе мѣсячныхъ съ сильнымъ кровотеченіемъ. Кровотеченіе беременныхъ безъ аборта. Бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

При хроническихъ разстройствахъ, съ венознымъ характеромъ крови, при кожныхъ пораженіяхъ, головныхъ боляхъ съ лету-

чимъ жаромъ и приливомъ крови съ пульсаціей, наклонности къ кровотеченіямъ и застоямъ крови, при меланхолическомъ и гипохондрическомъ настроеніи съ усиленною возбудимостью и боязливостью. При пораженіяхъ ушей и глазъ, воспаленіяхъ железъ, воспалительныхъ пораженіяхъ тканей носа, десенъ, слизистой оболочки рта и мягкаго неба, при слабости пищеваренія, при катаррѣ желудка, опуханіи печени, катаррѣ кишекъ, съ разстроеннымъ отдѣленіемъ желчи (желтоватый цвѣтъ лица), запорѣ при сухости каловыхъ массъ, катаррѣ толстыхъ кишекъ съ наклонностью къ изъязвленію, геморроидальныхъ разстройствахъ, боляхъ въ заднемъ проходѣ и геморроидальныхъ кровотеченіяхъ, геморроѣ мочевого пузыря, слабости запирающей мышцы пузыря, отхожденіи мочи при кашлѣ, чиханіи и т. п., особенно у женщинъ, застояхъ крови въ половыхъ органахъ и связанномъ съ ними состояніи раздражительной слабости, измѣненіяхъ положенія матки, разстройствахъ мѣсячныхъ, неправильныхъ періодахъ, наклонности къ маточному кровотеченію, при бѣляхъ, застойномъ опуханіи яичниковъ, съ кровоизліяніемъ. Далѣе — при катаррахъ гортани и бронховъ, при сухомъ судорожномъ кашлѣ со рвотою слизистою мокротою въ поздніе вечерніе и ночные часы; при застояхъ въ легкихъ и легочномъ кровотеченіи, при неправильной дѣятельности сердца и сердцебіеніи, при воспалительномъ состояніи плевры. При состояніяхъ нервной раздражительности и слабости, съ ревматическими явленіями, при ночныхъ потахъ, откашливаніи крови.

Калькареа карбоника.

(Calcarea carbonica).

О б щ е е. Какъ Сульфуръ, Силицеа, Натрумъ муріатикумъ и Фосфоръ,—Калькареа карбоника дѣйствуетъ весьма сильно на тотъ органическій процессъ, который мы называемъ „обмѣномъ веществъ“; кромѣ чисто растительной сферы, вліянію средства подвергаются также чувствительная и двигательная сферы.

Въ области мышцъ, суставовъ и костей наблюдаются болѣе или менѣе сильныя боли, то исчезающія, то длительныя, съ затрудненною подвижностью и съ временнымъ опуханіемъ мягкихъ частей. Болѣзненныя явленія наступаютъ всегр скорѣе или ухудшаются подъ вліяніемъ свѣжаго, холоднаго воздуха, сырости, и воды; иногда въ ихъ появленіи наблюдается періодичность. Къ этому присоединяются сильная нервная чувствительность, чувство тяжести и недомоганія, болѣзненнаго напряженія, разбитости и слабости всего тѣла; незначительное усиліе уже вызываетъ чувство усталости. Частая дурнота съ холоднымъ потомъ, приливы крови къ головѣ и груди, приливы къ различнымъ органамъ съ выступленіемъ крови, недостатокъ крови въ мелкихъ сосудахъ съ чувствомъ онѣмѣнія и отмиранія членовъ (особенно пальцевъ рукъ и ногъ).

Состояніе духа носитъ преобладающій характеръ пониженной энергіи, моменты возбужденія скоропреходящи, подавленное, тоскливое, смутное и угнетенное настроеніе съ наклонностью къ плачу, малодушіе и меланхолія составляютъ основу настроенія.

Сонъ, несмотря на усталость и сонливость въ теченіе дня, является лишь поздно ночью, такъ какъ живой ходъ мыслей возбуждаетъ сознаніе и затрудняетъ переходъ отъ бодрствованія ко сну. Сонъ разстраивается всякаго рода тягостными ощущеніями, непріятными сновидѣніями, легкимъ бредомъ, прерывается кошмарами, стонами и криками и потому не производитъ успокавающаго и укрѣпляющаго вліянія; вслѣдствіе чего наклонность къ дремотѣ, съ чувствомъ сильной усталости, сохраняется до позднихъ предобѣденныхъ часовъ.

Кожа. Чрезвычайная чувствительность къ прикосновенію и холоду. Блѣдность лица съ глубоко запавшими, окруженными синевой глазами; летучій жаръ въ лицѣ; рожистая краснота съ опуханіемъ, блѣдность и опуханіе кожи и подкожной клѣтчатки подъ глазами, въ области щекъ и губъ. Ощущеніе зуда, покалыванія и жженія, обманчивое ощущеніе налетающей паутины, лишаевидное высыпаніе на лицѣ, угревидная сыпь на лбу и вискахъ; узелковая и пузырчатая высыпь на кожѣ головы съ усиленнымъ шелушеніемъ эпидермиса (перхоть), образованіемъ корокъ; выпаденіе волосъ на головѣ, вызывающее усиленный зудъ. Сыпи по тѣлу, пятна красныя, величиною съ чечевицу,

образованіе угрей, пустулъ (гнойничковъ), потныя ладони, потныя ноги.

Железы. Болѣзненныя опуханія слюнныхъ железъ, лимфатическихъ на шеѣ и затылкѣ, подъ мышкой, въ паху.

Кости и суставы. Боли, колотья въ височныхъ и боковыхъ костяхъ черепа, суставахъ локтевомъ, пальцевыхъ, колѣнномъ, тазобедренномъ, голенномъ, ножныхъ пальцевъ съ опуханіемъ мягкихъ частей.

Нервная система.

Головной мозгъ и головные нервы. Упадокъ энергіи, безучастное равнодушіе, необыкновенная молчаливость, замедленное и ослабленное представленіе и мышленіе, забывчивость, ослабленіе памяти, смѣшеніе словъ. Затемнѣніе сознанія, внезапная потеря сознанія съ паденіемъ—зачаточная эпилепсія.

Голова тяжела, какъ бы чѣмъ-то наполнена, ощущеніе оглушенія съ приступами обморока, продолжительная головная боль, боли въ половинѣ головы, состояніе одурѣнія съ ощущеніемъ давленія и полноты въ черепѣ; болѣзненныя колотья по всему тѣлу; пульсирующія боли въ глубинѣ мозга отъ напора крови. Ощущеніе ледянаго холода въ правой половинѣ головы. Дрожаніе и подергиванія отдѣльныхъ мышцъ лица.

Органъ зрѣнія. Судорога вѣкъ, ощущеніе судорожнаго напряженія и подергиванія въ глазномъ яблокѣ, слезотеченіе изъ глазъ на свѣжемъ воздухѣ. Воспалительная краснота и опуханіе вѣкъ съ ощущеніемъ жженія въ слезномъ мѣшечкѣ, съ слизисто-гнойнымъ отдѣленіемъ; раздраженное, болѣзненное состояніе всего глаза, воспаленіе соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока; свѣтобоязнь, искры въ глазахъ, затемнѣніе половины поля зрѣнія, освѣщенные предметы окружены кругами свѣторазсѣянія, зрѣніе какъ бы чрезъ вуаль, чрезъ облако или туманъ. Дальнозоркость.

Органъ слуха. Ощущеніе жара, зуда и жженія въ ухѣ, шумъ въ ушахъ, воспаленіе наружнаго слуховаго прохода съ обильнымъ отдѣленіемъ гноя. Пониженіе слуха даже безъ воспалительныхъ явленій.

Органъ обонянія. Опуханіе носа, образованіе угрей на кончикѣ и крыльяхъ носа, воспаленіе и изъязвленіе носовой перегородки, кровотеченія изъ носа. Обманы обонянія.

Нервы спинного мозга. Судорожное отвердѣніе затылочныхъ мышцъ съ болѣзненными ощущеніями, тянущія боли въ спинныхъ мышцахъ, очень сильныя боли въ крестцѣ, особенно при вставаніи и нагибаніи, также и при лежаніи, отсюда—хожденіе въ согнутомъ положеніи. Рвущія боли въ плечевыхъ суставахъ, тянущія—по нервамъ руки до концовъ пальцевъ, дрожаніе рукъ, онѣмѣніе пальцевъ, ощущеніе паралича во всей рукѣ. Боли въ тазу, боли въ мышцахъ ногъ, судороги въ икрахъ, жженіе въ подошвахъ, боли въ нихъ при наступаніи.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, болѣзненное давленіе въ области сердца, ощущеніе сжатія, безпокойства, неправильный пульсъ при холодной кожѣ и холодномъ поту. Сильная пульсація артерій, ускоренный пульсъ. Лихорадочное возбужденіе, сильный жаръ съ жаждою и послѣдующимъ знобомъ; перемежающіеся приступы жара и зноба, вечерняя лихорадка съ потѣніемъ головы; потѣніе всего тѣла рано утромъ.

Дыхательные органы.

Катарръ носа, гортани, дыхательныхъ путей. Сухой кашель, особенно ночью. Судорожный кашель, отдѣленіе слизи, съ примѣсью крови. Короткое дыханіе, потребность глубоко вздохнуть, стѣсненіе и давленіе въ груди, болѣзненность грудной клѣтки.

Пищеварительные органы.

Слизистая оболочка полости рта и языка нѣсколько воспалена и усѣяна болѣзненными пузырьками, то ощущеніе сильной сухости, то чрезмѣрное отдѣленіе слюны; опухшій, трудноподвижный и обложенный бѣлымъ налетомъ языкъ, воспалительное опуханіе железъ мягкаго неба, затрудненное глотаніе, дурной вкусъ, ослабленіе или отсутствіе вкуса съ постоянною жаждою,

чувство голода, отвращеніе къ табаку, къ варенымъ, особенно къ мяснымъ блюдамъ, питье молока вызываетъ тошноту.

Отрыжка и изжога; тошнота, рвота кислою жидкостью, ощущеніе усиленнаго тепла, даже жженія въ желудкѣ, давленіе въ желудкѣ натощакъ и послѣ ѣды, судороги и боли въ желудкѣ.

Вздутый животъ, боли въ печени, въ кишкахъ. Твердый стулъ, запоры, рѣдкое отхожденіе сухихъ массъ, покрытыхъ слизью. Кашицеобразный стулъ съ отхожденіемъ непереваренной пищи, глинообразный стулъ, пѣнистый стулъ, кровянисто-слизистый стулъ съ болями въ маткѣ. Зудъ въ заднемъ проходѣ, боли въ прямой кишкѣ, болѣзненное выхожденіе геморроидальныхъ шишекъ, геморроидальное кровотеченіе.

Моче-половые органы.

Боли въ области почекъ, частые позывы на мочеиспусканіе, съ затрудненнымъ выдѣленіемъ. Боли въ пузырѣ и каналѣ. Ночное недержаніе мочи. Обильное количество мочи, бураго цвѣта, дурно пахнущей, съ бѣломъ осадкомъ.

Ослабленіе половыхъ органовъ, боли и колотья въ нихъ, у женщинъ въ маткѣ и яичникахъ. Слишкомъ раннія и сильныя мѣсячныя.

Примѣненіе у больныхъ.

Примѣняется въ хроническихъ болѣзненныхъ разстройствахъ съ пораженіями растительныхъ отправленій, въ частности въ слѣдующихъ случаяхъ: при приливахъ къ мозгу, легкимъ, маткѣ и вмѣстѣ съ ними связанными кровотеченіями; при разстройствахъ отправленія и начинающихся заболѣваніяхъ тканей сердца и кровеносныхъ сосудовъ; при болѣзняхъ лимфатическихъ железъ и опуханіи слюнныхъ железъ; при хроническихъ накожныхъ болѣзняхъ, пораженіяхъ кожныхъ сальныхъ железъ и волосяныхъ луковицъ; при нервныхъ болѣзняхъ безъ ясной или опредѣлимой дезорганизаціи: дрожаніе членовъ, ограниченныя судороги мышцъ, слабость членовъ, обморочные припадки, эпилептическіе припадки, душевныя разстройства. При воспаленіяхъ клѣтчатки, костной ткани съ образованіемъ гноя, перерожденія тканей; при

золотушныхъ пораженіяхъ, какъ, напримѣръ, золотушныя воспаленія глазъ и ушей, пораженіе железъ, образованіе язвы на слизистой оболочкѣ рта и носа, при хроническомъ насморкѣ; при слабости пищеваренія, болѣзненныхъ уклоненіяхъ аппетита, чувствѣ голода, при судорогѣ желудка, при затрудненномъ стулѣ, при хроническихъ катаррахъ кишечника, при опуханіи печени и селезенки, при катаррѣ мочевого пузыря, при ночномъ недержаніи мочи, при половомъ безсиліи, при опуханіи грудныхъ железъ и матки, при слишкомъ сильныхъ и слишкомъ раннихъ мѣсячныхъ, при катаррѣ слизистой оболочки влагалища и матки, при геморроидальныхъ страданіяхъ и кровотеченіяхъ; при подагрическихъ и ревматическихъ пораженіяхъ нервовъ и суставовъ съ опуханіемъ или безъ опуханія тканей.

Календула.

(Calendula officinalis).

Общее. Значительная раздражительность съ наклонностью къ испугу, ревматическія боли повсюду съ легкимъ познабливаніемъ, большею частью хуже при покоѣ, чѣмъ при умѣренномъ движеніи, обморочные припадки, безпокойный сонъ при сильной сонливости днемъ.

Кожа: высыпь отдѣльныхъ пузырьковъ тамъ и сямъ; состояніе раны ухудшается, онѣ сильнѣе болятъ и по краямъ краснѣютъ.

Железы: воспалительное опуханіе подчелюстныхъ, небныхъ и ушныхъ слюнныхъ железъ и различныхъ лимфатическихъ.

Лихорадочное состояніе, ознобъ чередуется съ жаромъ, ночью потъ.

Голова: ощущеніе полноты, давящія боли; нѣсколько воспаленные покраснѣвшіе глаза, ослабленіе слуха.

Пищеварительные органы

Уменьшеніе аппетита, тошнота, особенно послѣ куренія табаку, рвота, судорога желудка, умѣренныя колики, усиленный стулъ.

Моче-половые органы.

Увеличенное выдѣленіе мочи. Эрекціи. Кровотеченія изъ матки.

Примѣненіе у больныхъ.

При воспаленіи и опуханіи железистыхъ органовъ внутрь и снаружи при ранахъ, особенно, съ разорванными и размятыми краями и съ наклонностью къ нагноенію.

Камомилла.

(Chamomilla).

Общее. Производимыя этимъ средствомъ болѣзненныя явленія и боли происходятъ и ухудшаются по преимуществу въ вечерніе часы и ночью, также послѣ ѣды; наружное тепло, переходъ въ сидячее изъ лежачаго положенія, движеніе тѣла туда и сюда приносятъ облегченія; они достигаютъ степени невыносимыхъ страданій при большомъ безпокойствѣ и ощущеніи жара. Боли являются приступами и оставляютъ чувство сильной слабости и паралича. Въ особенности поражаются дѣти и женщины.

Сонъ неспокоенъ, безсонница; сильное безпокойство, стоны, плачъ, бросаніе туда и сюда ночью; видѣнія, непріятныя сновидѣнія.

Настроеніе духа: возбужденное, гнѣвное, удрученное, безпокойное, плаксивое и боязливое.

Кожа очень чувствительна къ сквозняку и холоду, высыпь мелкихъ узелковъ, пузырьковъ и гнойничковъ съ зудомъ и жженіемъ. Поврежденія кожи не заживаютъ первичнымъ натяженіемъ, а нагнаиваются. Лобъ и кожа головы легко потѣютъ, лицо во время припадка болей красно, наблюдается смѣна красноты и блѣдности, иногда краснѣетъ одна щека.

Опуханіе слюнныхъ железъ: ушныхъ, подчелюстныхъ, небныхъ.

Мозгъ и мозговые нервы: чрезмѣрная раздражительность чувствительныхъ нервовъ, невралгіи различнаго рода, пораженія дви-

гательныхъ нервовъ, выражающіяся въ подергиваніи и судорогахъ различныхъ мышцъ, съ послѣдовательнымъ параличемъ ихъ. Голова тяжела, кружится и болѣзненна.

Катарръ глазъ и глазныхъ оболочекъ съ свѣтобоязнью и слезотеченіемъ.

Лихорадочное состояніе постояннаго типа съ вечернимъ ухудшеніемъ, сильный ознобъ, съ краснотою и жаромъ лица. Потъ, жажда.

Дыхательные органы.

Насиоркъ, кровотеченія изъ носа. Катарръ гортани и бронховъ, съ охриплостью, слизистыми хрипами, ощущеніемъ щекотанія въ горлѣ, раздраженіемъ, позывомъ на кашель и приступами кашля съ ощущеніемъ задушенія; боли въ груди при вдыханіи и выдыханіи.

Пищеварительные органы.

Воспалительныя пораженія слизистой оболочки языка и полости рта съ высыпаніемъ мелкихъ жгучихъ пузырьковъ. Зубная боль и язвочки десенъ. Усиленное слюноотдѣленіе, затрудненное глотаніе, горькій, кислый вкусъ, отрыжка, тошнота. Рвота пищевою кашицею, кислою жидкостью и желчью. Вздутіе живота, боли, колики.

Поносы, выдѣленія свѣтло-желтыя или зеленоватыя, съ болями; безболѣзненный, слизистый стулъ; жидкій стулъ безъ желчи, послѣ стула боли въ прямой кишкѣ, геморроидальныя кровотеченія.

Мочевые органы.

Позывы и натуживаніе при мочеиспусканіи, непроизвольное отхожденіе мочи.

Мужскіе половые органы: Повышенное чувство съ ночными поллюціями и частыми эрекціями.

Женскіе половые органы: Боли въ маткѣ и крестцѣ; ощущеніе жженія во влагалищѣ; отхожденіе крови изъ матки съ болями; сильное маточное кровотеченіе. Жидкія, ѣдкія бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

При катарральныхъ и ревматическихъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ дѣтей и женщинъ, повышенной нервной раздражительности и наклонности къ судорогамъ разнаго рода; при наклонности къ приливамъ крови и кровотеченіямъ; при пароксизмахъ нервныхъ болей и при скрытой, перемежающейся лихорадкѣ; при катаррахъ кишечника и пораженіяхъ печени и мочевого пузыря; при разстройствахъ мѣсячныхъ и сильномъ кровотеченіи; при всѣхъ пораженіяхъ указаннаго рода, происшедшихъ вслѣдствіе сильнаго душевнаго потрясенія, горя, печали и т. п.

Кантарисъ.

(Cantharis).

Большія дозы производятъ ощущеніе сильнаго жженія и стягиванія въ глоткѣ и гортани, желудкѣ и кишечномъ каналѣ, слюнотеченіе, страхъ, одышку, ощущеніе задушенія, сильную жажду, сухость слизистой оболочки, полости рта, затрудненное глотаніе, рвоту, частью кровью, боли въ почкахъ и мочевомъ пузырѣ, позывы на мочу, кровавую мочу, болѣзненныя эрекціи, выкидыши, бредъ, конвульсіи, судороги и смерть.

Малыя дозы: рвущія, колющія, рѣжущія, давящія боли повсюду, чувство разбитости и значительной слабости во всѣхъ членахъ, ослабленіе, упадокъ силъ и исхуданіе всего тѣла, повсюду кровотеченія, судороги и припадки бѣшенства, какъ при водобоязни; безпамятство, конвульсіи, судороги, періодичность болѣзненныхъ явленій, ослабленіе ихъ при спокойномъ лежаніи. Водяночныя опуханія.

Сонъ крѣпкій или очень безпокойный, живыя, мучительныя, страшныя сновидѣнія, видѣнія.

Состояніе духа подавленное или возбужденное, безпокойное, приступы бѣшенства.

Кожа. Рожистое воспаленіе съ образованіемъ пузырьковъ.

Нервная система.

Мозгъ головной и его нервы. Упадокъ энергіи отправленія. Нежеланіе и вялость при всякомъ занятіи, затрудненное мышленіе, бредовыя идеи, рѣчи, умопомѣшательство, потеря сознанія.

Клоническія и тоническія судороги, бредъ. Головныя боли, головокруженіе, обмороки. Раздражительное состояніе чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ. Невралгическія боли. Конвульсіи. Судороги. Слабость и дрожаніе членовъ.

Органы кровообращенія.

Сильное сердцебіеніе, боли въ области сердца, ускоренный, полный пульсъ, затѣмъ замедленный, нитевидный пульсъ.

Лихорадочное возбужденіе, ознобъ съ сильною жаждою, безъ жара и пота. Небольшой потъ ночью. Холодный потъ рукъ и ногъ. Припадокъ лихорадки, состоящій только изъ озноба.

Органы дыханія.

Сильное и болѣзненное чиханіе, слизь смѣшана съ кровью при продолжительномъ насморкѣ.

Катарръ гортани и дыхательныхъ трубокъ, охриплость, выдѣленіе вязкой слизи, болѣзненность гортани, судорога голосовой щели, сухой, короткій кашель, съ отдѣленіемъ вязкой слизи съ примѣсью крови, затрудненное, тяжелое дыханіе, ощущеніе давленія, напряженія и колотья въ груди то тамъ, то тутъ.

Пищеварительные органы.

Сухость слизистой оболочки полости рта, потрескавшіяся губы, красный, дрожащій языкъ, обложенный слизью, съ образованіемъ язвочекъ, равно и на деснахъ, дурной запахъ изо рта; воспаленіе и разрыхленіе всей слизистой оболочки полости рта и языка, неба, глотки, съ образованіемъ пузырьковъ и обильнымъ отдѣленіемъ слюны; слюнотеченіе; воспаленіе миндалинъ; затрудненное глотаніе; судорога глотки, особенно при попыткѣ

проглотить что-либо жидкое. Потеря аппетита, вкуса, отвращеніе къ пищѣ, сильная жажда. Частая пустая отрыжка, глотаніе, тошнота, рвота съѣденнымъ, желчью и слизью, съ примѣсью крови. Чувствительность области желудка, жженіе, боли въ желудкѣ, судороги. Болѣзненность праваго и лѣваго подреберья. Вздутіе живота, болѣзненность при дотрогиваніи, сильныя боли во всемъ животѣ, ощущеніе жара въ кишкахъ; колики; частые позывы на низъ безъ стула или съ незначительнымъ выдѣленіемъ или съ отхожденіемъ только газовъ; отхожденіе твердыхъ каловыхъ массъ съ рѣзью въ прямой кишкѣ, давленіе на задній проходъ и выхожденіе прямой кишки, Обильный поносъ, безъ болей или съ рѣзью, кровянисто слизистый стулъ; послѣ стула познабливаніе и колотье въ заднемъ проходѣ. Боли въ прямой кишкѣ, позывы на стулъ, выдавливаніе нѣсколькихъ капель крови.

Моче-половые органы.

Боли въ области почекъ, по мочеточникамъ до мочевого пузыря, воспаленіе почекъ, пузыря. Рѣжущія и жгучія боли по мочеиспускательному каналу до наружнаго отверстія, судорожные позывы на мочу, болѣзненное мочеиспусканіе съ отхожденіемъ вязкой слизи, песку и капель крови, иногда полное задержаніе мочи, иногда недержаніе мочи, охтожденіе съ мочею студенистыхъ массъ, бѣлокъ въ мочѣ. Суженіе мочевого канала. Продолжительныя болѣзненныя эрекціи, половое возбужденіе. Воспаленіе члена съ его омертвѣніемъ.

Боли, воспаленіе матки, преждевременныя, болѣзненныя, очень сильныя мѣсячныя, выкидышъ.

Зачатіе послѣ многолѣтняго безплодія.

Примѣненіе у больныхъ.

Главнымъ образомъ, при острыхъ заболѣваніяхъ и при періодически появляющихся судорожныхъ и лихорадочныхъ пораженіяхъ, а именно—при судорогѣ глотки съ водобоязнью, при водобязни и бѣшенствѣ, при дрожаніи и судорогахъ, при хронической лихорадкѣ съ неполными и рѣдкимии приступами; при воспаленіи слизистой оболочки полости рта и глотки съ образованіемъ пузырьковъ; при воспаленіи желудочно-кишечнаго канала,

при поносахъ; при воспаленіи почекъ, пузыря, мочевого канала; при половомъ возбужденіи и поллюціяхъ; при воспаленіяхъ серозныхъ оболочекъ: мягкой оболочки мозга, брюшины; при воспаленіи матки съ одновременнымъ пораженіемъ мочевого пузыря, катарромъ слизистой оболочки шейки матки съ половымъ возбужденіемъ и разстройствами мочеотдѣленія; при воспаленіи, съ отдѣленіемъ крови, слизистой оболочки прямой кишки.

Карбо.

(Carbo animalis.—Carbo vegetabilis).

Общее. Дѣйствуетъ глубоко на состояніе крови и нервной ткани, а равно на всѣ растительные процессы въ тѣлѣ. Колющія, жгущія, тянущія и давящія боли повсюду, подергиванія въ членахъ, хрустъ, боли, разслабленіе въ суставахъ съ вечернимъ ухудшеніемъ. Ощущеніе сильной разбитости и усталости, тяжесть членовъ. Волненія крови, недомоганіе, ощущеніе пульсаціи, припадки обморока, приступы судорогъ. Преимущественно поражается лѣвая сторона тѣла. Ухудшеніе вечеромъ, на свѣжемъ воздухѣ, отъ холода. Сонливость съ сильною дремотою, потяготою въ теченіе дня; ночью трудно заснуть вслѣдствіе ощущенія жара, безпокойство во всемъ тѣлѣ, зудъ кожи; безпокойный сонъ и временное пробужденіе, мучительные сны, фантастическія видѣнія. Бредовыя рѣчи.

Настроеніе духа: безучастность, раздражительность, подавленность, меланхолія; наклонность къ жалобамъ и слезамъ, громкій плачъ, тоска и помѣшательство.

Кожа: зудящіе пузырьки и узелки особенно на пальцахъ, рукахъ, ладоняхъ, высыпи, пузыри и гнойнички, угри на лбу и вискахъ, зудъ на кожѣ головы съ выпаденіемъ волосъ, зудъ сосковъ, на мошонкѣ, въ области задняго прохода. Очень блѣдное, даже желтоватое лицо; послѣ полудня жаръ и краснота въ лицѣ.

Опуханіе лимфатическихъ железъ шеи, затылка, слюнныхъ железъ. Ощущеніе колотья въ женскихъ грудныхъ железахъ, съ образованіемъ въ нихъ твердыхъ узловъ. Излѣченіе многолѣтняго затвердѣнія грудной железы съ послѣдовательнымъ исчезновеніемъ обѣихъ грудныхъ железъ при продолжительномъ употребленіи Карбо анималисъ (животнаго угля).

Нервная система.

Головной мозгъ и нервы. Пониженная энергія умственныхъ силъ; неспособность и нежеланіе заниматься и дѣлать какое-либо умственное напряженіе, ослабленіе памяти, тяжелый ходъ мыслей, спутанность понятій; состояніе экзальтаціи. Приступы головокруженія, подергиваній и конвульсивныхъ движеній. Приливы крови къ головѣ, чувство полноты, тяжести, давленія, жара, бьющія, колющія и рвущія боли.

Жженіе, краснота въ лицѣ, глазахъ.

Пораженіе спинномозговыхъ нервовъ, двигательныхъ и чувствительныхъ. Повышеніе чувствительности (гиперестезія), боли—невралгіи, особенно въ суставахъ, напоминающія подагрическія. Затѣмъ наступаетъ періодъ анестезіи, т.-е., потери чувствительности, онѣмѣніе конечностей, потеря чувства осязанія въ пальцахъ.

Органы кровообращенія.

Дѣятельность сердца усилена и ускорена, ощущеніе давленія и боли въ области сердца, сердцебіеніе, ускоренный пульсъ, далѣе неправильный, слабѣющій, нитеобразный пульсъ; застои крови въ большихъ стволахъ, малокровіе и обѣднѣніе кровью мелкихъ и поверхностныхъ сосудовъ, особенно на лицѣ, на рукахъ и ногахъ; волненія крови.

Лихорадочное состояніе съ перемежающимися приступами озноба и жара, ночные и утренніе поты, необыкновенно дурно пахнущіе и окрашивающіе бѣлье въ желтый цвѣтъ; наклонность потѣть днемъ при малѣйшемъ движеніи.

Органы дыханія.

Сильный текучій насморкъ съ сильнымъ раздраженіемъ, закупоривающій насморкъ съ отхожденіемъ по временамъ густой слизи.

Катарръ гортани и дыхательныхъ трубокъ, ощущеніе щекотанія и царапанья въ горлѣ, охриплость до потери голоса, особенно въ ранніе утренніе и вечерніе часы; частое кашлевое раз-

драженіе, съ короткимъ, сухимъ кашлемъ, припадками кашля, съ судорогой голосовой щели и одышка, припадки кашля съ труднымъ отдѣленіемъ слизистой мокроты, судорожный, удушающій кашель; припадки кашля съ жестокою тошнотою и рвотою слизью; припадки кашля послѣ ѣды, при быстрой смѣнѣ температуры вдыхаемаго воздуха и въ поздніе вечерніе часы.

Приливы крови къ легкимъ, ощущенія сдавливанія, тяжести и колотья въ груди; затрудненное дыханіе, одышка, судороги въ груди, страхъ задушенія; тяжелое дыханіе съ клокотаньемъ и хрипомъ въ груди.

Пищеварительные органы.

Дурной запахъ изо рта; десны разрыхлены, отстали отъ зубовъ, блѣдны или сильно покраснѣвши съ образованіемъ изъязвленій и наклонностью кровоточить, боли въ дуплахъ и здоровыхъ зубахъ. Слизистая оболочка рта, щекъ и языка воспалена и болѣзненна, покрыта мелкими пузырьками, языкъ какъ бы опухъ, съ трудомъ ворочается. Усиленное образованіе слизи и слюноотдѣленіе; слюнотеченіе изъ открытаго рта во время сна. Слизистая оболочка глотки воспалена, усиленно отдѣляетъ слизь; опуханіе миндалинъ, затрудненное и болѣзненное глотаніе.

Дурной вкусъ, незначительный и при ѣдѣ скоропреходящій аппетитъ, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ молоку, маслу и жирному мясу; желаніе ѣсть сладкое и соленое (Карбо вегетабилисъ); кислые плоды и пить кислое (Карбо анималисъ), холодную воду, чувство голода; послѣ употребленія вина тягостное ощущеніе жара.

Частая пустая отрыжка или со вкусомъ давно передъ тѣмъ съѣденныхъ кушаній, отрыжка кислой жидкости, тошнота послѣ пріема пищи съ изверженіемъ слизи, тягостное чувство давленія, полноты и недомоганія послѣ ѣды; давленіе въ желудкѣ и судороги; необыкновенное развитіе газовъ въ желудкѣ и кишечникѣ. Вздутіе живота. Боли въ области печени, въ брюшныхъ мышцахъ, колики, урчаніе, частое отхожденіе газовъ безъ запаха или дурно пахнущіе. Частые позывы на низъ съ труднымъ отхожденіемъ незначительнаго количества каловыхъ массъ; сильное натуживаніе съ рѣзью въ животѣ; твердый, рѣдкій, комками стулъ; сильный запоръ; частыя мягкія испражненія съ болями въ животѣ,

желтоватыя и зеленоватыя испражненія, слизистыя, бѣлковыя и незначительныя испражненія, кровянисто-слизистыя выдѣленія съ болями; отхожденіе водянистой, слизистой, острой жидкости изъ задняго прохода безъ позыва на низъ (катарръ слизистой оболочки прямой кишки). Болѣзненныя опуханія геморроидальныхъ венъ, геморроидальныя кровотеченія.

Моче-половые органы.

Болѣзненныя покалыванія въ почкахъ, особенно при движеніи, усиленный позывъ на мочеиспусканіе съ незначительнымъ выдѣленіемъ, жженіе въ мочевомъ каналѣ до и послѣ мочеиспусканія; очень обильное отдѣленіе мочи ночью и рано утромъ.

Пониженное половое чувство, разслабленіе половыхъ органовъ. Отхожденіе секрета предстательной железы при испражненіи (Карбо вегетабилисъ).

Слишкомъ раннее появленіе или запаздываніе мѣсячныхъ на нѣсколько дней, появленіе вновь мѣсячныхъ, отсутствовавшихъ нѣсколько мѣсяцевъ, истеченіе слизи и желтоватаго, даже зеленоватаго выдѣленія до и послѣ регулъ.

Примѣненіе у больныхъ.

При болѣзняхъ съ явленіями лихорадки или безъ таковыхъ, при которыхъ сильно затронута кровь, какъ, напр., при скорбутномъ состояніи, при тифозныхъ лихорадкахъ съ пораженіемъ кишечника, при сыпномъ тифѣ, при омертвѣніи и гнилостномъ распадѣ тканей. При пятнистыхъ пораженіяхъ кожи, при угристомъ лицѣ, при отвердѣніи железъ, нагноеніи ихъ, нарывахъ грудной железы съ дурнымъ выдѣленіемъ у женщинъ, при кровоточащихъ, опухшихъ, разрыхленныхъ деснахъ, при частыхъ носовыхъ кровотеченіяхъ, при воспаленіи слизистой оболочки носа, опуханіи миндалинъ, при окриплости и потерѣ голоса, приступахъ удушающаго кашля, грубомъ кашлѣ съ труднымъ отдѣленіемъ мокроты, сильномъ кашлѣ съ тошнотою и рвотою слизью; при сердцебіеніи, одышкѣ, судорогахъ въ груди, при упадкѣ дѣятельности сердца съ малымъ, неправильнымъ, судорожно сжатымъ пульсомъ и холодными конечностями; при слабости пищеваренія, хроническомъ желудочномъ катаррѣ со слизеотдѣленіемъ и не-

нормальнымъ развитіемъ газовъ въ желудкѣ и кишкахъ, при кишечномъ катаррѣ и при воспалительныхъ процессахъ съ образованіемъ язвъ въ кишкахъ, при опуханіи печени, колikахъ, геморроидальныхъ разстройствахъ, съ кровотеченіями и воспалительнымъ состояніемъ слизистой оболочки прямой кишки; при судорогѣ и катаррѣ мочевого пузыря, ослабленіи половой сферы съ поллюціями безъ возбужденія; при слишкомъ раннихъ или запоздавшихъ мѣсячныхъ съ слизистымъ, разлагающимся выдѣленіемъ; при подагрическихъ пораженіяхъ съ дурно пахнущимъ ночнымъ потомъ и наклонностью къ простудѣ.

Каустикумъ.

(Causticum).

Общее. Это средство принадлежитъ къ числу самыхъ дѣйствительныхъ и является по преимуществу „нервнымъ средствомъ", оказывая значительное вліяніе на клѣтки и волокна головного и спинного мозга. Произведенныя въ нихъ этимъ средствомъ измѣненія обнаруживаются во всемъ состояніи испытуемаго многочисленными симптомами въ различныхъ тканяхъ и органахъ, которые всѣ носятъ характеръ пониженной энергіи и состоянія возбужденія, соединеннаго съ судорожными разстройствами и болѣзненными ощущеніями. Боли самаго различнаго характера и степеней являются въ самыхъ различныхъ мѣстахъ тѣла внутри и снаружи, появляясь и исчезая; къ этому присоединяются приступы дурноты, ощущенія слабости и разбитости во всемъ тѣлѣ, которыя могутъ достигнуть степени параличе-подобнаго состоянія съ дрожаніемъ членовъ. Къ этому состоянію слабости присоединяются пароксизмы возбужденія, которые выражаются или сокращеніями отдѣльныхъ мышечныхъ группъ или конвульсивными движеніями отдѣльныхъ членовъ и вращеніями головы и туловища. Сознаніе или остается неразстроеннымъ, или также измѣнено и разстроено; картина судорогъ сопровождается криками, скрежетомъ зубовъ и вытеканіемъ слюны изъ открытаго рта, вращеніемъ глазъ, такъ что весь приступъ имѣетъ сходство или съ истерическимъ, или эклампти ческимъ, или эпилептическимъ припадкомъ.

Характерна далѣе большая чувствительность испытателей къ холоду и сквозняку, которые вызываютъ давящія боли и ознобъ; ухудшеніе наблюдается въ утренніе и вечерніе часы, равно какъ вызывается незначительными усиліями и движеніями тѣла, вслѣдствіе чего выступаетъ незначительный потъ. Также являются очень тягостными боли въ костяхъ и суставахъ.

Сильная сонливость и наклонность ко сну днемъ, продолжительный сонъ утромъ и безпокойный сонъ ночью, прерываемый кошмарами; безсонница.

Настроеніе духа возбужденное, съ наклонностью къ приступамъ тоски и гнѣва, угнетенное, недовольное, плаксивое, съ безпокойствомъ и страхомъ.

Кожа. Воспаленія, образованія пузырьковъ, узелковъ, съ зудомъ, жженіемъ и болью. Выпаденіе волосъ. Кожа лица блѣдна, безцвѣтна, желтовата съ синими губами; опуханіе подкожной клѣтчатки въ области щекъ.

Мозгъ и нервы. Тяжесть и полнота головы съ головокруженіемъ и ощущеніемъ, какъ у пьянаго, боли различнаго рода: въ головѣ, лицѣ, въ челюстныхъ суставахъ и костяхъ.

Зрѣніе, какъ сквозь вуаль или облако тумана.

Конвульсивныя вращенія головы, туловища, верхнихъ и нижнихъ конечностей, судороги отдѣльныхъ мышцъ, невралгическія боли членовъ и суставовъ.

Органы кровообращенія.

Судорожное сокращеніе сердца, сердцебіеніе, неправильный, малый пульсъ.

Лихорадочное состояніе съ преобладающими явленіями озноба, вечеромъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ чувство жара, рано утромъ потъ по всему тѣлу, пахнущій сильно кисло.

Органы дыханія.

Насморкъ, катарръ горла и воздухоносныхъ трубокъ, охриплость, кашель сухой и продолжительный съ труднымъ отдѣленіемъ мокроты, боли и колотья въ груди, стѣсненіе дыханія, одышка, по временамъ астматическіе приступы.

Пищеварительные органы.

Воспалительныя явленія въ полости рта, образованіе пузырьковъ на языкѣ, щекахъ, небѣ; воспаленіе и изъязвленіе десенъ съ шатающимися зубами и зубною болью, усиленное отдѣленіе слюны, катарръ слизистой оболочки глотки съ отдѣленіемъ вязкой слизи, затрудненное глотаніе; дурной вкусъ, отвращеніе къ сладкому, отсутствіе аппетита, жажда. Отрыжка, изжога, рвота кислою жидкостью, боли и судороги въ желудкѣ. Запоры, тщетные и болѣзненные позывы на стулъ, сухія, комкообразныя, покрытыя слизью и кровью массы; вязкія, свѣтло окрашенныя, глинообразныя массы. Геморроидальныя шишки, вызывающія боли въ заднемъ проходѣ.

Мочевые органы.

Боли въ области почекъ, мочевого пузыря, съ задержаніемъ мочи; позывы на мочу съ затрудненнымъ, болѣзненнымъ мочеиспусканіемъ. Частые позывы съ обильнымъ отхожденіемъ водянисто-свѣтлой мочи, темной мочи съ слизистымъ осадкомъ, непроизвольное выдѣленіе мочи, ночное недержаніе мочи, легкое отхожденіе мочи, почти непроизвольное, при внезапномъ движеніи, при кашлѣ, чиханіи и насморкѣ.

Половые органы мужчинъ: повышенное желаніе, продолжительныя эрекціи, частыя поллюціи, затѣмъ упадокъ полового отправленія.

Половые органы женщинъ: раннее наступленіе кровей, съ обильнымъ выдѣленіемъ крови, слизи.

Примѣненіе у больныхъ.

Главнымъ образомъ при хроническихъ болѣзняхъ и пораженіяхъ съ незначительными лихорадочными явленіями. Такъ, при зачаточной или выраженной эпилептиформной судорогѣ, при истерическомъ припадкѣ, при слабости и параличѣ отдѣльныхъ членовъ, при хроническихъ пораженіяхъ кожи различнаго рода, при золотушномъ воспаленіи глазъ и ушей, при катаррахъ носа, гортани, бронховъ, при пораженіяхъ сердца нервнаго или орга-

ническаго характера, при катаррѣ желудка и кишекъ, запорахъ, геморроидальныхъ осложненіяхъ, при судорогѣ и боли въ пузырѣ, задержаніи мочи, непроизвольномъ мочеотдѣленіи, ночномъ недержаніи мочи; при ненормально повышенномъ или пониженномъ половомъ чувствѣ, при обильныхъ мѣсячныхъ и бѣляхъ, при хроническомъ суставномъ ревматизмѣ и подагрическихъ приступахъ.

Коккулюсъ.

(Cocculus indicus).

Общее. Появленіе въ одной половинѣ болей, судорогъ и другихъ разстройствъ; хрустѣніе и щелканіе въ суставахъ, особенно при хожденіи; отъ одного сустава къ другому перепрыгивающія подагрическія боли, чувство разбитости, усталости и упадка силъ, ослабленіе рукъ и ногъ, подергиванія отдѣльныхъ мышцъ, односторонній параличъ. Повышенная чувствительность всего тѣла къ прикосновенію; многія явленія возобновляются при прикосновеніи къ больной части. Ухудшеніе многихъ разстройствъ при ѣдѣ, питьѣ (пищевареніи), спаньѣ, разговорѣ, куреніи, употребленіи кофе, душевныхъ напряженіяхъ и отъ свѣжаго воздуха, отъ ѣзды въ вагонахъ. Судорожное сжатіе челюстей, скрежетаніе зубами, судороги туловища, эпилептическіе припадки. Большинство болей и болѣзненныхъ разстройствъ появляется во время покоя тѣла и достигаютъ при этомъ наибольшаго напряженія, затѣмъ уменьшаются отъ тихаго покачиванія туда и сюда пораженной части.

Сонъ: непреодолимая сонливость днемъ, безсонница съ чувствомъ тоски, страшныя сновидѣнія.

Настроеніе духа: необыкновенная чувствительность къ противорѣчіямъ съ наклонностью огорчаться; безпокойная дѣятельность, суетливость; затѣмъ замкнутость, упадокъ духа, печальное настроеніе, наклонность къ слезамъ, безпокойное и смутное состояніе.

Кожа: сильный зудъ, царапанье и жженіе съ высыпью маленькихъ, красненькихъ узелковъ и мелкихъ наполненныхъ гноемъ пузырьковъ.

Железы: опуханіе слюнныхъ железъ, лимфатическихъ, ощущеніе жара и колотья въ болящихъ и твердыхъ опухоляхъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ: головокруженіе съ тошнотою и наклонностью къ рвотѣ; сильныя головныя боли, усиливающіяся отъ хожденія, разговора и движенія головы. Конвульсивное дрожаніе головы, эпилептоидныя судороги, невралгіи личныя съ опуханіемъ тканей. Сухость, жженіе и боли въ глазахъ, суженіе зрачковъ, неясность зрѣнія, обманы зрѣнія. Шумъ въ ушахъ, ослабленіе слуха.

Спинной мозгъ: Боли въ мышцахъ, суставахъ. Двухсторонніе и односторонніе параличи верхнихъ и нижнихъ конечностей.

Органы кровообращенія.

По наблюденіямъ Schroff'a 2 стгрм. Пикротоксина (дѣйствующее начало растенія) производятъ пониженіе пульса съ 82 до 66 въ теченіе 15 минутъ и затѣмъ вновь въ теченіе 10 мин. поднятіе до прежняго числа ударовъ—82, послѣ чего наблюдается еще разъ замедленіе пульса до 68 ударовъ въ теченіе часа; пульсъ при этомъ малъ и слабъ. При объективномъ пониженіи температуры субъективное ощущеніе жара и холода. Лихорадочное состояніе незначительно, ознобъ, жаръ и небольшой потъ слѣдуютъ другъ за другомъ въ частой смѣнѣ. Лицо и конечности то красны и горячи отъ прилива крови, то холодны и блѣдны, вслѣдствіе ея отлива. Колебанія и незначительная продолжительность отдѣльныхъ фазъ лихорадочнаго движенія, частыя смѣны давленія въ сосудистой системѣ съ характеромъ упадка жизненной энергіи являются отличительными для выдѣляемыхъ этимъ средствомъ лихорадочныхъ явленій.

Органы дыханія.

Насморкъ; чиханіе подавляется свѣжимъ холоднымъ воздухомъ; изъ носа отдѣляется слизь съ кровью. Судороги гортани и бронховъ, съ кашлемъ и незначительнымъ отдѣленіемъ слизи.

Хрипящіе и свистящіе дыхательные шумы, сжиманіе груди и затрудненное дыханіе.

Пищеварительные органы.

Усиленное слюноотдѣленіе, слизистый налетъ на языкѣ. Затрудненное глотаніе, вслѣдствіе опуханія небныхъ железъ; судорога глотки и невозможность глотать, вслѣдствіе катарральнаго пораженія слизистой оболочки глотки. Необыкновенный, непріятный вкусъ во рту; отсутствіе аппетита; отвращеніе къ пищѣ и напиткамъ. Частая пустая отрыжка, тошнота (отъ дѣйствія холода, ѣзды въ вагонахъ, глотанія, ѣды, питья), рвота пищевою смѣсью и слизью (въ полночь съ боязнью задушенія), судороги и боли въ желудкѣ.

Сильное развитіе газовъ, вздутіе живота, рѣзи, судороги брюшныхъ мышцъ; давленіе въ паховое кольцо и расширеніе канала, какъ будто бы образуется грыжа. Позывы на стулъ съ запоромъ или затрудненнымъ опорожненіемъ, или частыя отхожденія жидкихъ, свѣтло окрашенныхъ массъ. Послѣ отхожденія кала сильная судорога задняго прохода; безъ стула царапающія и болѣзненныя ощущенія въ заднемъ проходѣ.

Моче-половые органы.

Болѣзненное ощущеніе давленія въ области почекъ; задержаніе мочи; частые позывы съ труднымъ и незначительнымъ выдѣленіемъ,—позднѣе обильное выдѣленіе мочи. Повышенная чувствительность половыхъ органовъ, съ усиленіемъ полового чувства. Раннее наступленіе мѣсячныхъ съ судорожными болями внизу живота. Появленіе вновь задержанныхъ въ теченіе года мѣсячныхъ; маточныя кровотеченія, бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

При безлихорадочныхъ заболѣваніяхъ или сопровождающихся незначительною лихорадкою у нервно-раздражительныхъ и слабыхъ лицъ, съ судорогами, головокруженіемъ, головными болями, невралгіями различнаго рода; при функціональныхъ параличахъ безъ перерожденія нервной ткани; при ревматическихъ и подагри-

ческихъ пораженіяхъ суставовъ безъ рѣзко выраженныхъ воспалительныхъ явленій; при судорогахъ глотки, желудка, коликахъ, при ущемленіи грыжъ и расширеніи пахового канала, вслѣдствіе разслабленія волоконъ пупартовой связки; при судорогѣ мочевого пузыря, при половомъ возбужденіи съ нервными болями въ сѣмянныхъ канатикахъ; при преждевременномъ, значительномъ мѣсячномъ кровотеченіи, при коликахъ матки, кровотеченіи маточномъ, бѣляхъ.

Коніумъ.

(Conium maculatum).

Общее. Чувство разбитости, усталость, мышечная слабость, конвульсіи верхнихъ конечностей съ параличемъ нижнихъ, боли различнаго рода, приливы крови и кровотеченія. Приступы плача съ головною болью. Ухудшеніе отъ покоя, свѣжаго воздуха, холода, въ утренніе и ночные часы.

Настроеніедуха. Сильное возбужденіе съ припадками гнѣва. Равнодушіе и безучастность, плаксивость.

Сонъ крѣпкій, глубокій, продолжительный, безсонница вслѣдствіе безпокойства, страха и различныхъ болѣзненныхъ явленій.

Зудъ кожи, высыпь пузырьковъ, мелкихъ гнойничковъ, выпаденіе волосъ.

Опуханіе железъ съ болѣзненными ощущеніями. Воспалительныя явленія въ отвердѣлой грудной железѣ (скирръ).

Нервная система.

Мозгъ и нервы: Нежеланіе работать, ослабленіе памяти, невозможность разговора (афазія), слабость мышленія, головокруженіе, легкое опьянѣніе отъ самыхъ малыхъ количествъ спиртныхъ напитковъ. Головныя боли, приливы крови къ головѣ, приступы дурноты. Переполненіе кровью глазъ, двойное зрѣніе, обманъ зрѣнія.

Конвульсіи, мышечныя судороги, невралгіи.

Органы кровообращенія.

Сильное сердцебіеніе, ускоренный пульсъ, жаръ, потъ, небольшая жажда, приступы озноба, интермиттирующій (перемежающійся) типъ лихорадки. Переполненіе и застои крови въ капиллярахъ и венахъ.

Органы дыханія.

Частое чиханіе при сухомъ носѣ; текучее отдѣленіе потокомъ водянистой слизи изъ носа. Катарральное пораженіе слизистой оболочки гортани и дыхательныхъ трубокъ съ незначительнымъ отдѣленіемъ слизи, но съ повышенною нервною раздражительностью; охриплость, чувство щекотанія и царапанія въ гортани и дыхательномъ горлѣ; безпрерывное, короткое и сухое покашливаніе, приступы судорожнаго кашля, судорога голосовой щели, рыхлый кашель съ мокротою. Приступы кашля съ кровянистой слизью, выбрасываніемъ желтыхъ гнойныхъ массъ. Сжатіе груди, тяжелое дыханіе съ болями въ груди, стѣсненіе дыханія.

Органы пищеваренія.

Сухой, обложенный языкъ, опухшій, тяжелый, болѣзненный, запинающаяся, тяжелая рѣчь. Зубная боль. Слюнотеченіе. Затрудненное глотаніе, чувство опухоли въ глоткѣ, судорога глотанія. Отсутствіе аппетита и отвращеніе къ пищѣ, ухудшеніе послѣ кислаго и соленаго, сильный голодъ, послѣ ѣды чувство тяжести, сильной жажды, отрыжка и срыгиваніе кислой жидкости, гнилостная отрыжка, изжога, вздутіе желудка газами; вздутіе, твердость живота, тошнота и рвота, рвота слизью, болѣзненное давленіе въ поджелудочной ямочкѣ, рѣжущія, рвущія, тянущія боли въ печени; сильныя колики, урчаніе газовъ, судорожныя подергиванія отдѣльныхъ мышечныхъ волоконъ брюшныхъ мышцъ. Отхожденіе значительнаго количества газовъ, частые позывы на стулъ безъ результата, позывы съ отхожденіемъ незначительнаго количества жидкаго кала, кашицеобразный жидкій стулъ, отхожденіе дурно пахнущей слизи и даже крови изъ задняго про-

хода съ жженіемъ и чувствомъ жара въ заднемъ проходѣ; зудъ и колотье въ заднемъ проходѣ безъ отхожденія стула.

Моче-половые органы.

Судорожное ощущеніе давленія въ пузырѣ, задержаніе мочи, трудное и болѣзненное отхожденіе, частые позывы, то съ незначительнымъ, то съ обильнымъ отхожденіемъ мочи; ночное недержаніе мочи, щекотаніе, жженіе и боли въ мочевомъ каналѣ, отхожденіе крови изъ канала безъ выдѣленія мочи. Выдѣленіе слизи и гноя изъ мочевого канала.

Зудъ и жженіе половыхъ органовъ, воспалительное состояніе, болѣзненныя эрекціи, пониженное половое чувство,—затѣмъ, позднѣе, очень возбужденное половое чувство съ частыми потерями сѣмени. Зудъ, жженіе, колотье въ женскихъ половыхъ частяхъ, прекращеніе только что появившихся мѣсячныхъ съ болями въ спинномъ крестцѣ; запоздалое появленіе мѣсячныхъ; отхожденіе буроватой менструальной крови. Истеченіе бѣлой слизи ѣдкихъ свойствъ изъ влагалища, сливкообразныя бѣли, съ болями въ маткѣ, пахахъ и крестцѣ.

Примѣненіе у больныхъ.

При душевныхъ болѣзняхъ, особенно, если имѣетъ мѣсто частое носовое кровотеченіе, или также хроническое опуханіе печени или селезенки съ вялостью кишечной мускулатуры; при золотушныхъ воспаленіяхъ ушей и глазъ, при экзематозныхъ пораженіяхъ кожи съ значительнымъ ночнымъ ухудшеніемъ, при ячменѣ; при раковидныхъ язвахъ губъ, щекъ, носа; при боляхъ и измѣненіяхъ ткани вслѣдствіе паденія, удара, разминанія и пр.; при воспаленіи мозга у дѣтей; при катаррѣ съ сухимъ, царапающимъ кашлемъ, значительною разбитостью, безпокойствомъ и жаждою, при гриппѣ и коклюшѣ съ ночнымъ ухудшеніемъ, при старческомъ удушіи (астмѣ) съ щекочущимъ кашлемъ, при выкашливаніи крови у онанистовъ. Далѣе при судорогѣ желудка съ запорами, боли и опуханіи печени съ желтухою, болѣзненномъ скопленіи газовъ въ желудкѣ и кишечникѣ, при коликахъ; при разстройствахъ половой сферы, при половой слабости, выдѣленіи

сока предстательной железы, слабыхъ эрекціяхъ, при судорогѣ мочевого пузыря и воспаленіи; при слишкомъ скудныхъ мѣсячныхъ, при коликахъ матки, острыхъ бѣляхъ; при истерическихъ пораженіяхъ у худосочныхъ женщинъ; при опуханіи лимфатическихъ железъ, золотухѣ железъ; при отвердѣніяхъ женскихъ грудныхъ железъ; при чрезмѣрномъ напорѣ молока у роженицъ, которыя не должны кормить, при произвольномъ выдѣленіи водянистаго молока послѣ родоразрѣшенія.

Коффеа.

(Coffea).

О б щ е е. По наблюденіямъ Böcker'а, ограничиваетъ выдѣленіе почками твердыхъ составныхъ частей мочи за исключеніемъ фосфорнокислой соли, равно какъ выдѣленіе воды и углекислоты чрезъ легкія, при чемъ въ крови скопляется много несущихъ углекислоту кровяныхъ тѣлецъ,—задержка въ крови окислительныхъ процессовъ.

По наблюденіямъ Troschel'я у дѣвушки, выпившей 32 чашки настоя изъ 120 граммовъ кофе, появились: рвота, головокруженіе, жаръ и потъ, головная боль, лихорадка, чувство шнура вокругъ шеи, затрудненное дыханіе, потеря рѣчи, безсонница, задержаніе мочи, моча спустя лишь 5 дней была выпущена помощью катетера, столь же долго держались отсутствіе аппетита и боли въ желудкѣ.

Послѣ пріема 8 дециграммъ Коффеина наблюдалось сильное возбужденіе сосудистой и нервной системъ, сердцебіеніе, частый, неправильный, иногда исчезающій пульсъ, давленіе въ груди, головная боль, помраченіе чувствъ, шумъ въ ушахъ, искры предъ глазами, возбужденіе фантазіи, позднѣе помѣшательство, галлюцинаціи, бредъ, въ концѣ концовъ, глубокій сонъ.

Ощущеніе легкости въ головѣ и членахъ, повышенное чувство благосостоянія и жизненной энергіи, необыкновенная чувствительность и раздражительность тѣла, ухудшеніе отъ холода и свѣжаго воздуха, гипохондрическія и истерическія явленія, чувство усталости въ рукахъ и ногахъ, волненія крови; пораженія кожи,

отслоеніе эпителія, образованіе язвъ, пустулъ, особенно въ лицѣ.

Напоръ крови на мозгъ, жестокія головныя боли, мигрени. Зубная боль.

Сердцебіеніе, лихорадочныя явленія съ частой смѣною жара и зноба.

Насморкъ; носовое кровотеченіе.

Катарральное раздраженіе дыхательныхъ путей. Легочныя кровотеченія.

Тошнота, рвота, боли въ желудкѣ.

Позывы на стулъ. Запоры. Поносъ. Слизе и кровеотдѣленіе изъ геморроидальныхъ шишекъ.

Частые позывы на мочу съ задержкою; частое и обильное испусканіе свѣтлой мочи.

Ослабленіе половыхъ органовъ; эрекціи и частыя поллюціи.

Неправильныя мѣсячныя, маточныя кровотеченія, бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

При нервныхъ боляхъ гипохондрическаго и истерическаго характера, при мигреняхъ, безсонницѣ, нервномъ возбужденіи, нервномъ сердцебіеніи, слабости пищеваренія, судорогѣ желудка, коликахъ, геморроидальныхъ разстройствахъ, кровотеченіяхъ изъ носа, горла, матки.

Кроталюсъ.

(Змѣиный ядъ Crotalus).

Общее. Разбитость и быстрый упадокъ силъ, приступы общей слабости и дурноты, дрожь всего тѣла, приступы дрожанія и конвульсій членовъ, истеченіе крови изо рта, носа, ушей, задняго прохода; параличи, остающійся односторонній параличъ; быстро мѣняющіяся и часто возвращающіяся боли; кости конечностей особенно поражаются болями; послѣ двухдневной паузы покоя возвращеніе тяжелыхъ болѣзненныхъ разстройствъ; поражается по преимуществу правая половина тѣла; ухудшеніе въ ранніе утренніе часы.

Сонливость, весьма сильная, непреодолимая. Раздражительное душевное состояніе, доходящее до экзальтаціи. Равнодушіе, подавленность, безпокойство, боязнь людей.

Нервная система.

Упадокъ умственной энергіи, страхъ предъ умственными напряженіями и дѣятельностью; афазія и парафазія (на письмѣ и словахъ), необыкновенное ослабленіе памяти. Оглушеніе, головокруженіе, блѣдность лица, головныя боли, тошнота, рвота, улучшеніе отъ свѣжаго воздуха. Лицевыя боли, параличное отвисаніе нижней челюсти.

Болѣзненность глазного яблока, катарръ оболочекъ, слезотеченіе, желтушное окрашиваніе глазъ, ослабленіе зрѣнія, расширеніе зрачковъ.

Ревматическія боли мышцъ спины, конечностей, дрожащія холодныя руки, кровоизліянія подъ ногти пальцевъ.

Боли въ костяхъ конечностей, наступленіе на подошвы болѣзненно, опуханіе подошвъ съ мѣняющимися ощущеніями холода и жженія въ подошвахъ въ вечерніе часы.

Кожа: мраморная, желтая, красная, синяя—пятнами, также зеленоватыя и черносинія пятна съ зудящими колотьями въ различныхъ мѣстахъ; общее желтушное окрашиваніе; кровоизліянія изъ капилляровъ кожи; высыпь маленькихъ пузырьковъ на лицѣ, туловищѣ и конечностяхъ, переходящихъ частью въ изъязвленія. Общее водяночное пропитываніе и опуханіе кожи и подкожной клѣтчатки.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе; пульсъ малъ и скоръ—очень замедленъ и едва ощутимъ; частота пульса поднимается съ 80 до 130; пульсъ попеременно полонъ и крѣпокъ, или твердъ, малъ и скоръ; вибрирующій пульсъ. Ознобъ съ холодными конечностяхи; сухой жаръ съ сильною жаждою. Наклонность мелкихъ сосудовъ къ разрывамъ; выхожденіе красныхъ кровяныхъ шариковъ въ ткани per diapedesin, т.-е., пропитываніемъ (безъ разрыва стѣнки сосуда),—кровавый потъ.

Органы дыханія.

Сильное чиханіе; носовыя кровотеченія свѣтлою, жидкою кровью. Болѣзненная чувствительность гортани при дотрогиваніи, голосъ слабъ, охрипшій. Затрудненное дыханіе, сжиманіе груди. Кашель съ болью въ груди и кровавою мокротою.

Органы пищеваренія.

Дурной запахъ изо рта; десна кровоточатъ, зубы шатаются и выпадаютъ. Усиленное слюнотеченіе. Сухой, бурый, опухшій языкъ, затрудненное движеніе его и разговоръ, отрыжка; изжога, тошнота, рвота (желудокъ удерживаетъ только желе, кофе и немного вина), боли въ желудкѣ. Животъ вздутъ, чувствителенъ къ дотрогиванію; болѣзненность печени и селезенки. Частый, жидкій стулъ, непроизвольныя испражненія, кровотеченія изъ прямой кишки.

Моче-половые органы.

Позывы усиленные, моча окрашена красящимъ веществомъ желчи, кровотеченія изъ канала.

Примѣненіе у больныхъ.

При болѣзненномъ измѣненіи крови, при ея разложеніи, при скорбутѣ, опуханіи лимфатическихъ железъ, воспаленіи и нагноеніи. При воспаленіи и нагноеніи кожи и подкожной клѣтчатки съ образованіемъ нарывовъ и язвъ; гнойничковомъ пораженіи кожи у малокровныхъ; при пораженіи печени, селезенки и почекъ съ желтухою и водянкою; при тифозныхъ и перемежающихся лихорадкахъ; при чумѣ; при психозахъ экстатическаго и меланхолическаго характера.

Купрумъ.

(Cuprum).

О б щ е е. Есть лица, нечувствительныя къ дѣйствію малыхъ дозъ металлической мѣди; но у большинства послѣ продолжи-

тельнаго дѣйствія таковыхъ обнаруживаются слѣдующіе симптомы хроническаго отравленія мѣдью: металлическій вкусъ, зеленоватое окрашиваніе волосъ, разстройство пищеваренія, тошнота и рвота, колики, поносы, конвульсіи, параличи, хроническая лихорадка. При отравленіи солями мѣди: боль головы, тошнота, большая разбитость, дрожь, судороги, малый, неправильный пульсъ, рвота, жестокія колики съ поносомъ или запоромъ, бредъ, конвульсіи.

Мѣдь проницаетъ всѣ ткани тѣла, соединяется съ клѣточными бѣлками, находится въ печени, селезенкѣ, кровяныхъ тѣльцахъ и выдѣляется съ желчью и мочею.

Нервная система.

Бредъ, бредовыя идеи, безуміе, безпамятство, эпилептиформныя судороги, съ потерею сознанія. Жестокія головныя боли. Давящія, тянущія боли въ мышцахъ, ревматическія боли въ суставахъ, судорожныя подергиванія мышечныхъ волоконъ, судороги мышцъ конечностей, подергиванія, конвульсіи пальцевъ рукъ и ногъ.

Органы кровообращенія.

Ускоренный, малый и твердый пульсъ, лихорадочное состояніе; ознобъ съ холодною кожею, особенно конечностей. Сердцебіеніе.

Органы дыханія.

Частое чиханіе, текучій и сухой насморкъ; катарръ гортани, охриплость, приступы судорожнаго кашля, особенно ночью, съ припадками задушенія, кашель съ выдѣленіемъ крови, кашель съ наклонностью ко рвотѣ. Легкія переполнены кровью, сильный приливъ крови съ сильными спазмами въ груди, одышкою, страхъ задушенія, боли въ груди.

Пищеварительные органы.

Слизисто обложенный языкъ, слюнотеченіе; катарръ слизистой оболочки глотки, воспаленіе небныхъ железъ. Металлическій вкусъ, судорога глотки при глотаніи, звукъ отъ проглатыванія жидкости въ горлѣ.

Тошнота, рвота, отрыжка, боли и судороги желудка.

Вздутый или втянутый животъ, болѣзненность области печени, урчаніе газовъ въ кишкахъ, колики, запоры, поносы (кровянистыя, студенистыя массы при воспаленіи кишечника) со слизью и и желчью съ сильнымъ натуживаніемъ.

Моче-половые органы.

Частые позывы на мочу съ отхожденіемъ незначительнаго количества ея, мутная и темнокрасная моча съ осадкомъ мочекислыхъ солей.

Возбужденіе половое и поллюціи.

Примѣненіе у больныхъ.

При безлихорадочныхъ и хроническихъ, равно какъ при лихорадочныхъ и острыхъ болѣзняхъ, при душевныхъ разстройствахъ съ бредовыми идеями, при эпилепсіи, при конвульсіяхъ, Виттовой пляскѣ, дрожаніи и параличной слабости членовъ, при невралгіяхъ, при остромъ и хроническомъ ревматизмѣ, при катаррахъ гортани и бронховъ, охриплости, коклюшѣ, судорогѣ голосовой щели, воспаленіи легкихъ у слабыхъ лицъ, при кишечныхъ катаррахъ съ рѣзью въ животѣ и позывахъ на стулъ, при холеринѣ и холерѣ, при страданіяхъ печени, почекъ съ водянкою, при малокровіи и истощеніи съ приливами къ половымъ органамъ, при подавленныхъ мѣсячныхъ, при накожныхъ болѣзняхъ и скорбутическихъ пораженіяхъ.

Ликоподіумъ.

(Lycopodium).

Общее. Разнородныя боли въ различныхъ частяхъ тѣла, приступы дурноты, сильное утомленіе послѣ небольшого усилія, ощущеніе внутренняго холода и застоя крови, судорожные припадки, непріятное ощущеніе при нахожденіи въ тепломъ и замкнутомъ помѣщеніи, желаніе двигаться на свѣжемъ воздухѣ; повышенная

чувствительность къ холоду, появленіе и ухудшеніе многихъ разстройствъ послѣ полудня въ 4 —8 часовъ; усиливаются заболѣванія костной ткани.

Сонъ недостаточный, безпокойный, безпокойные сны, кошмары.

Состояніе духа: недовольство, нетерпѣніе, раздражительность, приступы гнѣва и вспыльчивости, наклонность къ спору, человѣкобоязнь, тоскливость, боязливость. Безпричинная смѣна плача и смѣха.

Кожа и железы. Блѣдность лица, сѣрый и желтоватый цвѣтъ лица, жаръ въ лицѣ, опуханіе лица съ красными пятнами. Сильный зудъ кожи; пятнистая высыпь на различныхъ частяхъ тѣла, экзематозная сыпь, пузыри, угристые гнойнички, печеночныя пятна.

Опуханіе лимфатическихъ и слюнныхъ железъ; воспалительное опуханіе миндалинъ, поверхностное съ изъязвленіями, глубокое—паренхиматозное, съ нагноеніемъ. Воспаленіе лимфатическихъ железъ въ подмышкахъ и пахахъ.

Нервная система.

Мозгъ. Ослабленіе интеллектуальныхъ силъ, сообразительности, мышленія, памяти. Приливы крови къ головѣ, боли, головокруженіе, судорожныя подергиванія личныхъ мышцъ.

Органъ зрѣнія. Катарральное пораженіе вѣкъ и глазъ, слизе-и слезотеченіе, свѣтобоязнь. Разстройство и обманы зрѣнія.

Въ ушахъ шумы, болѣзненныя ощущенія, приливы крови, воспалительныя пораженія.

Спинной мозгъ. Боли въ мышцахъ, суставахъ, невралгіи различнаго рода.

Органы кровообращенія.

Сильное сердцебіеніе, давленіе, боли въ области сердца. Лихорадочное состояніе: ознобъ, жаръ, потъ, съ сильною жаждою. Ощущеніе жара и жженія на различныхъ частяхъ тѣла.

Органы дыханія.

Катарръ слизистой оболочки носа (насморкъ), гортани, бронховъ; хрипы, грубый, сухой кашель, лающій, съ болью въ груди. Приступы кашля ночью и рано утромъ. Мокрота гнойная, желтоватаго цвѣта или слизистая, сѣроватаго или зеленоватаго цвѣта. Одышка при подъемѣ на лѣстницу, переполненіе кровью легкихъ. Боли въ груди при глубокомъ дыханіи и кашлѣ.

Органы пищеваренія.

Воспалительное опуханіе десенъ, языка, губъ, слизистой оболочки рта, зѣва, миндалинъ. Обильное выдѣленіе слизи и слюны. Отвращеніе отъ пищи, отсутствіе аппетита. Отрыжка, тошнота, рвота пищью, слизью, желчью, свернувшеюся кровью. Боли и вздутіе желудка. Боли въ подреберьяхъ, области печени. Вздутіе живота, рѣзь (со рвотою и поносомъ). Урчаніе, колики, отхожденіе вѣтровъ. Позывы на стулъ, затрудненное опорожненіе, вслѣдствіе вялости кишечной мускулатуры. Мягкія, кашицеобразныя и жидкія испражненія нѣсколько разъ въ день, слизистыя, свѣтло-желтыя массы, выдѣленіе крови изъ прямой кишки при мягкомъ стулѣ, опуханіе геморроидальныхъ венъ и узловъ, зудъ, жженіе, колотье въ заднемъ проходѣ.

Моче-половые органы.

Болѣзненныя ощущенія въ области почекъ, боли въ пузырѣ, въ мочевомъ каналѣ. Выдѣленіе крови изъ канала (изъ венъ шейки пузыря). Въ началѣ уменьшеніе мочи, затѣмъ частое и обильное мочеиспусканіе. Моча содержитъ мочекислыя соли, почечный песокъ. Ослабленіе полового чувства съ отсутствіемъ эрекцій, вялость половыхъ частей. Затѣмъ усиленіе полового чувства съ поллюціями, съ ощущеніемъ крайняго ослабленія и истощенія. Раннее наступленіе или возвращеніе исчезнувшихъ мѣсячныхъ. Бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

По преимуществу при хроническихъ болѣзняхъ: раздражительности, мрачномъ настроеніи, боляхъ головы вслѣдствіе приливовъ, невралгіяхъ, суставныхъ боляхъ, судорогахъ мышцъ, ревматическихъ и подагрическихъ пораженіяхъ мышцъ, фиброзной ткани и суставовъ, при слабости, холодѣ, онѣмѣніи конечностей, при пораженіяхъ кожи: экзематозныхъ, импетигинозныхъ и другихъ сыпяхъ, чирьяхъ, печеночныхъ пятнахъ, при варикозныхъ, золотушныхъ и артритическихъ язвахъ, ослабляющихъ потахъ; при воспаленіяхъ железъ слюнныхъ и лимфатическихъ съ хроническими отвердѣніями и длительными нагноеніями. При воспалительныхъ пораженіяхъ глазъ, ушей, золотушнаго характера, воспаленіи слизистой оболочки рта, опуханіи миндалинъ. При хроническихъ катаррахъ желудка и кишечника, съ отсутствіемъ аппетита, слабостью пищеваренія, изжогой, отрыжкой, рвотой, вздутіемъ живота, коликами, геморроидальными разстройствами; при заболѣваніяхъ печени различнаго рода, при наклонности къ грыжѣ. При пораженіяхъ мочевыхъ органовъ: разстройствахъ почекъ, образованіи песку и камней, судорогахъ и катаррѣ пузыря, хроническомъ трипперѣ, водянкѣ. При разстройствахъ половой сферы: половомъ безсиліи, поллюціяхъ, разстройствахъ мѣсячныхъ, бѣляхъ, выпаденіи и другихъ разстройствахъ положенія матки. При пораженіи дыхательныхъ органовъ: хроническомъ катаррѣ гортани и бронховъ съ охриплостью, кашлемъ, одышкою, особенно при состояніяхъ сильнаго истощенія и переутомленія, сопровождающихъ вышеуказанныя болѣзненныя разстройства.

Ляхезисъ.

(Змѣиный ядъ Trigonocephalus Lachesis).

Общее. Подобно тому, какъ прочіе змѣиные яды и животные яды вообще, Ляхезисъ дѣйствуетъ, кромѣ своего специфическаго вліянія на нервныя клѣтки и волокна, также разстраивающимъ образомъ на жизнеспособность кровяныхъ клѣтокъ и раз-

рушающимъ—на всю массу крови. Онъ возбуждаетъ боли различнаго рода и ощущеніе пульсаціи въ различныхъ частяхъ тѣла, необыкновенный упадокъ силъ тѣла и духа, разслабленіе и истощеніе всѣхъ силъ, стремленіе лежать, въ особенности до обѣда, а также и послѣ обѣда; также затронуто и разстраивается общее самочувствіе, какъ бы послѣ недостаточнаго отдыха; ломота въ мышцахъ, приступы дурноты, дрожи и судороги; общія судороги всего тѣла и приступъ тетаніи, мѣняющееся наступленіе разстройствъ въ одной половинѣ тѣла.—Весенній воздухъ, путешествіе, употребленіе вина, куреніе табаку ухудшаютъ разстройства, въ часы утренніе и вечерніе многія разстройства дѣлаются ощутимѣе, равно непосредственно по пробужденіи отъ сна (равно и послѣ послѣобѣденнаго сна); свѣжій воздухъ дѣйствуетъ благотворно.

Сонъ очень глубокъ, неспокойный, поздно наступаетъ, несмотря на сильную усталость и сонливость днемъ и вечеромъ; еще цѣлыя недѣли держится позднее засыпаніе; разстраивается многими припадками: кашлемъ, тошнотою, потомъ, поллюціями и пр.

Состояніе духа: повышенное чувство благосостоянія и веселія, разговорчивости, суетливой дѣловитости, легкое подпаданіе аффектамъ (горю, гнѣву); — подавленное, тоскливое, печальное, нежеланіе ничѣмъ заняться.

Зудящія сыпи на кожѣ различнаго рода, опуханіе кожи и клѣтчатки на головѣ и лицѣ. Выпаденіе волосъ. Образованіе бородавокъ на рукахъ.

Нервная система.

Мозгъ. Легкое ослабленіе душевной дѣятельности—уменьшеніе энергіи интеллектуальныхъ силъ, вялость, разсѣянность и нежеланіе сдѣлать малѣйшее усиліе. Сильный приливъ крови къ головѣ, тяжесть, головокруженіе, боли въ различныхъ частяхъ головы; лицевыя боли.

Ощущеніе зуда, давленія, жженія и колотья въ вѣкахъ и глазахъ, слезотеченіе, покраснѣніе соединительной оболочки вѣкъ, опуханіе вѣкъ, свѣтобоязнь, помутнѣніе зрѣнія.

Болѣзненная опухоль сзади ушей, ощущеніе притупленія слуха, зуда и болѣзненности въ слуховомъ проходѣ, жаръ, біеніе въ ухѣ, скопленіе бѣлой ушной сѣры. Галлюцинаціи слуха. Плохой слухъ.

Незначительное носовое кровотеченіе, опуханіе ткани, зудъ и болѣзненность въ ноздряхъ.

Спинной мозгъ. Боли разнаго рода въ мышцахъ, суставахъ, нервахъ, ощущенія разбитости и паралича членовъ. Странствованіе болей слѣва направо.

Органы кровообращенія.

Судорожныя боли въ области сердца съ сердцебіеніемъ и чувствомъ тоски, сердцебіеніе съ ощущеніемъ дурноты, сильная пульсація артерій и ощущеніе біенія въ груди и животѣ. Венозные застои крови съ отеками. Приливы крови съ ощущеніемъ жара.

Лихорадочное состояніе: ознобъ съ дрожью, затѣмъ жаръ съ горячими руками и ногами, продолжительное ощущеніе озноба безъ жажды и послѣдующихъ жара и пота; приступы жара и пота, сильные ночные поты, но и днемъ также легкое и обильное потоотдѣленіе. Пульсъ полный и твердый.

Органы дыханія.

Сильное чиханіе, текучій насморкъ, водянистое и слизистое отдѣленіе изъ носа съ сильнымъ слезотеченіемъ; гнойно-кровянистое выдѣленіе изъ носа, часто возвращающіеся приступы насморка. Постоянная охриплость, слизистые хрипы, безъ выдѣленія; гортань болѣзненна и очень чувствительна къ прикосновенію; давленіе на нее вызываетъ приступъ кашля; припадки сухого кашля, ухудшеніе отъ сна; позднѣе кашель съ легко отдѣляющеюся мокротою кусочками, непріятно кислаго вкуса; слизисто-пѣнистая мокрота, съ примѣсью крови. Сжиманіе груди, ощущеніе задушенія при кашлѣ и др. разстройства; потребность глубоко вздохнуть и тяжелое дыханіе, цѣлый день длящееся; катарръ тонкихъ трубочекъ бронховъ съ ощущеніями колотья, поворачиванія и пульсаціи въ груди, застои крови въ легкихъ. Кровавая мокрота безъ воспаленія легкихъ.

Органы пищеваренія.

Воспаленіе губъ, десенъ, слизистой оболочки полости рта. Сухость неба и глотки, съ затрудненнымъ глотаніемъ, болью при проглатываніи слюны, ощущеніемъ задушенія, опуханіе и болѣзненная чувствительность шеи. Отсутствіе аппетита, небольшой голодъ, позывъ на вино и пиво. Отрыжка, жженіе, тошнота и рвота. Рвота желчью и кровью. Ночные приступы поноса со рвотой. Боли въ желудкѣ, вздутіе живота, рѣзи, колики, вѣтры, кашицеобразный и жидкій стулъ, послѣ натуживанія выдѣленіе слизи и крови изъ прямой кишки, геморроидальныя разстройства, зудъ и жженіе въ заднемъ проходѣ, выпаденіе кишки, геморроидальное кровотеченіе.

Моче-половые органы.

Давленіе и жженіе въ мочевомъ пузырѣ и каналѣ съ частыми позывами, болѣзненнымъ мочеиспусканіемъ. Моча темножелтая и красная съ сильнымъ запахомъ.

Сильное возбужденіе съ эрекціями, поллюціями, затѣмъ ослабленіе, и даже въ теченіе нѣсколькихъ недѣль полное безсиліе.

Повышенная чувствительность влагалища и матки, бѣли предъ регулами, раннее наступленіе таковыхъ, судороги матки во время регулъ.

Примѣненіе у больныхъ.

При хроническихъ болѣзняхъ лицъ средняго и старческаго возраста, съ венозными застоями, при пораженіяхъ кожи всякаго рода, опуханіи клѣтчатки, при послѣвоспалительныхъ затвердѣніяхъ (инфильтратахъ) кожи и клѣтчатки, при хроническихъ катаррахъ слизистыхъ оболочекъ съ наклонностью къ изъязвленіямъ и незначительнымъ кровотеченіямъ, при ипохондрическихъ и меланхолическихъ состояніяхъ, съ разстроенною интеллектуальною сферою, при эпилептическихъ судорогахъ, при застарѣлыхъ ревматическихъ боляхъ суставовъ и нервовъ, при лихорадочныхъ приступахъ, ослабляющихъ ночныхъ потахъ, при ослабленной и

неправильной дѣятельности сердца, сердцебіеніи съ одышкою, приливахъ и застояхъ крови въ маткѣ и яичникахъ.

Меркуріусъ солюбилисъ.

(Mercurius solubilis Hahnemanni)

Общее. Меркурій (ртуть) производитъ ускореніе превращенія и разложенія крови, такъ какъ онъ разжижаетъ бѣлокъ и волокнину и дѣлаетъ кровь способною проходить черезъ ткани и и въ то же время задерживаетъ развитіе красныхъ кровяныхъ тѣлецъ; по этому вся масса крови дѣлается серознѣе (водянистѣе) и бѣдною красными кровяными тѣльцами. Вслѣдствіе этого страдаетъ питаніе нервной системы и соотвѣтственно измѣняются ея отправленія. Разстройства эти носятъ воспалительный характеръ, и, такимъ образомъ, послѣ дѣйствія Меркурія наблюдаются: переполненіе кровью сосудовъ съ застоемъ крови въ волосяной (капиллярной) системѣ, странствованіе бѣлыхъ тѣлецъ (лейкоцитовъ), діапедезисъ (пропитываніе) красныхъ тѣлецъ (эритроцитовъ), разрывы сосудовъ съ изліяніемъ крови, выпотѣніе бѣлковыхъ веществъ, раздраженіе волокнины, жировое и гнойное перерожденіе волокнистыхъ инфильтратовъ. Поражается также кожа, слизистыя оболочки, железы, серозная, фиброзная и костная ткани; высшая степень пораженія выражается омертвѣніемъ и распадомъ. Послѣ долгаго дѣйствія ртути ни одинъ органъ, ни одна ткань не остаются пощаженными.

Вызываемыя Меркуріемъ разстройства не столь рѣзки и тягостны при сухой и теплой погодѣ, въ теченіе дня и при покойномъ положеніи; они усиливаются ночью, подъ теплымъ покрываломъ, при всякомъ мышечномъ движеніи и напряженіи, отъ дѣйствія холоднаго и влажнаго воздуха. Симптомы наблюдаются чаще на лѣвой, чѣмъ на правой половинѣ туловища.

Общій характеръ дѣйствія меркурія отличается отъ дѣйствія Аконита въ томъ отношеніи, что при послѣднемъ сосудистая система сильнѣе поражается и реакція проявляется энергичнѣе, тогда какъ при первомъ сильнѣе поражается нервная система.

По сравненію съ Бріоніей при приливахъ и воспаленіяхъ Меркурій проявляетъ болѣе скорое и интенсивное дѣйствіе во всѣхъ родахъ выпотныхъ процессовъ.

Отъ мышьяка отличается силою возбужденія сосудовъ и раздраженія нервовъ вначалѣ и тотчасъ же вслѣдъ за симъ наступающимъ разслабленіемъ и упадкомъ энергіи. Насморкъ дѣлается вскорѣ текучимъ съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи, катарръ бронховъ сопровождается значительнымъ слизисто-пѣнистымъ отдѣленіемъ, кишечный катарръ выражается обильными жидкими испражненіями, содержащими много кишечной слизи, желчи и отдѣленія кишечныхъ железъ, жгучій жаръ заканчивается общимъ и обильнымъ потомъ, а необыкновенное возбужденіе и напряженіе нервной системы оканчивается исчезновеніемъ всѣхъ силъ и полнымъ упадкомъ энергіи и отвращеніемъ къ жизни.

Отъ Сульфура отличается Меркурій тѣмъ, что первый вліяетъ больше на состояніе красныхъ кровяныхъ шариковъ, съ соединенными съ нимъ явленіями воспаленія и перераздраженія. Оба средства сходны между собой по своему вліянію на вегетативную сферу, такъ какъ они производятъ значительное вліяніе на пластическіе процессы тѣмъ, что первое дѣйствуетъ на лимфатическія клѣтки и бѣлковыя вещества кровяной массы, а второе,—кромѣ того, на отправленія и составъ красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. Чѣмъ соотвѣтственно больше дозы средства, тѣмъ скорѣе проявляются измѣненія въ свойствахъ крови, и, напротивъ, чѣмъ разведенія его становятся выше (малыя дозы), тѣмъ больше выступаетъ пораженіе нервной системы, что выражается измѣненнымъ отношеніемъ ея къ внѣшнимъ импульсамъ или раздраженіямъ; измѣненія въ составѣ крови и соковъ тѣла составляютъ промежуточную ступень въ рядѣ болѣзненныхъ разстройствъ, производимыхъ Меркуріемъ.

Сонъ: сильная сонливость днемъ, легкій сонъ ночью, прерываемый кошмарами, позднѣе безсонница и общее сильное возбужденіе.

Состояніе духа: возбужденное, съ наклонностью къ спору и гнѣвнымъ выходкамъ, состояніе экзальтаціи;—затѣмъ величайшее безучастіе, равнодушіе, отвращеніе къ жизни съ попыт-

ками къ самоубійству; недовольство собою, значительная разбитость.

Кожа, железы и кости. Приливы крови, переполненіе кровью сосудовъ и воспаленіе самыхъ различныхъ слоевъ кожи. Разнообразные роды пораженій кожи; эритема, рожа, экзема, съ образованіемъ гнойничковъ и чирьевъ, обширныхъ нарывовъ до степени флегмоны, болѣе или менѣе обширной. Разстройства питанія кожи влекутъ за собою выпаденіе волосъ и отпаденіе ногтей.

Въ лимфатическихъ железахъ—воспалительное опуханіе, усиленное новообразованіе элементовъ—гиперплязія. Опухаютъ слюнныя железы, лимфатическія на шеѣ, въ подмышкахъ, пахахъ, мезентеріальныхъ, опуханіе поджелудочной железы и печени; яички, яичники и грудныя железы.

Костная ткань поражается въ не менѣе сильной степени, ея питаніе разстраивается, и она поражается воспалительнымъ процессомъ различной степени и силы: разрушительные процессы, какъ-то: caries (изъязвленіе), некрозъ (омертвѣніе), остеопорозъ (разрѣженіе ткани), остеомаляціи (размягченіе ткани) и остеосклерозъ (отвердѣніе кости). Больше всего затрогиваются трубчатыя кости и кости лица, а именно—верхней и нижней челюсти и носовыя. Наблюдается воспаленіе надкостной плевы, выражающееся сильнѣйшими ночными болями. Наблюдаются также пораженія связочнаго аппарата суставовъ безъ болей—простое разслабленіе тканей, или съ сильными болями—воспалительное пораженіе суставовъ.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы. Состояніе возбужденія съ галлюцинаціями, подергиваніями мышцъ, бредомъ и маніакальными приступами—упадокъ всякой энергіи, истощеніе силъ, исхуданіе, раздражительная слабость нервовъ, общее разслабленіе, параличи и парезы. Эпилептическіе приступы съ разстройствомъ сознанія. Разстройство интеллектуальныхъ способностей: тупость чувствъ, забывчивость, ослабленіе мышленія, тяжелое теченіе мыслей, афазія (Aphasia mentalis), заикающаяся рѣчь (Psellismus mercurialis).

Тяжесть головы, головокруженіе, сильныя головныя боли. Приливы крови къ головѣ влекутъ за собою воспаленіе мозга

и мозговыхъ оболочекъ съ серознымъ выпотомъ, застои крови вызываютъ разрывы сосудовъ и кровоизліянія—апоплексію.

Органъ зрѣнія. Спазмъ вѣкъ, воспалительное покраснѣніе и опуханіе вѣкъ съ воспаленіемъ Мейбоміевыхъ железъ; давленіе, жженіе, жаръ въ глазахъ съ обильнымъ слезотеченіемъ, свѣтобоязнью. Слизе-и гноетеченіе, переходъ воспаленія на роговицу и радужную оболочку, расширеніе зрачка, ослабленіе зрѣнія, параличъ зрительныхъ нервовъ и сѣтчатки, съ утратою зрѣнія—амаврозъ.

Органъ слуха: шумы, боли, воспаленіе слухового прохода, истеченіе слизи, гноя и крови, тугость слуха (Dysekoia).

Органъ обонянія: Боли, опуханія носовыхъ костей, воспалительное покраснѣніе и опуханіе слизистой оболочки, подслизистой, а равно снаружи кожи и подкожной клѣтчатки. Изъязвленія внутри носа, дурное отдѣленіе—озена (Ozaena), легкая кровоточивость.

Спинной мозгъ. Приливы крови, разстройство отправленій: болѣзненность, чувство усталости, конвульсивныя подергиванія, суставныя боли, параличи и парастезіи различной степени.

Органы кровообращенія.

Упадокъ дѣятельности сердца, съ застоями крови въ сосудахъ, жировое перерожденіе мышцъ. Воспалительное состояніе сосудистыхъ оболочекъ съ наклонностью къ разрывамъ, атероматозное перерожденіе.

Повышеніе температуры постояннаго и неправильнаго типа, съ ночнымъ ухудшеніемъ; обильное потоотдѣленіе, затяжное теченіе.

Органы дыханія.

Катарръ носа, гортани, бронховъ. Жесткіе приступы грудного, сухого кашля, откашливаніе жидко-слизистой, пѣнистой и кровянистой мокроты. Приливы крови къ легкимъ, одышка, боли въ груди при дыханіи и кашлѣ. Переполненіе кровью легкихъ и плевры.

Органы пищеваренія.

Губы сухи, въ углахъ рта трещины, пятна, пузырьки, образованіе язвочекъ на слизистой оболочкѣ рта и щекъ. Десны опухши, разрыхлены, легко кровоточатъ, болѣзненны, наклонны къ изъязвленію и образованію нарывовъ. Каріесъ (разрушеніе) зубовъ, они шатаются и выпадаютъ; зубная боль. Слизе-отдѣленіе, слюнотеченіе. Языкъ опухши, по краямъ отпечатки отъ зубовъ. Покраснѣніе и воспалительный процессъ слизистой оболочки зѣва, миндалинъ, затрудненное глотаніе, сильныя боли, образованіе эксудата—ангина воспалительная и крупозная. Дурной металлическій вкусъ; отсутствіе аппетита, сильная жажда. Отвращеніе къ теплой пищѣ. Отрыжка, изжога, тошнота. Рвота слизью и желчью. Явленія остраго катарра желудка, переходящаго въ острое воспаленіе (гастритъ). Боли въ кишкахъ, урчаніе, колики, позывы на стулъ, жидкій стулъ. Выдѣленія имѣютъ цвѣтъ зеленоватый, желтый, даже сѣрый, въ зависимости отъ измѣненій или отсутствія красящаго вещества желчи, такъ какъ къ пораженію тонкихъ кишекъ присоединяется и катарръ желчнаго протока. Въ толстыхъ кишкахъ: фолликулярный катарръ, кислыя и слизистыя испражненія, съ образованіемъ язвъ и кровоизліяній на слизистой оболочкѣ. Катарръ прямой кишки, опуханіе геморроидальныхъ венъ съ разрывомъ и выхожденіемъ крови, сильная боль въ прямой кишкѣ (прокталгія) и заднемъ проходѣ. Опуханіе печени, разстройство и задержка отдѣленія желчи, желтуха.

Моче-половые органы.

Воспалительное опуханіе почекъ, катарръ почекъ и пузыря, позывы съ незначительнымъ выдѣленіемъ. Очень обильное мочеотдѣленіе, въ мочѣ бѣлокъ, цилиндры—нефритъ и, какъ послѣдствіе его, водянка.

Слизистое гнойное отдѣленіе изъ мочеиспускательнаго канала—меркуріальная бленнорея. Болѣзненныя эрекціи и поллюціи. Воспаленіе и катарръ матки и влагалища, бѣли гнойнаго характера. Очень обильныя мѣсячныя, маточныя кровотеченія.

Примѣненіе у больныхъ.

При острыхъ, подострыхъ и хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ различнаго рода. Особенно при золотушныхъ пораженіяхъ кожи, лимфатическихъ и слюнныхъ железъ, при воспаленіяхъ глазъ и ушей, хроническомъ насморкѣ, катаррахъ желудка и кишекъ съ слизисто-желчными поносами, желтухою, болѣзненнымъ опуханіемъ печени, геморроидальными разстройствами; при воспаленіи и образованіи язвъ слизистой оболочки полости рта, разрыхленіи и кровоточивости десенъ, зубной боли, порчѣ зубовъ, воспаленіи языка, зѣва, миндалинъ, воспаленіи глотки, гортани съ крупознымъ эксудатомъ, при бронхитахъ съ обильною мокротою, при гриппѣ (инфлуэнцѣ), при пораженіяхъ почекъ, пузыря, мочевого канала, при гноетеченіи (бленнореѣ) изъ канала у мужчинъ и влагалища у женщинъ, при воспаленіи яичекъ, яичниковъ, матки, кровотеченіяхъ изъ мочевого канала и матки; при остромъ суставномъ ревматизмѣ, приступахъ подагры, съ обильными, истощающими потами, сильною жаждою, ночнымъ ухудшеніемъ, при невралгіяхъ различнаго рода; при тифозныхъ лихорадкахъ, воспалительныхъ пораженіяхъ оболочекъ головнаго и спинного мозга.

ДОБАВЛЕНІЕ.

Меркуріусъ коррозивусъ.

(Mercurius sublimatus corrosivus).

Примѣненіе его показано въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется болѣе быстрое и энергичное дѣйствіе Меркурія. А потому примѣняется въ бурныхъ, жестокихъ и угрожающихъ жизни разстройствахъ остраго воспалительнаго характера, а именно: при сильныхъ воспаленіяхъ слизистой оболочки, зѣва, глотки, гортани съ значительнымъ эксудатомъ, т.-е., при дифтеритѣ зѣва, крупѣ гортани, воспаленіи бронховъ и легкихъ съ обильнымъ эксудатомъ, при воспаленіяхъ желудка, печени и кишекъ, при дизен-

теріи, при воспаленіи мочевого канала и пузыря съ разстройствами мочеотдѣленія, при разъѣдающихъ шанкрахъ, при быстро протекающемъ воспаленіи мозговыхъ оболочекъ, при опасномъ воспаленіи оболочекъ глаза: соединительной (конъюнктивитъ) и роговой (кератитъ), при воспаленіи внутренняго уха (otitis interna). Благодѣтельное вліяніе здѣсь Меркурія коррозивуса подкрѣпляется назначеніемъ Белладонны.

При бленнорейномъ воспаленіи глазъ и разъѣдающемъ шанкрѣ это средство примѣняется и наружно въ видѣ примочки изъ 0,05 Меркурк. коррозив. на 150,0—200,0 дистил. воды.

Въ такихъ же опасныхъ заболѣваніяхъ примѣняется и Меркуріусъ ціанатусъ, но въ особенности при дифтеритѣ зѣва.

Нуксъ вомика.

(Nux vomica).

Общее. Функціональныя разстройства въ области чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ различнаго рода съ наклонностью къ рефлективнымъ процессамъ. Переутомленіе, слабость и ощущеніе разбитости, боли членовъ и суставовъ съ повышенною чувствительностью къ легкому прикосновенію. Сильное желаніе сидѣть, лежать, вообще находиться въ покойномъ положеніи, боязнь всякаго напряженія и движенія. Продолжительныя судороги въ различныхъ мышечныхъ волокнахъ съ обманами чувствъ. Тетаническія и клоническія судороги различныхъ членовъ и мышечныхъ группъ. Слабость, шатающаяся походка съ боязнью упасть, вялость мышцъ; припадки дурноты, подергиванія членовъ, онѣмѣлость членовъ.

Сильная зябкость и боязнь холоднаго воздуха. Большая сонливость рано утромъ тотчасъ послѣ вставанія, также послѣ ѣды и въ вечерніе часы.

Вызванныя разстройства поражаютъ по преимуществу правую половину тѣла, проявляются по преимуществу въ ранніе утренніе часы или послѣ ѣды, а нѣкоторыя (какъ, наприм., астма) ночью; часто наблюдается періодическое возвращеніе припадковъ черезъ 36—48 часовъ.

Многія болѣзненныя явленія ухудшаются движеніемъ, на свѣжемъ воздухѣ и отъ холода, равно душевными напряженіями и употребленіемъ кофе и спиртныхъ напитковъ. Тѣ, которыя происходятъ въ комнатномъ воздухѣ и во время покоя, улучшаются на свѣжемъ воздухѣ при умѣренномъ движеніи. Въ сырую погоду страданія переносятся легче, чѣмъ въ сухую.

Сонъ. Днемъ сонливость, ночью безсонница, позднее засыпаніе, сонъ прерывается кошмарами, бредомъ.

Состояніе духа. Чрезмѣрная чувствительность ко всякому раздраженію, повышенная раздражительность, наклонность къ покою, замкнутость, меланхолическое и гипохондрическое настроеніе.

Кожа. Чрезмѣрная чувствительность къ прикосновенію и холоду, особенно кожи головы. Желтушное окрашиваніе кожи. Опуханіе кожи и клѣтчатки (oedema) на рукахъ и ногахъ. Зудъ и высыпи.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы. Возбужденіе, смѣняющееся состояніемъ угнетенія. Повышенная воспріимчивость (гиперестезія) чувствительныхъ нервовъ ко всякому раздраженію и впечатлѣнію. Въ сферѣ двигательной пароксизмы судорогъ по преимуществу въ тонической формѣ. Приливы къ головѣ, боли половины головы. Подергиванія лицевыхъ мышцъ.

Органъ зрѣнія. Судорожное сжиманіе вѣкъ (блефароспазмъ), катарръ соединительной оболочки вѣкъ и глазъ съ слизисто-гнойнымъ отдѣленіемъ. Суженіе зрачка, свѣтобоязнь.

Органъ слуха. Зудъ, царапанье, боли въ ушахъ, повышенная раздражительность слуха, обостреніе слуха, обманы его.

Органъ обонянія. Обостреніе и обманы обонянія.

Спинной мозгъ. Пораженія чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ. Боли самаго разнообразнаго характера въ мышцахъ, суставахъ, невралгіи.

Органы кровообращенія.

Періодическое наступленіе приливовъ и застоевъ крови въ сердцѣ, легкихъ и большихъ сосудахъ, сердцебіеніе, поперемѣнно

являющаяся то гиперемія, то анемія отдѣльныхъ сосудистыхъ областей. Лихорадка: продолжительное ощущеніе озноба, летучій жаръ, обильный и повсемѣстный потъ ночью и рано утромъ, иногда съ сильною жаждою. Ускоренный, твердый пульсъ; малый, неправильный, нитеобразный пульсъ.

Органы дыханія.

Катарръ слизистой оболочки носа (текучій насморкъ), гортани и бронховъ; сухой, громкій, хриплый кашель приступами рано утромъ, ночью или послѣ ѣды, вызываетъ тошноту и рвоту. Приливы крови къ легкимъ, затрудненное дыханіе, одышка, астматическіе припадки, судороги въ груди.

Органы пищеваренія.

Образованіе пузырьковъ и язвочекъ на слизистой оболочкѣ языка и рта, опухшія, воспаленныя десны. Слюнотеченіе, катарръ и переполненіе кровью зѣва и глотки, затрудненное глотаніе. Аномаліи вкуса, отвращеніе къ пищѣ или къ любимымъ напиткамъ (кофе), къ табаку, изжога, отрыжка горькая или кислая; отсутствіе аппетита или повышенный аппетитъ, но съ быстрымъ насыщеніемъ. Тошнота, рвота пищею, рано утромъ слизью и желчью; кровавая рвота; сильныя желудочныя боли и судороги. Переполненіе кровью кишечника, катарръ кишекъ, судорога кишечной мускулатуры, усиленная перистальтика съ позывами на стулъ, отхожденіе слизи, жидкій небольшой стулъ со слизисто-желчнымъ выдѣленіемъ. Иногда запоры съ приливами къ головѣ твердыя каловыя массы, покрытыя слизью, даже кровью. Воспаленіе слизистой и мышечной оболочекъ прямой кишки, боли, болѣзненныя натуживанія, спазмъ запирающей мышцы, опуханіе геморроидальныхъ шишекъ, геморроидальное кровотеченіе.

Печень опухши, желчеотдѣленіе разстроено, катарръ желчнаго протока (съ катарромъ двѣнадцатиперстной кишки), желтуха. Опуханіе селезенки.

Моче-половые органы.

Катарръ почекъ и усиленное выдѣленіе мочи. Катарръ пузыря, затрудненное и задержанное отдѣленіе мочи, позывы, жженіе въ

каналѣ при мочеиспусканіи. Частые позывы съ незначительнымъ выдѣленіемъ мочи.

Половое возбужденіе, эрекціи, поллюціи.

Давленіе матки книзу, воспалительное опуханіе и болѣзненность слизистой оболочки влагалища, слизисто-гнойное истеченіе. Состояніе возбужденія. Раннее появленіе мѣсячныхъ съ болями въ маткѣ. Запаздываніе мѣсячныхъ.

Примѣненіе у больныхъ.

Въ острыхъ и хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, въ которыхъ преобладаетъ повышенная нервная раздражительность и чрезмѣрная чувствительность, ипохондрическое настроеніе, разстройства чувствительной и двигательной сферы—гиперестезіи, парестезіи, невралгіи, параличи, при конвульсіяхъ, въ особенности тоническихъ, ревматическихъ страданіяхъ, головной (мигрень) и зубной боли, головокруженіи (особенно вслѣдствіе злоупотребленія спиртными напитками и кофе), безсонницѣ, разбитости и дрожаніи членовъ, свѣтобоязни съ ослабленіемъ зрѣнія, боляхъ и шумахъ въ ушахъ, ослабленіи слуха, затрудненіяхъ рѣчи и глотанія, постоянной лихорадкѣ (гастрической и ревматической), при изнурительной формѣ перемежающейся лихорадки, съ разстройствами нервовъ, желудка и кишечника, желтухою и исхуданіемъ. При воспалительныхъ пораженіяхъ слизистой оболочки языка и рта, катаррѣ зѣва, изжогѣ, отрыжкахъ, при тошнотѣ, рвотѣ слизью (утромъ у пьяницъ), ослабленіи пищеваренія, рвотѣ кровью, судорогахъ и боляхъ желудка, при колякахъ, поносахъ, запорахъ, воспаленіи слѣпой кишки, прямой, геморроидальныхъ страданіяхъ, выпаденіи прямой кишки, опуханіи печени и селезенки. При насморкѣ, кровотеченіи изъ носу, охриплости, катаррѣ бронховъ съ мучительными приступами кашля, одышкѣ, припадкахъ астмы, сердцебіеніи, чувствѣ страха. При судорогѣ и катаррѣ мочевого пузыря, разстройствахъ мочеотдѣленія, импотенціи, повышенной половой раздражительности, поллюціяхъ, застояхъ крови въ маткѣ, коликахъ, воспалительномъ пораженіи слизистой оболочки влагалища и матки съ желтоватымъ истеченіемъ, раннемъ наступленіи періода при слишкомъ частыхъ мѣсячныхъ съ болями, опущеніяхъ влагалища и матки.

Пульсатилла.

(Pulsatilla nigricans).

Общее. Боли разнаго рода, усталость и слабость во всѣхъ членахъ, вялость съ постоянною наклонностью сидѣть или лежать; утомленіе, длящееся цѣлый день, отъ небольшой прогулки, большая слабость и усталость уже рано утромъ; дрожь съ холоднымъ потомъ, тугость и слабость въ суставахъ съ наклонностью потягиваться, безпокойство, общее недомоганіе. Боли часто появляются только въ одной половинѣ тѣла и сопровождаются опуханіемъ кожи и клѣтчатки. Ухудшеніе многихъ разстройствъ въ поздніе, послѣ полудня и вечерніе часы (до полуночи); періодичность ихъ появленія.

Сонъ: Сонливость днемъ, безпокойный сонъ ночью, съ ощущеніемъ жара, волненіемъ крови, подергиваніями членовъ; положеніе на спинѣ вызываетъ сонъ, положеніе на боку вызываетъ болѣзненныя явленія.

Состояніе духа: Тоскливое, безпокойное, удрученное, наклонность къ слезамъ.

Кожа: Зудъ при согрѣваніи вслѣдствіе движеній, и въ постели вечеромъ, безъ высыпи, зудъ и потъ кожи головы.

Опуханіе подчелюстныхъ железъ, миндалинъ и женскихъ грудныхъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы: Головокруженіе большею частью при сидѣніи, рано утромъ при вставаніи, на свѣжемъ воздухѣ, шаткая, колеблющаяся походка, головныя боли, мигрень съ ухудшеніемъ на свѣжемъ воздухѣ.

Глаза. Катарръ соединительной оболочки глазъ, ячмени, слизе-и слезотеченіе, боли въ глазномъ яблокѣ.

Слухъ. Приливы крови, катарръ евстахіевой трубы, воспаленіе слухового прохода съ гноетеченіемъ. Шумы, ослабленіе слуха.

Обоняніе. Пораженіе слизистой оболочки, гноетеченіе изъ носа, обманы обонянія и непріятныя ощущенія обонянія на свѣжемъ воздухѣ.

Спинной мозгъ. Боли въ мышцахъ, суставахъ, невралгіи разнаго рода на различныхъ мѣстахъ тѣла.

Органы кровообращенія.

Давленіе и колотья въ области сердца; при лежаніи на лѣвомъ боку быстрое сердцебіеніе съ одышкою и ощущеніемъ тоски, ознобъ съ холодными конечностями. Лихорадка, ускоренный пульсъ, послѣ полудня—ознобъ, вечеромъ—жгучій жаръ съ жаждою (къ этому—водянистый поносъ); приступы лихорадки состоятъ: изъ озноба, жара и пота; больной не переноситъ внѣшняго тепла.

Органы дыханія.

Насморкъ, отдѣленіе густое, вязкое, зеленовато-желтое. Катарръ гортани и бронховъ, охриплость, судорога голосовой щели, кашель; ночные приступы сухого кашля, облегчающіеся вставаніемъ, при укладываніи въ постель возобновляющіеся. Приступы удушья, застой крови въ легкихъ и сердцѣ, мокрота иногда содержитъ темную кровь.

Органы пищеваренія.

Зубная боль, ухудшающаяся отъ теплыхъ напитковъ и пищи, отъ вліянія холоднаго воздуха. Сухость и боли въ глоткѣ—катарральная ангина, затрудненное глотаніе. Дурной вкусъ, тошнота, отвращеніе къ молоку и къ табаку, отсутствіе аппетита. Катарръ желудка: отрыжка кислая и горькая, тошнота съ позывами на рвоту, давленіе и тяжесть въ желудкѣ, несваренiе, рвота долго лежавшею и несваренною пищею, жестокая рвота кислыми, слизистыми и желчными массами, боли въ желудкѣ. Вздутіе живота, колотье, урчаніе. Катарръ кишечника съ пораженіемъ мышечной оболочки. Частые позывы на стулъ, частыя жидкія, слизистыя испражненія, съ рѣзью въ животѣ, водянисто-зеленоватыя, пѣнисто-желтоватыя испражненія. Боли, кровотеченія изъ геморроидальныхъ шишекъ.

Моче-половые органы.

Боли въ области пузыря, позывы съ жгучей болью при мочеиспусканіи, непроизвольное мочеиспусканіе ночью, каплями не-

произвольное отхожденіе мочи днемъ при сидѣніи и хожденіи. Частое и обильное выдѣленіе водянистой мочи. Опуханіе и болѣзненность слизистой оболочки мочевого канала. Слизетеченіе изъ канала. Боли въ сѣмянныхъ канатикахъ и мошонкѣ, воспалительное опуханіе (справа)—эпидидимитъ, болѣзненныя эрекціи, поллюціи.

Боли въ яичникахъ и маткѣ, болѣзненныя мѣсячныя съ приступами дурноты, тошноты и позывами на стулъ, раннія и обильныя мѣсячныя, рѣзкія, жидкія бѣли съ болями. Запаздываніе и отсутствіе регулъ

Примѣненіе у больныхъ.

Пульсатилла по Ганеману — полихрестъ, т.-е., средство, имѣющее самое разнообразное и полезное примѣненіе какъ въ острыхъ, такъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, у лицъ нѣжнаго сложенія, съ пораженіями лимфатическихъ железъ, кожи и слизистыхъ оболочекъ, а именно: при сыпяхъ (кори), опуханіи клѣтчатки, воспаленіяхъ венъ, нервной раздражительности и наклонности къ слезамъ, приступахъ головокруженія и дурноты, при періодически являющихся припадкахъ нервныхъ болей съ вечернимъ ухудшеніемъ, при мигреняхъ, при зубной и ушной боляхъ, катаррѣ глазъ и ушей, съ ослабленіемъ зрѣнія и слуха; хроническомъ насморкѣ, съ густымъ, гнойнымъ выдѣленіемъ, мучительныхъ приступахъ кашля со слизистою, а также и кровянистою мокротою, сухомъ кашлѣ съ сердцебіеніемъ и одышкою, при несваренiи желудка, тошнотѣ и рвотѣ, вздутіи живота съ рѣзью, при поносахъ со слизисто-кровянистымъ выдѣленіемъ, при геморроидальныхъ страданіяхъ, съ отдѣленіемъ слизи и крови; при судорогѣ и катаррѣ пузыря, непроизвольномъ мочеиспусканіи; при трипперѣ, боляхъ и воспаленіи придатковъ, непроизвольныхъ мѣсячныхъ, съ болями и нервными явленіями; при бѣляхъ; при бѣлокровіи (лейкэміи), лихорадочныхъ заболѣваніяхъ.

Русъ.

(Rhus toxicodendron).

Общее. Тянущія боли, ухудшающіяся отъ покоя и неподвижности членовъ; желаніе двигаться, отъ движенія улучшаются бо-

лѣзненныя явленія, особливо происходящія отъ холода и сырости; безсиліе, ощущеніе онѣмѣнія и паралича, боли въ суставахъ, опуханіе рукъ и ногъ, подергиванія мышцъ, ощущеніе усталости, разбитости. Большая чувствительность къ свѣжему и холодному воздуху.

Сонъ: днемъ дремота, сонливость, желаніе лежать, ночью безсонница, волненіе крови, біеніе артерій.

Состояніе духа равнодушное, подавленное, печальное, плаксивое, непреодолимая потребность движенія.

Кожа: сильный зудъ повсюду, скарлатинообразная экзантема по всему тѣлу, разнохарактерныя сыпи.

Опуханіе миндалинъ и подчелюстныхъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы. Слабость памяти и сообразительности, отвращеніе къ умственному труду, головокруженіе, жестокія головныя боли.

Органъ зрѣнія. Катарръ соединительной оболочки глазъ съ слизе-и слезотеченіемъ.

Спинной мозгъ. Боли мышечныя, суставныя, невралгіи, онѣмѣнія и параличи конечностей.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе при спокойномъ сидѣніи, лихорадочное состояніе, появляющееся періодически и состоящее изъ зноба, жара, пота.

Органы дыханія.

Насморкъ, катарръ гортани и бронховъ, приливы крови къ легкимъ, короткій, болѣзненный кашель, ночью, одышка. Колотья въ боку, межреберныя невралгіи.

Органы пищеваренія.

Зубная боль при жеваніи, рвущая—ночью, сухость во рту, сильная жажда, болѣзненное глотаніе. Отсутствіе аппетита. Отрыжка, тошнота, позывы на рвоту, боли въ желудкѣ. Вздутіе

живота, колики, позывы съ тошнотою и болью въ кишкахъ. Желтоватыя, мягкія, слизистыя, съ примѣсью крови испражненія. Запоры. Боли въ заднемъ проходѣ, набуханіе геморроидальныхъ шишекъ.

Моче-половые органы.

Позывы на мочу съ болью въ мочевомъ каналѣ и пузырѣ, частое ночью мочеиспусканіе.

Частыя эрекціи и поллюціи.

Болѣзненное кровотеченіе изъ матки, возобновленіе прекратившихся мѣсячныхъ.

Примѣненіе у больныхъ.

Въ острыхъ и хроническихъ болѣзняхъ, происшедшихъ отъ сырости и холода, простудныхъ, ревматическихъ, подагрическихъ пораженіяхъ мышцъ, суставовъ, нервовъ, при механическихъ поврежденіяхъ тканей, параличахъ членовъ, ревматическихъ и сыпныхъ болѣзняхъ глазъ и ушей, приступахъ слабости и головокруженіи, при накожныхъ болѣзняхъ, какъ-то: скарлатинѣ, оспѣ и друг., экземѣ, при сыпномъ тифѣ, при тифозныхъ лихорадкахъ, злокачественной, перемежающейся лихорадкѣ, при катаррахъ желудка и кишекъ, поносахъ вслѣдствіе простуды, при ревматическихъ опуханіяхъ железъ, хроническомъ насморкѣ, при кровотеченіи изъ носа, катаррѣ бронховъ съ кашлемъ и одышкою, при сердцебіеніи, приступахъ астмы, воспаленіи легкихъ, легочномъ кровотеченіи, при воспалительныхъ пораженіяхъ половыхъ органовъ, подавленныхъ мѣсячныхъ, при маточномъ кровотеченіи.

Силицеа.

(Silicea).

Общее. Боли во всѣхъ мышцахъ, суставахъ, общая болѣзненность всего тѣла рано утромъ, по пробужденіи, болѣзненность мышцъ при движеніи, при вставаніи изъ сидячаго положенія, боли въ груди и онѣмѣніе конечностей, познабливаніе при раскрываніи тѣла ночью съ жаждою и летучимъ жаромъ, обмираніе рукъ

и ногъ, ощущеніе подергиванія во всѣмъ тѣлѣ, боли въ костяхъ, легкая надсада съ тошнотою, общее чувство безпокойства, слабость членовъ, отяжелѣніе всего тѣла и приступы дурноты, большая усталость уже рано утромъ, вялость и сонливость днемъ, упадокъ силъ, невозможность держаться прямо, дрожаніе, въ особенности рукъ, исхуданіе, истерическіе и эпилептическіе приступы судорогъ, особенно во время новолунія; ухудшеніе болей отъ движенія, ночные поты, длящіеся довольно долго.

Сонъ: долгій послѣобѣденный съ послѣдующею утомленностью, сонливость вечеромъ, безсонница ночью; безпокойный сонъ, приливы крови къ головѣ, сильная тоска ночью; боли и недомоганіе съ тошнотою растраиваютъ сонъ; сомнамбулическое состояніе.

Состояніе духа: раздражительность, наклонность къ гнѣвнымъ выходкамъ; безпокойное, нетерпѣливое, печальное; отвращеніе къ жизни.

Кожа и железы: чрезмѣрная чувствительность кожи къ прикосновенію, зудъ, чувство ползанія насѣкомыхъ, высыпи, поврежденія кожи заживаютъ медленно и долго гноятся, безболѣзненныя язвы начинаютъ болѣть, образованіе узловъ (шишекъ, гангліонъ) на тыльной поверхности кисти руки.

Опуханіе подчелюстныхъ и небныхъ (миндальныхъ) железъ и различныхъ лимфатическихъ железъ на шеѣ, затылкѣ, около ушей, въ подмышкахъ и пахахъ.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы: запутанность, забывчивость, частыя оговорки, трудное теченіе мыслей. Головокруженія, приливы крови къ головѣ съ ощущеніемъ жара, сильныя головныя боли, ухудшающіяся къ вечеру и при движеніи, болѣзненность кожи головы.

Органъ зрѣнія. Воспалительное пораженіе вѣкъ, соединительной оболочки глазъ, съ слезотеченіемъ и свѣтобоязнью. Склеиваніе вѣкъ ночью слизисто-гнойнымъ отдѣленіемъ.

Органъ слуха: воспаленіе наружнаго уха, слухового прохода съ серознымъ истеченіемъ, болѣзненная обостренность слуха, шумы, глухота.

Органъ обонянія: воспалительное пораженіе слизистой оболочки носа, выдѣленіе кровянистой слизи, носовое кровотеченіе. Обостреніе обонянія.

Спинной мозгъ: всевозможныя болѣзненныя ощущенія въ мышцахъ, суставахъ и нервахъ, съ онѣмѣніемъ и слабостью конечностей. Ноги холодныя, какъ ледъ, днемъ, и ощущеніе жгучаго жара ночью.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, застои крови въ сосудахъ грудной полости, приливы къ мозгу. Лихорадка, ознобъ въ теплой комнатѣ, потрясающій ознобъ, затѣмъ общій жаръ съ жаждою; приступы лихорадки съ общимъ жаромъ въ теченіе ночи; приступы перемежающейся лихорадки съ незначительнымъ потомъ, проливной общій потъ ночью долгое время.

Органы дыханія.

Чиханіе съ болью въ груди, насморкъ съ отдѣленіемъ густой слизи; опуханіе слюнныхъ железъ, подчелюстныхъ, миндалинъ. Хриплый голосъ, охриплость, першитъ въ горлѣ, кашлевое раздраженіе, часами приступы кашля, мучительный кашель, особенно ночью, при лежаніи и рано утромъ, при вставаніи, держащійся въ теченіе 11 дней; откашливаніе свѣтлой слизи, кашель до рвоты съ изверженіемъ слизистыхъ массъ, кашель съ кровянистой мочею, откашливаніе кровянистой слизи. Боли въ груди при кашлѣ. Глубокіе вздохи, сильное сжиманіе груди, одышка съ поверхностнымъ дыханіемъ, переполненіе легкихъ кровью.

Органы пищеваренія.

Сухость рта, ощущеніе какъ бы волоса на языкѣ, его онѣмѣніе (парестезія отдѣльныхъ нервныхъ волоконъ и анестезія). Образованіе язвъ на мягкомъ небѣ, воспаленіе его, опуханіе миндалинъ. Дурной вкусъ, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ пищѣ, тошнота, позывы на рвоту и рвота. Отрыжка, изжога, тяжесть въ желудкѣ, облегчающаяся рвотою.

Вздутіе живота, урчаніе, газы, колики, отхожденіе вѣтровъ, продолжительные запоры, незначительныя выдѣленія твердыхъ каловыхъ массъ. Длительные, день и ночь, поносы, выдѣленіе кровянистой слизи. Боли въ прямой кишкѣ, выхожденіе шишекъ.

Моче-половые органы.

Позывы, выдѣленіе каплями мочи, жженіе въ мочевомъ каналѣ. Частое мочеиспусканіе ночью, съ болью въ пузырѣ.

Боли въ сѣмянныхъ канатикахъ и яичкахъ, повышенное половое чувство, эрекціи, частыя ночныя поллюціи. Уничтоженіе полового чувства, разслабленіе половыхъ частей, выдѣленіе сока предстательной железы при испражненіи.

Разстройство мѣсячныхъ, слишкомъ сильное кровотеченіе, съ послѣдующимъ выдѣленіемъ кровянистой слизи, истеченіе бѣлей съ жгучею болью, сильное водянистое истеченіе съ сильнымъ зудомъ.

Примѣненіе у больныхъ.

Силицеа представляется великолѣпнымъ средствомъ при всѣхъ такъ называемыхъ *дискразическихъ* состояніяхъ, проявляющихся, какъ золотуха, подагра, рахитъ, ракъ, и примѣняется въ хроническихъ болѣзненныхъ разстройствахъ, а именно: боляхъ мышечныхъ и суставныхъ, невралгіяхъ съ ночнымъ ухудшеніемъ, трясеніи членовъ съ сильной слабостью, разстройствахъ нервной системы съ ослабленіемъ интеллекта, слабостью памяти, подавленномъ настроеніи, безсонницѣ, при лунатизмѣ, приступахъ дурноты, головныхъ боляхъ съ ночнымъ ухудшеніемъ, воспаленіи оболочекъ мозга, при страданіяхъ костей, при пораженіяхъ суставовъ, образованіи гангліона, при изъязвленіяхъ и нагноеніяхъ кожи и железъ, пораженіяхъ клѣтчатки, зудящихъ, мокнущихъ сыпяхъ, раковыхъ опухоляхъ, слабости нижнихъ конечностей, особенно въ дѣтскомъ возрастѣ; золотушныхъ опуханіяхъ железъ, болѣзняхъ глазъ и ушей (пораженія роговицы, катаракта, глухота), свѣтобоязни, золотушномъ насморкѣ, озенѣ, воспаленіи рта, изъязвленіи десенъ, воспаленіи десенъ, при хроническомъ катаррѣ желудка и слабости пищева-

ренія съ тошнотою и рвотою, при судорогѣ желудка, при вздутіи живота, газахъ, твердомъ желудкѣ, запорахъ, слизистомъ, водянистомъ стулѣ небольшого объема, при геморроидальныхъ шишкахъ, фистулахъ прямой кишки, боляхъ въ ней, разстройствахъ мочеотдѣленія, ночномъ недержаніи мочи, ослабленіи половой сферы, хронической опухоли предстательной железы, разстройствахъ мѣсячныхъ (слишкомъ раннихъ или запаздываніи ихъ), хроническихъ маточныхъ кровотеченіяхъ, бѣляхъ, при хроническихъ катаррахъ бронховъ, съ мучительными приступами кашля, со рвотою и обильной мокротой, приступахъ астмы; при холодныхъ ногахъ, сильномъ потѣніи ногъ и подавленіи его, болѣзненности подошвъ и мозолей, истощающихъ ночныхъ и утреннихъ потахъ, зудѣ и болѣзненности кожи головы, сильномъ выпаденіи волосъ, параличномъ состояніи различныхъ нервныхъ областей.

Спигелія.

(Spigelia).

Общее. Боли разнаго рода въ различныхъ частяхъ тѣла, ощущеніе усталости и разбитости, ломота въ мышцахъ, особенно нижнихъ конечностяхъ, ощущеніе онѣмѣнія нижней половины туловища; душевныя и тѣлесныя изнеможенія; улучшеніе въ покойномъ горизонтальномъ положеніи.

Сонъ: значительная сонливость послѣ обѣда, безсонница до полуночи; безпокойный сонъ, пробужденіе утромъ съ ощущеніемъ разбитости.

Состояніе духа: боязливое и тоскливое, подавленное, смѣна веселости съ послѣдующимъ изнеможеніемъ.

Кожа: зудъ съ образованіемъ пятнышекъ и пузырьковъ, чесаніе не облегчаетъ зуда, опуханіе различныхъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы: приливы крови къ головѣ, сильная головная боль въ вискахъ, тупая боль во лбу и затылкѣ, душевная слабость.

Органъ зрѣнія: тяжесть вѣкъ, боль въ глазномъ яблокѣ сосуды соединительной оболочки налиты кровью, слезотеченіе, спазмъ вѣкъ.

Спинной мозгъ: боли въ мышцахъ и суставахъ.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, видимое снаружи, съ ощущеніемъ тяжести на сердцѣ, лихорадка, смѣна ощущенія жара и озноба, при малѣйшемъ движеніи жаръ и потъ, пульсъ неправильный, слабый, замедленный.

Органы дыханія.

Насморкъ, охриплость, припадки кашля, боли въ груди, тупое колотье при дыханіи.

Органы пищеваренія.

Зубная боль непосредственно послѣ стола или въ теченіе ночи, обложенный языкъ, образованіе пузырьковъ на языкѣ и небѣ, усиленное слюнотеченіе, воспалительное опуханіе миндалинъ, боль при глотаніи, отвращеніе къ табаку и кофе, отрыжка, тошнота, вздутіе живота, рѣзь, колики, отхожденіе газовъ безъ облегченія, позывы на низъ безъ испражненія, запоры, твердый стулъ, отхожденіе твердыхъ и жидкихъ массъ, слизистое послабленіе, ощущеніе зуда и царапанія въ заднемъ проходѣ.

Моче-половые органы.

Частые позывы съ обильнымъ выдѣленіемъ мочи, непроизвольное выдѣленіе каплями мочи при вставаніи изъ сидячаго положенія, колотье и зудъ въ мошонкѣ и членѣ и истеченіе сока предстательной железы, частыя эрекціи безъ возбужденія.

Примѣненіе у больныхъ.

При многихъ страданіяхъ остраго и хроническаго характера, а именно: при головокруженіи, слабости памяти и умственныхъ способностей, при періодическихъ головныхъ боляхъ, особенно происходящихъ отъ движенія, при слабости и дрожаніи членовъ, подергиваніи мышцъ, безсонницѣ, при страданіи глазъ—подагри-

ческомъ и ревматическомъ воспаленіи, параличѣ верхняго вѣка, свѣтобоязни, воспаленіи роговицы, при рѣсничной невралгіи, при шумахъ въ ушахъ и глухотѣ, при лицевыхъ боляхъ, невралгіи различныхъ частей, при подагрѣ, ревматизмѣ, перемежающейся лихорадкѣ, хроническомъ насморкѣ, опуханіи миндалинъ, катаррѣ желудка и кишекъ съ пораженіемъ мышечнаго слоя, при частыхъ позывахъ на мочеиспусканіе, при непроизвольномъ отхожденіи мочи, при тѣлесныхъ движеніяхъ, при воспалительныхъ пораженіяхъ сердечной сумки и сердца.

Спонгія.

(Spongia marina tosta).

Общее. Ощущеніе разбитости въ верхней половинѣ туловища, усталость рукъ и ногъ, ощущеніе тяжести въ членахъ, общее физическое и умственное разслабленіе, онѣмѣніе нижней половины туловища.

Сонъ: сонливость днемъ, безсонница ночью, безпокойный сонъ, при пробужденіи проливной потъ.

Состояніе духа: измѣнчивое, то веселое, то мрачное безъ причины, изнеможеніе, разсѣянность, отвращеніе къ работѣ.

Кожа и железы: Зудъ и образованіе пятенъ и пузырьковъ. Опуханіе железъ. Боли въ зобной железѣ.

Нервная система.

Мозгъ. Приливы крови къ головѣ, головныя боли, головокруженіе, тяжесть вѣкъ, покраснѣніе глазъ. Боли въ ушахъ, глухота.

Спинной мозгъ. Боли въ мышцахъ и суставахъ. Дрожаніе и слабость конечностей. Онѣмѣніе, покалываніе въ пальцахъ.

Органы кровообращенія.

Боли и давленіе въ области сердца, лихорадка съ приступами жара и боли въ области сердца; ускоренный полный и быстрый пульсъ.

Органы дыханія.

Катарръ носа, гортани, бронховъ. Охриплость, жестокіе приступы громкаго лающаго кашля днемъ и ночью, затрудненное дыханіе, удушье, какъ бы гортань была сужена или закрыта, ощущеніе прилива крови къ груди.

Органы пищеваренія.

Отрыжка, тошнота безъ рвоты; боли въ желудкѣ, съ ощущеніемъ холода и полноты. Вздутіе живота газами, колотье, рѣзь. Мягкій стулъ съ вѣтрами, отхожденіе сначала твердыхъ, потомъ жидкихъ массъ, поносъ бѣловато-сѣрыми массами.

Моче-половые органы.

Усиленное отдѣленіе мочи, боли въ сѣмяныхъ канатикахъ и яичкахъ съ опуханіемъ и давящими болями.

Раннее наступленіе и слишкомъ сильное отдѣленіе крови мѣсячныхъ.

Примѣненіе у больныхъ.

При опуханіи железъ, хроническихъ насморкѣ и охриплости, катаррѣ гортани, сухомъ лающемъ кашлѣ, крупѣ гортани, приливахъ крови и сердцебіеніи, при зобѣ, припадкахъ астмы, воспалительномъ опуханіи сѣмянныхъ канатиковъ и придатковъ, болѣзненномъ опуханіи яичекъ.

Стафизагрія.

(Staphisagria).

Общее: Боли въ мышцахъ, суставахъ; усталость, улучшеніе при лежаніи, болѣзненное ощущеніе во всемъ тѣлѣ, болѣзненность костей, общая слабость даже по пробужденіи утромъ, припадки дурноты, судороги.

Сонъ: сонливость днемъ, позднее засыпаніе ночью, безпричинное пробужденіе послѣ полуночи, невозможность опять заснуть; безпокойный сонъ вслѣдствіе болей въ костяхъ.

Состояніе духа—ипохондрическое и печальное.

Кожа и железы: зудъ повсюду, высыпи. Опуханіе подчелюстныхъ железъ и миндалинъ, различныхъ лимфатическихъ железъ на шеѣ и въ пахахъ.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы: головокруженіе, умственная слабость, головныя боли. Западеніе глазъ, окруженныхъ синевой. Мышечныя и суставныя боли разнаго рода на различныхъ частяхъ тѣла.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, лихорадка со знобомъ и жаромъ, летучій жаръ, приливы крови съ усиленною жаждою; ночные поты непріятнаго запаха.

Органы дыханія.

Катарръ носа, гортани, бронховъ, приступы кашля, отхаркиваніе мокроты—вязкой, слизистой, гноевидной, затрудненное дыханіе, колотье въ груди.

Органы пищеваренія.

Пораженіе зубовъ, десенъ, языка и зѣва, слюнотеченіе, опуханіе миндалинъ. Дурной вкусъ, отрыжка, судорога, тошнота.

Боли, рѣзь въ животѣ, слизистый и водянистый стулъ, поносы, вялость кишечной мускулатуры, трудное опоражниваніе кишечника.

Моче-половые органы.

Позывы и обильное отдѣленіе, непроизвольное выдѣленіе при кашлѣ, жженіе въ мочеиспускательномъ каналѣ при мочеиспусканіи и послѣ, первоначальное повышеніе полового чувства, затѣмъ его угасаніе и импотенція.

Возвращеніе мѣсячныхъ, отсутствовавшихъ цѣлый годъ.

Примѣненіе у больныхъ.

При нервныхъ разстройствахъ, при меркуріальныхъ страданіяхъ, сыпяхъ, выпаденіи волосъ, скорбутныхъ пораженіяхъ слизистой оболочки рта и десенъ, пораженіяхъ зубовъ, опуханіяхъ железъ, выпаденіи вѣкъ, истерическихъ и меланхолическихъ припадкахъ вслѣдствіе половыхъ излишествъ, при необыкновенномъ половомъ возбужденіи съ поллюціями, при ревматическихъ нервныхъ боляхъ, подагрѣ, судорогѣ желудка, боляхъ живота, слабости мочевого пузыря, возвратахъ триппера, нервныхъ боляхъ яичекъ съ опуханіемъ, при опуханіи яичниковъ, гиперестезіи слизистой оболочки половыхъ органовъ.

Сульфуръ.

(Sulfur).

Общее. По изслѣдованіямъ Böcker'a сѣра (сульфуръ) увеличиваетъ въ мочѣ мочевину и мочевую кислоту. При малыхъ дозахъ легкія въ началѣ выдѣляютъ болѣе углекислоты, а при болѣе продолжительномъ употребленіи и большихъ дозахъ углекислоты выдѣляется менѣе. Твердыя составныя части крови по потребленіи сѣры въ большинствѣ случаевъ уменьшаются. Содержащія пигментъ кровяныя клѣточки при малыхъ дозахъ въ числѣ уменьшаются, при большихъ умножаются; соотвѣтственно чему измѣняется цвѣтъ крови. Всѣ выдѣленія (секреты) и отдѣленія (экскреты), а именно кожи и слизистыхъ оболочекъ, по Böcker'у значительно усиливаются.

Испытанія на здоровыхъ дали слѣдующіе результаты: Разбитость и разслабленіе членовъ, слабость при стояніи и ходьбѣ и потребность сѣсть, отъ небольшой ходьбы одышка, дрожаніе рукъ и ногъ и всего тѣла, припадки дурноты, головокруженія со рвотою и выдѣленіемъ пота, подергиванія мышцъ, какъ отъ электрическаго тока, эпилептиформныя судороги съ невозможностью говорить, приступы крайней слабости, сильное безпокойство, приливы крови, постоянный знобъ, блѣдное лицо, си-

нева подъ глазами, ощущеніе сильнаго внутренняго холода ночью въ постели, чувствительность къ свѣжему воздуху и холоду, худшеніе во время покоя и улучшеніе во время движенія, внѣшнее тепло облегчаетъ многія боли, холодъ—усиливаетъ; теплое покрываніе въ постели усиливаетъ нервныя боли; разговоръ непріятенъ и утомляетъ, малѣйшее физическое и умственное напряженіе вызываетъ потъ.

Сонъ: Сильная сонливость днемъ, потребность заснуть даже сидя, долгій крѣпкій сонъ, нежеланіе встать утромъ, хочется спать дольше, тяжесть членовъ по утрамъ.

Состояніе духа: Болѣзненное возбужденіе и безпокойство, раздражительность. Ослабленіе психической энергіи, подавленность, безучастность и упадокъ духа, ипохондрія, меланхолія.

Кожа и железы: Сильный зудъ вечеромъ въ постели, всевозможныя сыпи, поврежденія кожи, выпаденіе волосъ, поврежденія ногтей—образованіе нарывовъ (ногтоѣды).

Болѣзненное опуханіе подчелюстныхъ железъ, миндалинъ и различныхъ лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы: Возбужденіе, затѣмъ угнетеніе психической энергіи, ослабленіе мышленія, сообразительности, памяти, разсѣянность, спутанность, бредовыя идеи, парафазія, тупоуміе. Головокруженіе, головныя боли, ощущеніе пульсаціи и жара, приливы крови къ головѣ.

Органъ зрѣнія. Опуханіе и краснота вѣкъ, зудъ и жженіе въ глазахъ, усиленное слизеотдѣленіе, склеивающее вѣки ночью; ячмени; слезотеченіе, свѣтобоязнь, катарръ соединительной оболочки съ образованіемъ на ней пузырьковъ.

Органъ слуха. Зудъ въ ушахъ, повышенная чувствительность къ звукамъ, притупленіе слуха, глухота, шумы въ ушахъ.

Органъ обонянія. Выдѣленіе серозной жидкости, кровотеченіе, обманъ обонянія, притупленіе обонянія.

Спинной мозгъ: Боли въ мышцахъ, суставахъ съ тяжестью и разслабленіемъ членовъ.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, приливы крови къ сердцу и легкимъ съ ощущеніемъ тоски. Лихорадка, ознобъ, жаръ, потъ. Смѣна ощущеній озноба и жара, ночью и утромъ потъ.

Органы дыханія.

Катарръ носа, гортани и бронховъ, приступы кашля, отхаркиваніе слизистой мокроты, удушье, одышка, приступы судорогъ въ груди съ сердцебіеніемъ, приливы крови къ легкимъ.

Органы пищеваренія.

Воспаленіе слизистой оболочки рта и мягкаго неба, съ образованіемъ пузырьковъ, опуханіе миндалинъ, затрудненное глотаніе. Дурной вкусъ, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ пищѣ. Отрыжка, изжога, тошнота, рвота слизью, пищею, свѣтловодянистою и соленою жидкостью, кровью, боли, тяжесть въ желудкѣ.

Вздутіе живота, урчаніе, колики. Катарръ слизистой оболочки кишечника; усиленное отдѣленіе кишечныхъ железъ, желчи. Позывы и трудный стулъ. Запоры. Водянистые поносы съ приступами дурноты. Опуханіе геморроидальныхъ шишекъ, слизетеченіе.

Моче-половые органы.

Боли въ мочеиспускательномъ каналѣ, колотье, жженіе, позывы, послѣ мочеиспусканія нѣсколько капель крови изъ канала съ ощущеніемъ колотья въ шейкѣ пузыря (геморрой пузыря); усиленное мочеотдѣленіе, моча сильно насыщенная съ осадкомъ изъ уратовъ, слизи и крови. Возбужденіе, затѣмъ ослабленіе полового чувства. Боли въ сѣмяныхъ канатикахъ и яичкахъ. Поллюціи. Выдѣленіе сока предстательной железы послѣ стула и мочеиспусканія.

Раннее наступленіе мѣсячныхъ, усиленное отдѣленіе кровей, съ болями, болѣе продолжительныя мѣсячныя. Сильныя бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

Сульфуръ могуче дѣйствуетъ на всю вегетативную сферу организма и поэтому находитъ разнообразное примѣненіе въ случаяхъ, гдѣ функціональныя разстройства отдѣльныхъ органовъ развиваются на почвѣ новообразованія или разрушенія составныхъ частей тканей. Всѣ ткани тѣла безъ исключенія подвергаются его дѣйствію, какъ костная, такъ кожа и слизистыя оболочки. Въ хроническихъ страданіяхъ сѣра даетъ толчокъ къ измѣненію въ тканяхъ, благопріятному для излѣченія болѣзни, но требующаго еще другого специфика; дѣйствіе послѣдняго подкрѣпляется назначеніемъ сѣры. Она обостряетъ чувствительность организма къ лѣкарственному воздѣйствію средства. Сѣра назначается: при разстройствахъ вслѣдствіе злоупотребленій спиртными и возбуждающими (кофе) напитками, отравленія ртутью и свинцомъ, при ревматическихъ воспалительныхъ и параличныхъ разстройствахъ вслѣдствіе простуды, при перемежающейся лихорадкѣ, при боляхъ суставовъ и нервовъ, ухудшающихся отъ покоя, улучшающихся отъ движенія, при подергиваніяхъ мышцъ, судорогахъ различнаго рода, легкости потоотдѣленія, въ случаяхъ подагрической и золотушной дискразіи, разнообразныхъ накожныхъ пораженіяхъ, опуханіи и нагноеніи железъ, при рахитѣ, воспаленіи костей и клѣтчатки, при безсонницѣ, ипохондріи, тупоуміи, головныхъ боляхъ, приступахъ дурноты, головокруженія, зубной боли, воспаленіи вѣкъ, катаррѣ глазъ, помутнѣніи хрусталика, роговицы, шумахъ въ ушахъ, глухотѣ, хроническомъ насморкѣ, охриплости, кашлѣ, судорогахъ въ груди съ одышкою, при сердцебіеніи, воспаленіи слизистой оболочки языка и рта, опуханіи миндалинъ, разстройствахъ пищеваренія, тошнотѣ, отрыжкѣ, изжогѣ, рвотѣ, судорогѣ и язвѣ желудка, коликахъ, катаррѣ кишекъ, запорахъ, пораженіяхъ печени съ разстройствомъ желчеотдѣленія, геморроидальныхъ разстройствахъ, фистулѣ прямой кишки, выпаденіи прямой кишки и влагалища, инфарктѣ матки, неправильныхъ мѣсячныхъ, геморроѣ мочевого пузыря, судорогѣ и слабости пузыря, опасности образованія грыжи.

Тартарусъ эметикусъ (Рвотный камень).

(Tartarus emeticus).

Общее. Растворы рвотнаго камня, вспрыскиваемые прямо въ кровеносную систему, вліяютъ непосредственно на головной и спинной мозгъ, особливо на блуждающій нервъ, который регулируетъ отправленія сердца, легкихъ и желудка. Это непосредственное дѣйствіе на центральную нервную систему обусловливаетъ болѣзненныя измѣненія кровообращенія, дыханія и пищеваренія. Такимъ образомъ, наступаетъ рвота раньше, чѣмъ начнетъ развиваться воспалительное состояніе слизистой оболочки желудка; появляется холодѣніе наружной кожи и членовъ, большая слабость и мышечное дрожаніе раньше, чѣмъ наступитъ изнуреніе силъ, вслѣдствіе образующагося воспаленія желудочно-кишечнаго тракта. Смерть отъ большихъ пріемовъ его (у людей и животныхъ) наступаетъ послѣ судорожныхъ приступовъ, вслѣдствіе паралича мозга и сердца. Вскрытіе обнаруживаетъ переполненіе сосудовъ твердой и мягкой мозговой оболочки съ обильнымъ выпотѣваніемъ сыворотки въ мозговыя полости, переполненіе легочныхъ сосудовъ, какъ большихъ, такъ и малыхъ (капиллярныхъ) съ катарромъ слизистой оболочки дыхательныхъ путей и рѣзкое воспалительное состояніе желудочно-кишечнаго канала съ размягченіемъ слизистой оболочки, отслоеніемъ эпителія и образованіемъ маленькихъ изъязвленій.

Характерна также повышенная дѣятельность всѣхъ выдѣлительныхъ железистыхъ органовъ подъ вліяніемъ малыхъ дозъ. Большая усталость съ зѣвотою и потягиваніемъ, сонливость и дремота днемъ, безсонница ночью.

Настроеніе духа большею частью подавленное, безпокойное и боязливое.

На кожѣ образуются пузырчатыя (пустулёзныя) сыпи не только отъ чисто мѣстнаго дѣйствія этого средства на ткани, но и отъ внутренняго употребленія. Образованіе пустулъ имѣетъ длительный характеръ съ медленнымъ нагноеніемъ и изъязвленіемъ.

Нервная система.

Сначала возбужденіе мозговой дѣятельности, возрастающее до бреда, подергиваній и судорогъ, затѣмъ состояніе оглушенія, какъ спячка, безсознательность и, наконецъ, смерть отъ паралича сердца и легкихъ.

Органы кровообращенія.

Ритмическая дѣятельность сердца замедляется до 50 ударовъ въ минуту и энергія сокращенія сердца слабѣетъ, а также неправильность ритма при учащенномъ сердцебіеніи. Разслабленіе большихъ сосудовъ. Лихорадочное состояніе съ преобладающимъ чувствомъ холода, достигающимъ до потрясающаго озноба. Кожа покрыта холоднымъ потомъ. Обильный ночной потъ.

Дыхательные органы.

Насморкъ съ носовымъ кровотеченіемъ. Катарръ гортани и дыхательныхъ путей. Слизистые хрипы, кашель съ отхаркиваніемъ слизистой мокроты. Одышка, чувство давленія и стѣсненія съ болью и колотьемъ по всей груди.

Пищеварительные органы.

Увеличенное отдѣленіе слюны, язвинки и пустулы на слизистой оболочкѣ полости рта и пищевода. Ненормальность аппетита и волчій голодъ; послѣ ѣды противный вкусъ, тошнота, икота, отрыжка, позывы на рвоту и рвота слизью, желчью, иногда кровью. Желудочная боль и спазмы; пученіе и кишечныя колики съ отхожденіемъ вѣтровъ. Жидкія водянистыя испражненія.

Моче-половые органы.

Катарръ мочевого пузыря съ судорожнымъ сжатіемъ сфинктера пузыря; частые позывы къ мочеиспусканію съ болью и жженіемъ при прохожденіи мочи. Темная, мутная моча съ рѣзкимъ запахомъ, а также очень обильное мочеотдѣленіе водянисто-свѣтлой мочи съ осадкомъ фосфорно-кислой амміакъ-магнезіи.

Примѣненіе у больныхъ.

При лихорадочныхъ заболѣваніяхъ, какъ-то: сильный катарръ гортани и дыхательныхъ путей съ затрудненнымъ дыханіемъ и бронхіальными хрипами; воспаленіе легкихъ и плевры; острый катарръ желудка и кишекъ; при пустулезныхъ сыпныхъ болѣзняхъ. При безлихорадочныхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, какъ-то: желудочныя боли и спазмы, круглая язва желудка, нервная тошнота и рвота, напр., у беременныхъ, при чемъ рекомендуется давать это средство не ниже 3-го сотеннаго дѣленія, потому что отъ 3-го десятичнаго нерѣдко наблюдается ожесточеніе.

Туйя.

(Thuja occidentalis).

Общее. Сильная тѣлесная усталость и разбитость, отвращеніе ко всякому движенію, приступы жара и пота, тяжесть членовъ при ходьбѣ. Разстройство касается одного какого-нибудь органа или члена или ткани и если здѣсь проходитъ, то начинается въ другомъ, Оно начинается внезапно, приступомъ, и столь же внезапно исчезаетъ. Разстройства преимущественно наблюдаются во время покоя и уменьшаются или проходятъ отъ движенія (за исключеніемъ суставныхъ болей); боли затихаютъ отъ надавливанія на больное мѣсто и возобновляются по прекращеніи надавливанія. Они появляются въ вечерніе часы и утромъ, непосредственно по пробужденіи и поражаютъ чаще лѣвую половину тѣла, чѣмъ правую.

Сонъ: сонливость днемъ и въ вечерніе часы, безпокойный, прерывистый сонъ ночью.

Настроеніе духа измѣнчивое, возбужденіе смѣняется угнетеніемъ и дѣлается меланхолическимъ до отвращенія къ жизни.

Кожа и железы. Чрезмѣрная раздражительность кожи, зудъ, жженіе на различныхъ частяхъ тѣла, высыпи, эрозіи, узелки, бородавки на пальцахъ.

Опуханіе слюнныхъ и лимфатическихъ железъ.

Нервная система.

Мозгъ и нервы. Уменьшеніе и ослабленіе психической дѣятельности. Головокруженіе, головныя боли.

Органъ зрѣнія. Катарръ соединительной оболочки съ переполненіемъ сосудовъ кровью, съ усиленнымъ отдѣленіемъ, склеивающимъ вѣки.

Органъ слуха. Шумы, болѣзненность, колотья въ ухѣ.

Спинной мозгъ. Боли въ мышцахъ, костяхъ, суставахъ. Разбитость и слабость членовъ.

Органы кровообращенія.

Боли въ области сердца, сердцебіеніе, вздутіе жилъ на рукахъ, шеѣ и вискахъ. Ознобъ съ тошнотою и рвотою, жаръ въ лицѣ и холодныя руки. Повышенная частота пульса, малый и замедленный пульсъ.

Органы дыханія.

Насморкъ, охриплость, кашель, тяжелое дыханіе, колотья въ бокахъ.

Органы пищеваренія.

Опуханіе слюнныхъ железъ, языка и десенъ, катарръ мягкаго неба—ангина, опуханіе миндалинъ, накопленіе слизи въ зѣвѣ.

Дурной вкусъ, отсутствіе аппетита, жажда, отрыжка, изжога, многократная рвота, судорога и боли въ желудкѣ.

Боли и вздутіе кишекъ, позывы, запоры, отхожденіе твердыхъ массъ, поносъ. Боли въ прямой кишкѣ и заднемъ проходѣ, опуханіе геморроидальныхъ шишекъ, выдѣленіе слизи, сукровицы.

Моче-половые органы.

Позывы съ обильнымъ выдѣленіемъ мочи, колотья въ каналѣ, зудъ и жженіе послѣ мочеиспусканія и безъ такового.

Боли въ сѣмяныхъ канатикахъ и яичкахъ, половое возбужденіе, эрекціи, поллюціи, истеченія изъ мочевого канала.

У женщинъ истеченія изъ мочеиспускательнаго канала и влагалища, бѣли, въ промежуткахъ между мѣсячными.

Примѣненіе у больныхъ.

При острыхъ и хроническихъ болѣзняхъ: ревматизмѣ, подагрѣ, боляхъ въ мышцахъ, суставахъ и нервахъ, параличахъ, ослабленіи психической сферы, меланхоліи, при накожныхъ заболѣваніяхъ съ образованіемъ пятенъ и гнойниковъ, при оспѣ; противъ бородавокъ снаружи (тинктура), при катаррѣ глазъ и ушей, шумахъ, глухотѣ, насморкѣ съ образованіемъ язвъ въ носу и кровотеченіемъ, опуханіи языка и десенъ, при хроническомъ воспаленіи миндалинъ, катаррѣ зѣва, гортани, бронховъ, коклюшѣ, приливахъ крови, сердцебіеніи, и слабости пищеваренія, судорогахъ желудка и кишекъ, коликахъ, геморроидальныхъ страданіяхъ, пораженіяхъ почекъ, катаррѣ пузыря, трипперѣ, язвахъ половыхъ органовъ, пораженіяхъ яичекъ и яичниковъ, боляхъ въ маткѣ, бѣляхъ, половомъ возбужденіи; при приливахъ къ головѣ, лѣвосторонней боли головы и лица, приступахъ головокруженія и дурноты. Истощеніе и исхуданіе вслѣдствіе трипперной заразы.

Феррумъ.

(Ferrum).

О б щ е е. Повышеніе температуры тѣла, увеличенное выдѣленіе мочевины съ одновременнымъ увеличеніемъ вѣса тѣла. Покраснѣніе губъ, щекъ, десенъ; увеличеніе мышечной силы, съ увеличеніемъ теплоты тѣла пульсъ дѣлается твердымъ; при длительномъ употребленіи селезенка дѣлается меньше и тверже. Увеличеніе числа бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ; опуханіе отдѣльныхъ лимфатическихъ железъ. Тяжесть членовъ, сильная усталость и слабость, сонливость, наклонность лежать, частые приступы дрожи всего тѣла; приступы дурноты, приливы крови къ головѣ и груди. Ухудшеніе многихъ припадковъ вечеромъ и ночью, отъ покоя, улучшеніе при умѣренномъ движеніи.

С о н ъ легкій, дремота, частыя пробужденія съ труднымъ засыпаніемъ.

Дурное, тоскливое настроеніе духа, мѣняющееся, то свѣтлѣе, то мрачнѣе.

Чрезвычайно чувствительная къ дотрогиванію кожа, съ проступающими синими полосами венъ, наклонностью къ потоотдѣленію при малѣйшемъ движеніи, зудъ кожи въ теплѣ и выбрасываніе мелкихъ пузырьковъ, съ серознымъ содержимымъ.

Нервная система.

Мозгъ: состояніе прилива съ возбужденіемъ, переполненіемъ кровью корковаго слоя,—безсознательность, тоническія судороги, временное суженіе сосудовъ съ обѣднѣніемъ кровью, приступы слабости и дурноты. Головокруженіе, головныя боли, гиперестезія кожи головы (болѣзненная чувствительность). Пораженіе 5-ой пары нервовъ, судорожное сжатіе челюстей, боли и онѣмѣненіе язычныхъ нервовъ, временная невозможность говорить.

Воспалительное пораженіе вѣкъ, катарръ соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока (конъюнктивитъ).

Шумъ въ ушахъ. Кровотеченіе изъ лѣвой ноздри. Ревматоидныя боли въ мышцахъ спины и крестцѣ; невралгіи различнаго рода.

Органы кровообращенія.

Ускоренная и усиленная дѣятельность сердца. Повышеніе температуры тѣла. Скорый и малый пульсъ; полный и твердый пульсъ съ наклонностью къ разрывамъ сосудовъ. Неправильное распредѣленіе крови въ различныхъ частяхъ тѣла, особенно переполненіе кровью мозга и легкихъ съ обѣднѣніемъ кровью периферическихъ частей. Лихорадочныя явленія.

Органы дыханія.

Катарръ слизистой оболочки бронховъ съ кашлемъ и слизистой мокротой, судороги голосовой щели, сухой кашель съ задыханіемъ и тупыми болями, кашель съ выдѣленіемъ крови (ухудшеніе всѣхъ симптомовъ при движеніи), сжиманіе груди, судорога въ груди, одышка; сильное легочное кровотеченіе.

Органы пищеваренія.

Воспалительное опуханіе железъ зѣва, затрудненное глотаніе, судорога глотки, отсутствіе аппетита, особенно отвращеніе къ мясной пищѣ; тошнота послѣ ѣды съ наклонностью къ рвотѣ, выбрасываніе пищи тотчасъ же по пріемѣ, рвота слизью и водой. Судорожныя боли желудка.

Вздутіе живота газами, урчаніе, колики. Позывы на стулъ съ запорами, опуханіе геморроидальныхъ венъ, отхожденіе слизи и крови при испражненіи; жидкій стулъ; боли въ прямой кишкѣ. Окраска каловыхъ массъ выдѣляющимся вонъ изъ тѣла желѣзомъ въ красновато-бурый или зеленовато-черный цвѣтъ.

Моче-половые органы.

Непроизвольное отхожденіе мочи, особенно днемъ, боли въ каналѣ при мочеиспусканіи. Сильное половое возбужденіе съ поллюціями. Слизетеченіе изъ мочевого канала.

Болѣзненная чувствительность матки, запаздываніе мѣсячныхъ на нѣсколько дней, незначительныя водянистыя мѣсячныя, выкидышъ и маточное кровотеченіе; бѣли, какъ жидкое молоко, съ ѣдкими свойствами.

Примѣненіе у больныхъ.

При блѣдной немочи у хлоротическихъ дѣвушекъ; при приливахъ крови къ головѣ, носовыхъ кровотеченіяхъ, воспаленіи мозга; при скарлатинѣ съ незначительными пораженіями кожи; при золотушномъ воспаленіи глазъ, опуханіи миндалинъ; при воспаленіи слизистой оболочки гортани (ложный крупъ) и бронховъ; при воспаленіи легкихъ, легочномъ кровотеченіи, ночныхъ приливахъ крови съ одышкою, Виттовой пляскѣ; при ревматическихъ боляхъ; при Верлгофовой пятнистой болѣзни (кровоточивость, легкая разрываемость сосудовъ); при водянкѣ, отекѣ рукъ и ногъ; при судорогахъ желудка и хроническихъ поносахъ, слабости мышцъ мочевого пузыря, при хроническихъ катаррахъ мочевого пузыря и канала, водянкѣ мошонки, половомъ возбужденіи съ частыми пол-

люціями; при слишкомъ жидкихъ и скудныхъ мѣсячныхъ, чрезвычайной чувствительности половыхъ частей, выкидышахъ, безплодіи, маточномъ кровотеченіи и бѣляхъ.

Фитолякка.

(Phytolacca decandra).

Общее. Симптомы отравленія отъ нѣсколькихъ граммъ корня или ягодъ: тошнота, жестокая рвота и поносъ съ сильными болями въ желудкѣ и животѣ, слюнотеченіе, воспалительное состояніе слизистой оболочки рта и миндалинъ, головная боль, ослабленіе зрѣнія, головокруженіе, судороги, холодный потъ и охлажденіе конечностей. Разбитость и слабость, упадокъ силъ, дрожь и подергиванія членовъ, судорожныя движенія рукъ и ногъ, суставныя боли, ревматическія страданія. Ухудшеніе многихъ симптомовъ при движеніи и на свѣжемъ воздухѣ, за исключеніемъ головной боли, которая уменьшается на воздухѣ; многія разстройства сопровождаются ощущеніемъ жара.

Сонъ очень неспокоенъ, безсонница; сонливость днемъ

Состояніе духа равнодушное, подавленное, раздражительное съ большимъ безпокойствомъ, нежеланіе какого-либо напряженія и умственной работы.

Кожа: красная пятнистая высыпь, медленно распространяющаяся съ головы внизъ по тѣлу и постепенно исчезающая вслѣдствіе шелушенія; чирьи, образованіе узелковъ и пузырьковъ, съ зудомъ. Желтуха.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы. Головныя боли, головокруженіе, бредъ. Лицо блѣдно или красно, ощущеніе жара. Вѣки опухши, зудъ, жженіе въ глазахъ; катарръ соединительной оболочки глазъ.

Спинной мозгъ. Боли и колотья въ различныхъ группахъ мышцъ и суставовъ, невралгіи разнаго рода.

Органы кровообращенія.

Ослабленіе дѣятельности сердца, боли въ области сердца, исчезающій пульсъ, ознобъ, ощущеніе жара, холодный потъ.

Органы дыханія.

Насморкъ, охриплость, царапанье и жженіе въ гортани и бронхахъ, короткій, сухой кашель, приступы кашля съ изверженіемъ вязкой, слизистой мокроты; затрудненное дыханіе, боли въ груди.

Органы пищеваренія.

Зубная боль. Воспалительное пораженіе слизистой оболочки языка и полости рта съ образованіемъ пузырьковъ и язвъ, жестокое воспаленіе мягкаго неба и миндалинъ, сильныя боли въ глоткѣ и у корня языка.

Ослабленіе аппетита или необыкновенный голодъ, сильная жажда, отрыжка, тошнота и неоднократная жестокая рвота, боли въ желудкѣ, въ области печени и селезенки, колики, отхожденіе газовъ, частыя жидкія испражненія, боли въ прямой кишкѣ, кровоточащія геморроидальныя шишки.

Моче-половые органы.

Боли въ области почекъ, въ мочевомъ пузырѣ до и во время мочеиспусканія, частое мочеотдѣленіе, болѣзненные позывы; темная моча съ осадкомъ.

Боли въ сѣмяныхъ канатикахъ. Слишкомъ обильныя и болѣзненныя мѣсячныя. Опуханіе грудныхъ железъ.

Примѣненіе у больныхъ.

Съ успѣхомъ дается при злокачественной скарлатинѣ, дифтеритѣ, ревматическихъ страданіяхъ, невралгіяхъ, охриплости, судорогѣ сердца, поносахъ, воспаленіи кишечника, боли и выпаденіи прямой кишки, катаррѣ мочевого пузыря, геморроидальныхъ стра-

даніяхъ, боляхъ въ мошонкѣ, трипперѣ, боляхъ въ маткѣ, бѣляхъ, воспаленіи грудной железы.

Фосфоръ.

(Phosphorus).

О б щ е е. Дѣйствіе фосфора представляется весьма различнымъ, смотря по количеству, качеству и формѣ препарата, въ которомъ онъ вводится въ организмъ. Вызываемая отравленіемъ парами фосфора такъ называемая „фосфорная болѣзнь" выражается то въ формѣ гастрическихъ разстройствъ, то какъ воспалительныя пораженія слизистой оболочки дыхательныхъ органовъ, но въ особенности характернымъ является пораженіе (омертвѣніе) челюстныхъ костей. Вслѣдъ за введеніемъ большихъ дозъ фосфора наблюдается воспаленіе желудка, кишекъ, печени и почекъ, съ исходомъ въ смерть. Испытанія этого средства въ гомеопатическихъ разведеніяхъ дали слѣдующіе результаты: общее недомоганіе, разбитость, тяжесть членовъ, слабость до дурноты, холодъ конечностей, жаръ въ головѣ и груди, чувство дрожанія въ тѣлѣ, легкое простуживаніе на свѣжемъ воздухѣ съ послѣдующими ревматическими разстройствами, капиллярныя кровотеченія (петехіи), исчезновеніе жира (исхуданіе), ухудшеніе вечеромъ и ночью.

С о н ъ наступаетъ поздно, разстраивается и прерывается кошмарами. Днемъ сонливость, засыпаніе сидя съ склоненною головою, открытымъ ртомъ и истеченіемъ слюны.

С о с т о я н і е д у х а: въ первые дни повышенное самочувствіе, живость, душевная бодрость. На смѣну состоянія экзальтаціи является состояніе угнетенія, характеризующееся разбитостью, подавленностью, нежеланіемъ заниматься, равнодушіемъ, отвращеніемъ къ жизни, меланхоліей, наклонностью плакать; повышенная раздражительность, чувствительность.

К о ж а и ж е л е з ы: зудъ, жженіе, разнохарактерныя накожныя пораженія и высыпи, желтушное окрашиваніе. Выпаденіе волосъ.

Опуханіе слюнныхъ и лимфатическихъ железъ. Воспалительное опуханіе грудныхъ железъ (Mastilis) съ исходомъ въ нагноеніе.

Нервная система.

Мозгъ и мозговые нервы: пораженіе интеллектуальной сферы, маніакальные приступы, спутанность представленій, головокруженіе, напоры крови въ мозгъ, головныя боли. Конвульсивныя подергиванія лицевыхъ мышцъ.

Органъ зрѣнія. Воспалительное опуханіе вѣкъ, катарръ соединительной оболочки вѣкъ и глазного яблока. Желтушное окрашиваніе глазныхъ яблокъ. Очень суженные зрачки, свѣтобоязнь, ослабленіе зрѣнія.

Органъ слуха. Боли въ слуховомъ проходѣ, катарръ евстахіевой трубы, неврозъ слухового нерва, глухота, сильные шумы.

Органъ обоняніе. Пораженіе слизистой оболочки носа. сильное носовое кровотеченіе по вечерамъ, отдѣленіе кровянистой слизи по утрамъ. Обостреніе обонянія, особенно по отношенію къ противнымъ запахамъ.

Спинной мозгъ. Невралгическіе и паралитическіе симптомы, ревматоидныя боли мышцъ и суставовъ. Параличное состояніе рукъ и ногъ. Анестезіи и парестезіи чувствительныхъ нервовъ.

Органы кровообращенія.

Сердцебіеніе, особенно рано утромъ, послѣ стола и вечеромъ, послѣ незначительныхъ движеній и душевныхъ возбужденій. Застои крови, особенно въ правомъ сердцѣ и большихъ венахъ. Пульсъ полный и сильный, замедленный, неправильный, быстрый и малый, кровоизліянія въ капиллярной сѣти. Лихорадка: внутренній холодъ при теплой погодѣ, познабливаніе, гусиная кожа, жаръ, потъ ночью или утромъ съ ощущеніемъ утомленія; послѣобѣденные пароксизмы зноба, жара (съ жаждой) и пота. Ночные приступы лихорадочнаго жара съ послѣдующимъ сильнымъ потоотдѣленіемъ.

Дыхательные органы.

Охриплость по утрамъ, царапанье въ горлѣ и груди, сухой кашель, приступами, особенно ночью. Мучительный кашель, ли-

шающій сна ночью, съ выдѣленіемъ вязкой слизи. Отдѣленіе гнойной, кровянисто-слизистой мокроты. Одышка, боли въ груди, колотья.

Пищеварительные органы.

Воспаленіе и опуханіе десенъ. Сухость, кровоизліянія, кровоточивость слизистой оболочки языка и рта. Слюнотеченіе. Опуханіе миндалинъ, затрудненное глотаніе. Ненормально кислый, горькій и непріятный вкусъ, ослабленіе и отсутствіе аппетита, потребность въ пищѣ и питьѣ, голодъ, чувство полноты въ желудкѣ. Отрыжка, изжога, тошнота, съ сильною жаждою цѣлый день, позывы на рвоту и рвота съ приступами дурноты. Боли, судороги желудка, вздутіе (параличъ мышечной оболочки), замедленное пищевареніе. Вздутіе живота, боли, рѣзь, колики, пораженіе чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ кишечника. Позывы на стулъ, натуживаніе, желчный, темный стулъ, катарръ тонкихъ кишекъ и желчнаго протока, жидкій стулъ. Твердыя каловыя массы, покрытыя слизью. Воспаленіе прямой кишки, опуханіе и выпячиваніе геморроидальныхъ узловъ, кровотеченіе изъ задняго прохода.

Моче-половые органы.

Болѣзненныя ощущенія въ почкахъ, мочевомъ пузырѣ, ощущенія колотья и жженія въ мочевомъ каналѣ. Отсутствіе позывовъ при полномъ пузырѣ. Сильные позывы съ незначительнымъ выдѣленіемъ. Замедленное и задержанное мочеиспусканіе. Непроизвольное мочеотдѣленіе. Ночное недержаніе мочи. Отхожденіе мочи каплями при чиханіи и кашлѣ. Моча содержитъ бѣлокъ и цилиндры, что указываетъ на катарръ или воспаленіе почекъ (нефритъ).

Сильное половое возбужденіе съ жестокими эрекціями и поллюціями, послѣдовательное длительное ослабленіе половой сферы; центральное мозговое возбужденіе и полная недѣятельность периферическихъ (половыхъ) органовъ.

Переполненіе матки кровью, боли и колики, раннее появленіе мѣсячныхъ, болѣзненныя мѣсячныя, запаздываніе и задержка мѣсячныхъ, скудное очищеніе. Бѣли.

Примѣненіе у больныхъ.

Въ острыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, въ которыхъ подавлена энергія отправленій нервной системы, при чрезвычайной чувствительности къ холодному воздуху съ предрасположеніемъ къ простудѣ, раздражительности и слабости отъ заботъ и печалей, истощеніи и параличѣ вслѣдствіе половыхъ излишествъ и злоупотребленій, при импотенціи, потерѣ сѣмени, при пораженіяхъ спинного и головного мозга съ болями или безъ нихъ, при разстройствахъ зрѣнія и слуха, при суставныхъ боляхъ, въ особенности въ плечевомъ и тазобедренномъ, при параличѣ двигательныхъ нервовъ, при невралгіяхъ различнаго рода, при душевныхъ разстройствахъ съ характеромъ угнетенія—меланхоліи, ипохондріи; при экстатическихъ разстройствахъ, маніакальныхъ приступахъ, при сомнамбулизмѣ, при безсонницѣ съ нервнымъ возбужденіемъ, при приливахъ крови и сердцебіеніи, тифозной лихорадкѣ, сыпномъ тифѣ, скорбутѣ, Верльгофовой пятнистой болѣзни, брюшномъ тифѣ съ воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ, при пораженіяхъ кожи—сыпяхъ, цвѣтныхъ пятнахъ, при опуханіяхъ железъ, при воспаленіи и образованіи нарывовъ въ грудной железѣ, при атрофическихъ пораженіяхъ кожи, выпаденіи волосъ; при пораженіи пищеварительныхъ органовъ, аномаліяхъ аппетита и вкуса, чувствѣ голода, прожорливости, отрыжкѣ, позывахъ на рвоту, боляхъ и судорогѣ желудка, при хроническомъ катаррѣ и образованіи язвъ слизистой оболочки желудка, вздутіи живота съ сильными вѣтрами, катаррѣ тонкихъ кишекъ, свѣтлоокрашенномъ жидкомъ стулѣ, холеринѣ, боляхъ въ прямой кишкѣ, опуханіи печени; при болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ: хронической сипотѣ, катаррѣ гортани и дыхательныхъ трубокъ, съ частыми приступами кашля, изнурительными ночными и утренними потами, при воспаленіи легкихъ, съ слизисто-гнойной и кровянистой мокротой; при сердцебіеніи, застояхъ крови, особенно въ венозной и капиллярной системахъ съ опасностью кровотеченій въ различныхъ органахъ; при пораженіяхъ почекъ съ бѣлкомъ въ мочѣ или безъ такового, при слабости пузыря, ночномъ недержаніи мочи, разстройствахъ мѣсячныхъ, съ сильной потерей крови, при обильныхъ, ѣдкихъ бѣляхъ.

ДОПОЛНЕНІЕ.

Фосфори ацидумъ.

(Phosphori acidum).

Чѣмъ выше разведеніе препарата, тѣмъ все больше и больше скрадывается различіе въ дѣйствіи фосфора и фосфори ацида. Вмѣстѣ съ потенцированіемъ фосфора происходитъ одновременно и значительное его окисленіе, которое можетъ быть доведено до весьма высокихъ ступеней, что и усиливаетъ цѣлебность препарата. Благодѣтельное дѣйствіе фосфора на нервную систему (въ высокихъ степеняхъ разведенія), его возбуждающее и регулирующее дѣйствіе на органическіе процессы совершенно тождественно съ подобными же результатами примѣненія потенцированной фосфорной кислоты (фосфори ацидума). Итакъ, наблюденія и испытанія, произведенныя надъ обоими препаратами, говорятъ за полную тождественность дѣйствія обоихъ средствъ на здоровый и больной организмъ, начиная съ третьяго сотеннаго разведенія.

Всѣ симптомы, полученные при испытаніи фосфора и фосфори ацида, представляются одинаковыми за исключеніемъ спеціальныхъ симптомовъ фосфорнаго отравленія, какъ-то, явленія жестокаго воспаленія желудка, кишекъ, печени, почекъ, мочевого пузыря, ожирѣнія сердечной мышцы, паралича вслѣдствіе перерожденія спинного мозга, омертвѣнія нижней челюсти.

Болѣе низкія дѣленія фосфори ацида (×3) примѣняются при длительныхъ приливахъ крови къ головѣ, съ затемнѣніемъ сознанія, апатіей, слабостью, безпокойнымъ сномъ, изнурительными потами, при пораженіяхъ глазъ съ чувствительностью къ свѣту, при скарлатинозныхъ и пустулезныхъ сыпяхъ на кожѣ, золотушныхъ опуханіяхъ носа и губъ съ наклонностью къ кровотеченію, легко кровоточащія, опухшія десны, скорбутъ, тифозная лихорадка, хроническое нагноеніе железъ, хроническій катарръ гортани и бронховъ съ наклонностью къ кровотеченію, жидкія свѣтлоокрашенныя испражненія, холерина, опухшія, кровоточащія, сильно болѣзненныя геморроидальныя шишки, съ болями въ прямой кишкѣ, хроническій катарръ мочевого канала и пузыря, застарѣлый трипперъ, слабость мышцъ мочевого пузыря, легкое и

непроизвольное отхожденіе мочи при движеніяхъ, кашлѣ и чиханіи, частые позывы на мочу съ обильнымъ выдѣленіемъ, поліурія; слабость производительной силы и потери сѣмени при слабомъ членѣ, отслоеніе эпителія большими частями на мошонкѣ съ болью, какъ отъ раны; общая нервная слабость вслѣдствіе половыхъ злоупотребленій, излишествъ, заботъ, огорченій, угнетающія вліянія и раздраженія всякаго рода, меланхолическое состояніе съ необыкновенною наклонностью къ слезамъ.

Хина.

(China).

Общее. Чрезмѣрная чувствительность всего тѣла, особенно органовъ чувствъ, ко всякаго рода впечатлѣніямъ съ ощущеніемъ слабости и упадка; истощеніе силъ послѣ небольшого движенія и напряженія съ выдѣленіемъ повсемѣстно пота, холодный клейкій потъ отдѣльныхъ частей тѣла; дергающія и колющія боли въ мягкихъ частяхъ, тянущія и сверлящія боли въ костяхъ и суставахъ (въ надкостницѣ трубчатыхъ костей) съ опуханіемъ тканей и лихорадочнымъ состояніемъ, ломотныя боли въ мышцахъ; ухудшеніе при дотрогиваніи и движеніи вечеромъ и ночью; ощущеніе параличной слабости членовъ. Ознобъ, волненія крови, приступы дурноты, опуханія клѣтчатки, водяночныя и скорбутныя пораженія.

Сонъ очень глубокій и крѣпкій—или короткій и неспокойный съ фантастическими снами.

Настроеніе духа равнодушное до апатіи, угнетенное, мрачное,—или чрезмѣрно раздражительное, наклонность къ жалобамъ, упрекамъ, спору.

Кожа холодная на рукахъ и ногахъ, тонкія, раздражающія покалыванія повсюду тамъ и сямъ съ повсемѣстною повышенною раздражительностью, высыпаніе мелкихъ пузырьковъ съ водянистымъ содержимымъ; блѣдность, желтизна лица съ втянутыми чертами, по временамъ сильно покраснѣвшее лицо съ легкимъ опуханіемъ. Выпаденіе волосъ послѣ головныхъ болей.

Нервная система.

Головной мозгъ и нервы. Замедленная душевная дѣятельность и отвращеніе къ умственнымъ напряженіямъ; затрудненное сужденіе и мышленіе, временная утрата памяти, тяжелое, медленное теченіе мыслей, перерывъ въ потокѣ впечатлѣній; состояніе оглушенія съ яснымъ сознаніемъ, устраненное отправленіе въ области двигательныхъ нервовъ, почему велѣнія воли не передаются и отсюда желаемыхъ движеній не получается, особенно въ нижнихъ конечностяхъ. Переполненіе кровью сосудовъ мозга: тяжесть, полнота, давленіе, чувство напряженія въ головѣ, головокруженіе, тянущія, колющія и пульсирующія боли въ мозгу, періодическія головныя боли, особенно въ утренніе и послѣполуденные часы. Боли вызываются и усиливаются движеніемъ, холоднымъ воздухомъ, вѣтромъ, душевнымъ напряженіемъ, процессомъ пищеваренія и одновременно существующими разстройствами въ отправленіяхъ брюшныхъ органовъ, вслѣдствіе потери соковъ. Пульсація въ артеріяхъ шеи, висковъ и лба.

Болѣзненность, переполненіе кровью глазного яблока. Ослабленіе зрѣнія.

Въ спинномъ мозгу и спинно-мозговыхъ нервахъ переполненіе кровью сосудовъ, ревматическія боли, болѣзненность суставовъ.

Органы кровообращенія.

Усиленныя и неправильныя сокращенія сердца, ускоренный, твердый пульсъ, сильное сердцебіеніе при маломъ пульсѣ, тупая пульсирующая боль въ области сердца, переполненіе кровью и недостатокъ крови въ различныхъ сосудистыхъ областяхъ. Состояніе лихорадки: ознобъ съ гусиною кожею, ощущеніе жара въ отдѣльныхъ частяхъ тѣла съ холодомъ въ остальномъ тѣлѣ, общій жаръ; приступы лихорадки съ ознобомъ, жаромъ и потомъ, во время приступовъ сильный приливъ крови къ головѣ и головная боль.

Органы дыханія.

Насморкъ, носовыя кровотеченія, катарры слизистой оболочки носа, гортани и воздухоносныхъ трубокъ, охриплость, кашлевое

раздраженіе, судорожный кашель, отхаркиваніе слизи съ примѣсью крови. Боли въ груди при кашлѣ и дыханіи, сжиманіе груди, чувство тоски, одышка, приливъ къ легкимъ.

Органы пищеваренія.

Опуханія губъ и десенъ, расшатанность зубовъ и зубная боль; катарръ слизистой оболочки рта съ образованіемъ пузырьковъ на краяхъ и кончикѣ языка; слизистый, желтоватый налетъ на языкѣ, увеличенное отдѣленіе слюны и болѣзненность слюнныхъ железъ; дурной запахъ изо рта; катарръ слизистой оболочки неба и глотки съ затрудненнымъ глотаніемъ; дурной; соленый, слизистый и горькій вкусъ. Отсутствіе аппетита. Горькая, кислая отрыжка, тошнота и рвота, чувство полноты и давленія въ желудкѣ.

Колотья и рѣзи въ печени и селезенкѣ. Вздутіе живота, газы, колики, отхожденіе вѣтровъ. Запоры, трудный стулъ,—или мягкія, жидкія массы, поносъ съ болями и жженіемъ въ прямой кишкѣ, жидкій, буровато окрашенный стулъ съ остатками непереваренной пищи, глинообразный стулъ, опуханіе геморроидальныхъ венъ съ болями, зудомъ, жженіемъ, геморроидальныя кровотеченія.

Моче-половые органы.

Чувство тупого давленія въ области почекъ при поворачиваніи и сгибаніи. Позывы на мочу безъ отхожденія таковой или продолжительное мочеиспусканіе тонкой струей, незначительное количество мочи съ осадкомъ мочекислыхъ солей, желтовато-зеленая или бурая моча, или увеличеніе и учащенное отхожденіе свѣтлой, водянистой мочи.

Увеличенное половое стремленіе, частыя эрекціи и ночныя поллюціи.

Прекращеніе мѣсячныхъ; усиленіе мѣсячнаго отдѣленія до кровотеченія; выдѣляющаяся кровь черная и густая.

Примѣненіе у больныхъ.

При лихорадочныхъ и безлихорадочныхъ состояніяхъ, соединенныхъ со значительною раздражительностью и слабостью нервной системы и большимъ истощеніемъ силъ, съ вялою, желто-

ватою кожею, наклонною къ потѣнію; при кровотеченіяхъ изъ носа и горла; при увеличенномъ слюнотеченіи; при частыхъ поллюціяхъ съ возбужденіемъ половой сферы; при обильномъ слизетеченіи со слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ трубокъ, тонкихъ кишекъ и изъ влагалища; при безсиліи и дрожаніи членовъ съ начинающимся параличемъ; при нервныхъ боляхъ головы, туловища и членовъ; при нервномъ сердцебіеніи и неправильномъ пульсѣ; при разстройствахъ дыханія и одышкѣ (астматическихъ приступахъ); при лихорадочныхъ, гастрическихъ и тифозныхъ пораженіяхъ; при ревматическихъ воспаленіяхъ суставовъ; при болѣзняхъ печени и селезенки; при лейкеміи (ненормально-повышенное количество бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ) и гидреміи; при опуханіяхъ клѣтчатки и водяночныхъ состояніяхъ; при перемежающейся лихорадкѣ и при періодически возвращающихся болѣзненныхъ явленіяхъ; при пораженіяхъ органовъ чувствъ: слабомъ и мутномъ зрѣніи, временномъ упадкѣ остроты зрѣнія, шумѣ и звонѣ въ ушахъ, съ ослабленіемъ слуха; при скорбутныхъ состояніяхъ, хроническихъ воспаленіяхъ съ затяжнымъ нагноеніемъ.

СПИСОКЪ

всѣхъ лѣнарствъ и дѣленій, указанныхъ въ лѣчебникѣ.

Главныя средства и разведенія напечатаны жирнымъ шрифтомъ; слѣдующія наиболѣе употребительныя средства—*курсивомъ*.

Авена сатива Θ
Агарикусъ мускаріусъ **6**
Адонисъ **2**
Айлантусъ гландулоза **3**
Акалифа индика **3**
Аконитъ ×3, 1, 2, **3**
Актеа рацемоза (Цимицифуга) **3**, 6
Алуминіумъ металликумъ **3** (растираніе), **6**
Алумина 3 (растираніе), **6**
Аммоніумъ броматумъ **3**
„ карбоникумъ 1, **3**
„ муріатикумъ **3**
Ангустура **6**
Антимоніумъ арсеникозумъ ×3, **2**
Антимоніумъ крудумъ 3, **6**
Антимоніумъ тартарикумъ=Тартарусъ эметикусъ.
Апись 3, 6
Аписинумъ **3** (растираніе)
Апоцинумъ каннабинумъ ×**2**, 3
Аралія рацемоза **3**
Аргентумъ нитрикумъ 2, 3, **6**, 30
Арника ×1, 1, 2, **3**, 6, 30
Арсеникумъ ×3, **3**, 6, 12, 30
„ іодатумъ **3**, 5, 6
Арумъ трифиллумъ **3**
Асса фетида **6**
Атропинумъ сульфурикумъ 2,3,6
Аурумъ **6**
„ броматумъ **3**
„ іодатумъ 3, **6**
„ **муріатикумъ** 3, 4, **6**
„ *муріатикумъ натронатумъ* ×3, **3**
Ацидумъ ацетикумъ **3**
„ *бензоикумъ* 2, **3**
„ *гидроціаникумъ* **6**
„ карболикумъ **1**
„ муріатикумъ ×**1**, 3
„ **нитрикумъ** ×3,1,2,3,6
„ сульфурикумъ 2,**3**,30
„ флуорикумъ **6**
„ *фосфорикумъ* 1, **3**,6
Бальзамъ перувіанумъ ×**3**, 1
Баптизія ×3, **1**, 3
Барита ацетика **6**
„ карболика **6**
Белладонна 1, **3**, 6, 30
Берберисъ 2, **3**
Бисмутумъ нитрикумъ 2, **6**
Блатта оріенталисъ **2**
Бовиста **3**
Бораксъ **3**
Бріонія ×3, 1, **3**, 6
Броміумъ 2, **3**
Бурза пасторисъ **1**

Валеріана 3, 6
Вератрумъ альбумъ ×3, **3**, 6
„ вириде **3**
Вибурнумъ **3**
„ опулусъ 1, **3**
„ прунифоліумъ **3**
Віола триколоръ **3**
Гамамелисъ ×1, ×2, ×**3**, 1, 2, 3
Геллеборусъ 1, **3**
Гельземинумъ 1, **3**, 6, 30
Гепаръ-сульфурисъ ×3, 3, **6**, 30
Гидрастисъ каннадензисъ ×1, ×**3**, 1, 3, 6
Гинзенгъ **3**
Гиперикумъ ×1, **3**
Гіосціамусъ ×**3**, 1, 3
Глоноинъ 1, **3**
Графитъ 3, **6**
Даміана **3**
Дигиталисъ 1, 2, **3**
Діоскореа **3**
Дрозера ×**3**, 1, 3, 6
Дулькамара 3, 6
Евфразія ×3, **3**
Игнація ×3, **3**, 6, 30
Ипекакуана 1, 2, **3**, 6
Ирисъ **30**
Іодіумъ ×3, 1, **3**, 6
Кактусъ ×**2**, 1, 2, 3
Калабаръ **3**
Кали бихромикумъ **3**, 6
„ *гидроіодикумъ* = Кали іодати
„ гидроціаникумъ (Калиціанатумъ) **3**
„ іодати ×1, ×2, **1**, 2, 3= Кали гидроіодикумъ
„ карбоникумъ 3, **6**, 12, 30
Кали сульфурикумъ **6**
„ *фосфорикумъ* **6**, 30
„ хлоратумъ×6, **3**, 6
„ хлорикумъ 2, **3**
Калькареа-ацетика **3**, 30
„ іодата ×6, **6**, 30
„ карбоника ×6, 3, **6**, 12, 30
„ окзалика **6**
„ сульфурика **6**
„ флуорика = Кальціумъ флуорикумъ
Калькареа-фосфорика ×6, **3**, **6**, 30
Кальмія **3**
Кальціумъ-флуорикумъ ×6, 3, **6**=Калькареа-флуорика
Камомилла 1, **3**, 6=**Хамомилла**
Камфора 1, **3**
„ Рубини Θ
Каннабисъ сатива ×3, **3**
Кантарисъ 3, 6
Карбо-анималисъ **6**
„ вегетабилисъ ×2, ×3, **3**, **6**, 30
Кардуусъ маріанусъ **2**
Кастореумъ **3**
Каулофиллумъ **3**
Каустикумъ **3**, 5, 6
Келидоніумъ=Хелидоніумъ
Клематисъ **3**
Кока **1**, 30
Коккулусъ **3**
Коккусъ какти 1, **3**
Коллинзонія каннадензисъ ×2, ×**3**, 1, 2, 3
Колоцинтисъ 3, 6
Кольхикумъ 1, **3**
Конвалларія маялисъ ×**2**

Кондуранго Θ, 1, 2
Коніумъ 3, 6, 30
Коридалисъ формоза 1
Кофеа 2, 3
Креозотъ, ×2, 3
Крокусъ 3
Кроталусъ горридусъ 30
Кротонъ тигліумъ 6
Купрумъ 6, 30
Купрумъ ацетикумъ 3 (растираніе и капли).
Купрумъ сульфурикумъ ×3
Кураре 3
Ледумъ 3
Лептандра 3
Ликоподіумъ ×3, 3, 6, 30
Литіумъ карбоника ×2, 1, 6
Лобелія 1, ×2
Лаписъ альбусъ 3
Лупулинумъ 3
Ляхезисъ 6, 12, 30
Магнезіа карбоника 1, 3, 6
„ муріатика 6
„ *фосфорика* ×6, 6
Мезереумъ ×1, ×3, 3, 6
Меркуріусъ біодатусъ ×3, 3, 4, 6
„ вивусъ 6
„ дульцисъ 3 (растираніе)
„ іодатусъ фл. 3, 6
„ „ рубр.=Меркуріусъ біодатусъ
„ коррозивусъ ×2, ×3 3, 6
„ преципитатусъ рубреръ ×3, 3
Меркуріусъ солюбилисъ Ганемана ×3, 3, 6, 30
Меркуріусъ ціанатусъ 6
Миллефоліумъ 3
Мосхусъ 3, 6=Мошусъ
Мошусъ=Мосхусъ
Мурексъ 3
Натрумъ іодатумъ 3
„ *муріатикумъ* 1, 3, 6, 30
„ нитрикумъ 3
„ салициликумъ ×1
„ *фосфорикумъ* ×6 3, 6
„ холеиникумъ 6
Нафталинумъ ×2, 3
Ная трипудіансъ 6
Никколумъ сульфурикумъ ×1, 2
Никотинумъ ×4
Нитри ацидъ=Ацидумъ нитрикумъ.
Нуксъ вомика ×3, 1, 2, 3, 6, 30
Нуксъ мосхата=Нуксъ мошата.
„ мошата 6
Олеумъ теребинтина = Теребинтина.
Опіумъ 1, 3, 6, 30, 12
Папаіотинъ 3
Парейра брава 1
Пассифлора инкарната 3
Пеонія оффициналисъ 3
Петролеумъ 3, 6
Пилокарпинъ 6
Плантаго 3
Платина 6
Плумбумъ 6, 30
Подофиллинъ 1
Подофиллумъ ×3, 3
Потентилла анзерина ×1
Пульсатилла ×3, 3, 6
Пургативъ вежеталь
Рана буфо 6, 30
Ранункулусъ бульбозусъ 3

Рафанусъ сативусъ 2
Реумъ 1, 3
Рододендронъ 3, 6
Румексъ ×3, 3, 6
Русъ ×1, ×3, 3, 4, 6
Рута 3
Сабадилла 3
Сабина 3
Самбукусъ ×3, 1, 3, 6
Сангвинарія каннадензисъ 3
Сарсапарилла 3
Секале корнутумъ 1, 2, 3
Сempервивумъ текторумъ 3
Сенега ×3
Сенеціо 1
Сепіа 3, 6, 30
Силицеа 2, 3, 6, 30
Симфитумъ 3
Сицигіумъ іамболанумъ 1
Сквилла = Сцилла.
Спигеліа 3, 6
Спиритусъ нитри дульцисъ 1
Спонгіа ×3, 1, 3
Станнумъ 6
Стафизагрія 3, 6
Страмоніумъ 3, 6
Стрихнинумъ нитрикумъ 6
Стронціумъ карбоникумъ 6
Строфантусъ 2
Сульфуръ ×1, ×3, 2, 3, 6, 30
„ ауратумъ ×3, 3, (растираніе) 6
Сцилла (Сквилла) 1, 3
Тапсіа 6
Тарантула 12
Тартарусъ эметикусъ. (Антим. тартар.) ×2, 1, 3, 6
Теребинтина (Ол. теребинтин.) 1, 3
Теукріумъ марумъ 1, 3
Туя 3, 6, 12, 30
Трилліумъ 3
Туберкулинъ 30
Ураніумъ нитрикумъ ×3
Уртика 3, 6
Ува урзи 1
Фелландріумъ 3
Феррумъ ×3, 2, 3, 6
„ *гематикумъ* ×1, (растираніе) ×2, 2
„ карбоникумъ ×1, 2, 3, 6
„ іодатумъ 3
„ нитрикумъ 2 (растираніе).
„ пикриникумъ 3
„ сульфурикумъ 2, 6
„ фосфорикумъ ×2, ×6, 3, 6
Фитолакка ×1, ×3, 1, 3
Фосфоръ 3, 6, 30
Фосфоръ ацидъ = Ацидумъ фосфорикумъ.
Хамомилла = Камомилла
Хелидоніумъ ×3, 1, 2, 3
Хина Θ, ×2 ×3, 1, 3,
Хининъ арсеникозумъ ×3, 2
„ сульфурикумъ 2, 3, 6
„ танникумъ 3
Хіонантусъ виргиникусъ ×3
Цепа 2
Цикута вироза 3, 6
Цимицифуга = Актеа рацемоза.
Цина ×1, ×3, 1, 3
Цинкумъ 6
„ валеріаникумъ 1
„ оксидатумъ 3

Цинкумъ сульфурикумъ 30
Цистусъ каннадензисъ 3
Этіопсъ минералисъ 3
Этуза цинапіумъ 3
Эуфорбіумъ ×3
Энанте крокатa 1
Яборанди 3

Десятичная система		Сотенная система
× 2	соотвѣтствуетъ	= 1
× 6	„	= 3

Безъ рецепта врача не отпускаются нѣкоторыя дѣленія слѣдующихъ средствъ:

Антимоніумъ арсеникозумъ ×1—×2—×3.
Арсеникумъ ×1—×2—×3.
Глоноинъ ×1—×2—×3.
Меркурусъ коррозивусъ ×1—×2—×3.
Никколумъ сульфурикумъ ×1
Хининъ арсеникозумъ ×1—×2—×3

ЦѢНЫ

отдѣльнымъ гомеопатическимъ лѣкарствамъ.

(Для внутренняго употребленія *).

съ 1-го до 30 дѣленія.

а) Въ капляхъ, порошкахъ и пилюляхъ:

За стклянку въ 1½-драхмы	— р.	25 к
" " " 2 "	— "	30 "
" " " 4 " или ½ унціи	— "	40 "
" " " 8 " " 1 "	— "	55 "
" " " 12 " " 1½ " (⅛ фунта)	— "	75 "
" " " 16 " " 2 " (⅙ фунта)	1 "	00 "
" " " 24 " " 3 " (¼ фунта)	1 "	50 "
" " " 48 " " 6 " (½ фунта)	2 "	50 "
" " " 96 " " 2 " (1 фунтъ)	4 "	00 "

б) Въ крупинкахъ:

За стклянку обыкн. цилиндр. формы	— "	20 "
" " двойную " "	— "	30 "
" " 2 драхмы " "	— "	40 "
" " 4 " " "	— "	60 "
" " 8 " " "	1 "	00 "
" " 12 " " "	1 "	30 "
" " 16 " " "	1 "	60 "
" " 24 " " "	2 "	00 "
" " 48 " " "	3 "	75 "

в) Въ прессованныхъ таблеткахъ:

до 50 шт. по 2 к., свыше 50 шт. по 1½ к. за штуку.

---

*) Цѣны эти не обязательны для низкихъ дѣленій изъ дорогихъ препаратовъ.

Ц Ѣ Н Ы

аптечкамъ по „Гомеопатическому Домашнему Лѣчебнику“.

Въ капляхъ:

На 48 средствъ въ обыкн. стекл. . . . . 12 р.
„ 48 „ „ двухдрахм. стекл. . . . . 15 „
„ 48 „ „ 1/2-унц. стекл. . . . . 20 „
„ 88 „ „ обыкн. стекл. . . . . 22 „
„ 88 „ „ двухдрахм. стекл. . . . . 26 „
„ 88 „ „ 1/2-унц. стекл. . . . . 35 „

Въ крупинкахъ въ двойныхъ цилиндр. стекл.

На 48 средствъ . . . . . 15 р.
„ 88 „ . . . . . 26 „
„ 255 „ . . . . . 76 „

Улучшенныя аптечки по этому руководству.

Въ капляхъ:

На 48 средствъ (18 сред. въ 1/2-унц., 30 сред. въ 2-хъ-драхм. стекл. и 4 сред. наружныхъ) . . . . . 16 р.
На 88 средствъ (40 сред. въ 1/2-унц., 48 сред. въ 2-хъ-драхм. стекл. и 4 сред. наружныхъ) . . . . . 27 „
На 255 средствъ (88 средствъ въ 1/2-унц., 167 въ 2-хъ-драхм. стекл. 24 наружныхъ, оподельдоки, термометръ, стаканчикъ и облатки для пріема лѣкарствъ . . . . 95 р.

Аптечка, вмѣщающая въ себѣ наружныя средства по этому лѣчебнику, какъ-то: мази, спирты, глицерины, настойки, эссенціи, оподельдоки и проч. до 80 средствъ, въ деревянномъ ящикѣ . . . . . 45 р.

Ц Ѣ Н Ы

аптечкамъ по Руководству д-ра Р. Юза.

Въ капляхъ:

1) Полная Аптечка на 268 средствъ . . . . . 100 р.
Содержитъ 96 главныхъ сред. въ 1/2-унц. стекл., 172 сред. въ 2-хъ-драхм. стекл., 12 наружныхъ тинктуръ, оподельдоки, максимальный термометръ, мѣрочку для капель, 2 стаканчика, облатки, капельникъ.

2) Аптечка на 96 средствъ . . . . . 36 „
Содержитъ 36 главныхъ средствъ въ 1/2-унц. стекл., 60 сред. въ 2-хъ-драхм. стекл., 5 наружныхъ тинктуръ, оподельдоки, стаканчикъ, максимальный термометръ.

3) Аптечка на 60 средствъ . . . . . 18 „
Содержитъ 24 главныхъ сред. въ 1/2-унц. стекл., 36 сред. въ 2-хъ-драхм. стекл., 5 наружныхъ тинктуръ, стаканчикъ и облатки.

Такія же Аптечки въ 1 1/2-драх. стекл.

Въ капляхъ:

Полная Аптечка на 268 сред. и 12 наружныхъ сред. (отдѣльно) . . . . . 65 р.
Аптечка на 96 сред. и 5 наружныхъ сред. (отдѣльно) . . 24 „
„ „ 60 „ „ 5 „ „ „ . . 15 „

Въ крупинкахъ:

1) Въ большихъ стклянкахъ по 2 драхмы:
На 268 средствъ и 12 наружн. (отдѣльно) . . . . . 100 р.
„ 96 „ „ 5 „ („) . . . . . 38 „
„ 60 „ „ 5 „ („) . . . . . 24 „

2) Въ стклянкахъ двойной цилиндр. формы:
На 268 средствъ и 12 наружн. (отдѣльно) . . . . . 80 „
„ 96 „ „ 5 „ („) . . . . . 30 „
„ 60 „ „ 5 „ („) . . . . . 20 „

3) Въ стклянкахъ малыхъ обыкновен. цилиндр. формы:

На	268	средствъ	и	12	наружн.	(отдѣльно)	52 р.
„	96	„	„	5	„	(„)	20 „
„	60	„	„	5	„	(„)	13 „

Примѣчаніе. При покупкѣ Аптечекъ въ 60 средствъ и болѣе, по лѣчебникамъ: „Домашній Лѣчебникъ“ и „Руководство къ лѣченію болѣзней по способу Ганемана“ д-ра Ричарда Юза, лѣчебники прилагаются безплатно.

Ц Ѣ Н Ы

аптечкамъ къ „Ветеринарному Лѣчебнику“.

(Изданіе СПБ. Благотворительнаго Общества Врачей Гомеопатовъ).

На 24 ср. въ 1/2-унц. стекл. для внутр. употр. и 2 „ „ 2 „ „ „ наружн. „ со стаканчикомъ, ложечкою и облатками . . . . . 11 руб.

На 40 ср. въ 1/2-унц. стекл. для внутр. употр. и 4 „ „ 2 „ „ „ наружн. „ со стаканчикомъ, ложечкою и облатками . . . . . 18 „

На 40 ср. (18 ср. въ 1/2-унц. стекл., 22 ср. въ 2-хъ-драхм. стекл. и 4 ср. въ 2-хъ-унц. стекл.) для наружн. употребл., со стаканчикомъ, ложечкою и облатками 16 „

На 60 ср. (24 ср. въ 1/2-унц. стекл., 36 ср. въ 2-хъ-драхм. стекл. и 6 ср. въ 2-хъ-унц. стекл.) для наружн. употребл., со стаканчикомъ, ложечкою и облатками 22 „

На 80 ср. (32 ср. въ 1/2-унц. стекл., 48 ср. въ 2-хъ-драхм. стекл. и 8 ср. въ 2-хъ-унц. стекл.) для наружн. употребл., со стаканчикомъ, ложечкою и облатками 30 руб.

На 136 ср. (50 ср. въ 1/2-унц. стекл., 86 ср. въ 2-хъ-драхм. стекл. и 16 ср. въ 2-хъ-унц. стекл.) для наружн. употребл., со стаканчикомъ, ложечкою и облатками 60 „

Аптечка къ Ветеринарному Лѣчебнику съ наружными средствами состоитъ изъ тинктуръ, растворовъ, мазей, облатокъ, термометра и спринцовки въ 38 средствъ, больш. стекл., ... 40 „

Ц Ѣ Н Ы

разнымъ средствамъ для внутренняго употребленія.

Авена сатива. Полезное средство противъ нервной слабости и истощенія, разсѣянности, при общей слабости, сердцебіеніи. При безсонницѣ Авена сатива обладаетъ качествами Опія, не вызывая дурныхъ послѣдствій, какъ Опіумъ. Хорошее средство противъ послѣдствій злоупотребленія Морфіемъ. По 10 капель 3—5 разъ въ день на рюмку воды. *Флаконъ 50 к.*

Гензелевское желѣзо. (Hensel's Tonicum). Совѣтуютъ отъ малокровія, отъ истощенія вслѣдствіе умственнаго и физическаго труда, отъ истощенія нервной системы и блѣдной немочи. На пріемъ—по 20 капель для взрослыхъ и по 5 капель для дѣтей на рюмку подслащенной воды, или брать капель 10 на стаканъ подслащенной воды и пить глотками въ теченіе дня. *Флаконъ 50 к.*

Какао Легуминозный. (Liebe). Питательное средство. Примѣняется, какъ укрѣпляющее средство, страдающими малокровіемъ и слабымъ пищевареніемъ. Хорошо растворимый и очень вкусный напитокъ. *Жестянка 1 р. 25 к.*

Камфора Рубини. Средство противъ разстройства желудка, холерины и холеры. На пріемъ 2 капли на кусокъ сахара, нѣсколько пріемовъ черезъ 15—20 минутъ, въ бурныхъ же случаяхъ черезъ 5 минутъ. Камфора Рубини въ лепешкахъ. На пріемъ по 1 лепешкѣ. *Въ капляхъ флаконъ 25 к., 30 к. и 40 к. Въ лепешкахъ банка 30 к. и 50 к.*

Кофе гомеопатическій. Очень пріятный и питательный напитокъ. Нервнымъ больнымъ и дѣтямъ вполнѣ замѣняетъ обыкновенный кофе (безъ цикорія). *1 фунтъ 35 к.*

Леденцы отъ кашля. Противъ хроническаго кашля и катарральнаго состоянія бронховъ. Хорошо отдѣляющее мокроту. *Коробка 25 к.*

Лепешки отъ глистовъ. Для взрослаго по 2 лепешки на пріемъ утромъ и вечеромъ. Дѣтямъ до 5 лѣтъ по 1 лепешкѣ утромъ и вечеромъ, а отъ 5 до 10 лѣтъ 3 лепешки въ день. *Коробка 50 к.*

Облатки для пріема лѣкарствъ. *Коробка 20 к.*

Облатки для пріема лѣкарствъ животнымъ. *Коробка 20 к.*

Панна. Средство отъ ленточнаго глиста. *2 р. 50 к.* Указаніе пріема стр. 64 (глисты).

Порошокъ отъ зоба. Принимать 3—4 раза въ день по костяной ложечкѣ. *40 к.*

Ц Ѣ Н Ы

наиболѣе употребительнымъ наружнымъ средствамъ.

Наименованіе лѣкарственныхъ веществъ.	2 драхмы.		1/2 унца.		1 унцъ.		2 унца.		3 унца.		4 унца.		1/2 фунта.		1 фунтъ.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
Абротанумъ эсс.	—	—	—	—	—	40	—	75	1	10	1	45	2	—	3	50
Аконитъ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Аконитинъ спиртъ . . .	—	—	—	35	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
Алое оподельд.	—	—	—	банка					—	50	—	—	—	—	—	—
Анемонъ	фл.	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анемонъ камф.	фл.	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аписъ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
„ масло	—	15	—	25	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
„ помада	—	—	банка		—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ спиртъ для волосъ	—	—	—	—	—	—	фл.	50	—	—	—	—	—	—	—	—
Арника тинкт.	—	—	—	15	—	20	—	35	—	50	—	65	—	80	1	50
„ вата	—	—	—	20	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
„ глицер.	—	—	—	—	—	25	—	40	—	50	—	60	—	85	1	40
„ коллод.	—	—	—	—	фл.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
„ масло	—	—	—	20	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ масло для вол. .	—	—	—	—	фл.	35	фл.	50	фл.	75	—	—	—	—	—	—
„ мыло	—	кусокъ			—	20	дюжина						2	—	—	—
„ мыло глиц. . . .	—	кусокъ			—	25	дюжина						2	50	—	—
„ оподельд.	—	—	—	—	—	—	банка		—	50	—	—	—	—	—	—
„ пластырь . . .	—	двойной листокъ							—	20	дюж.		2	—		
„ помада	—	помада			—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ спиртъ для вол.	—	—	—	—	—	—	фл.	50	—	—	—	—	—	—	—	—
Белладонна мазь . . .	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
„ масло . . .	—	—	—	20	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ оподельдокъ	—	—	—	—	—	—	банка		—	50	—	—	—	—	—	—
„ свѣчи . . .	—	дюжина					—	75	—	—	—	—	—	—	—	—
Беллисъ перен. есс. . .	—	—	—	35	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
Бріонія тинкт.	—	—	—	15	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
„ вата	—	—	—	20	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
„ масло	—	—	—	20	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ оподельд. . . .	—	—	—	—	банка		40	—	50	—	—	—	—	—	—	—
Вазелинъ ам. бѣл. . . .	—	—	—	—	—	15	—	30	—	45	—	60	—	75	1	25
„ „ желт. . .	—	—	—	—	—	10	—	20	—	30	—	40	—	50	—	90
Вербаскумъ эссен. . . .	—	—	—	35	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
„ мазь . . .	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Гамамелисъ тинкт. . . .	—	—	—	15	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
„ вата . . .	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	5	1	50	2	50
„ кремъ желе.	1	туба			—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Наименованіе лѣкарственныхъ веществъ.	2 драхмы.		½ унца.		1 унцъ.		2 унца.		3 унца.		4 унца.		½ фунта.		1 фунтъ.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
„ мазь . . .	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
„ мыло . . .	1 кусокъ		—	30	дюжина								3	—	—	—
„ свѣчи . . .	1 дюжина						—	75	—	—	—	—	—	—	—	—
„ экстрактъ .	—	—	—	40	—	50	—	95	1	40	1	85	2	50	4	50
Гвако оподельдокъ . .	—	банка					—	—	—	50	—	—	—	—	—	—
Геліантусъ	—	—	—	15	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
Гельземинъ мазь . . .	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Гидрастисъ эсс. . . .	—	—	—	40	—	65	1	25	1	85	2	45	3	25	6	—
„ глицер. . .	—	—	—	20	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ мазь . . .	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
„ свѣчи . . .	1 дюжина								—	75	—	—	—	—	—	—
Гиперикумъ тинкт. . .	—	—	—	20	—	30	—	55	—	80	1	5	1	50	2	50
Графитъ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
Губная помада	пеналъ				—	10	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Евфразія эссенц.	—	20	—	30	—	40	—	75	1	10	1	45	2	—	3	50
Зубная вата	—	Коробка							—	30	—	—	—	—	—	—
Зубныя капли (синія). .	—	стклянка							—	25	—	—	—	—	—	—
„ д-ра Геника	—	стклянка							—	25	—	—	—	—	—	—
Зубныя капли Плантаго	стакл.		—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Зубной порошокъ д-ра Бразоля	½ коробки		—	30	—	—	½ коробка						60	—	—	—
Зубной порош. Стафизагрія	—	коробка			—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Зубной элексиръ Календула	½ фл.		—	30	1/1 фл.		—	—	—	60	—	—	—	—	—	—
Зубной элексиръ Стафизагрія	½ фл.		—	50	1/1 фл.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Зубная паста	—	1 тубочка					—	30	—	—	—	—	—	—	—	—
Зубное полосканіе Лактицинъ	½ фл.		—	50	½ фл.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Зубное полосканіе Хинолинъ	1 фл.		—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ирисъ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Какао мазь	—	банка			—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ свѣчи	—	1 дюжина					—	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Календула тинкт. . . .	—	—	—	15	—	20	—	40	—	60	—	80	1	—	2	—
„ вата	—	—	—	20	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
„ глицеринъ .	—	—	—	15	—	25	—	40	—	50	—	60	—	85	1	40
„ коллодіумъ .	—	—	1	фл.	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
„ масло . . .	—	—	—	20	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ мыло	—	кусокъ			—	25	—	1 дюжина			—	—	2	50	—	—
„ пластырь . .	—	двойной листокъ					—	20	1 дюж.						2	—
„ свѣчи . . .	—	1 дюжина					—	75	—	—	—	—	—	—	—	—
Камфора тинкт. (спиртъ)	—	—	—	20	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
Кантарисъ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
„ коллодіумъ	—	—	1	фл.	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капсицинъ	—	—	1	фл.	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Наименованіе лѣкарственныхъ веществъ.	2 драхмы.		½ унца.		1 унцъ.		2 унца.		3 унца.		4 унца.		½ фунта.		1 фунтъ.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
Каустикумъ тинкт.	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
Квиляйя	—	—	—	—	—	25	—	50	—	75	—	—	—	—	—	—
Кольдъ Кремъ	—	1 тубочка					—	20	—	30	—	—	—	—	—	—
Кондуранго	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	5	1	50	2	50
Коніумъ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Ледумъ тинкт.	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
„ оподельдокъ	—	—	банка							50	—	—	—	—	—	—
„ пластырь	двойн. листочекъ						20		1 дюжина				2	—	—	—
Ликоподіумъ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Мазь отъ мозолей	баночка	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ насморка	1 тубочка		—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мыло отъ веснушекъ	кусокъ		—	30	1 дюжина						—	—	3	—	—	—
„ „ перхоти	кусокъ		—	30	1 дюжина						—	—	3	—	—	—
Озоногенъ (жидкость для очищенія воздуха)	½	фл.	—	30	—	—	1/1	фл.	—	60	—	—	—	—	—	—
Пинусъ эссенц.	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
Порошокъ отъ носов. полипа	1 стклянка						—	40	—	—	—	—	—	—	—	—
Русъ тинктура	—	—	—	—	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
„ масло	—	—	—	20	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ оподельдокъ	—	банка					—	40	—	50	—	—	—	—	—	—
Рута эссенц.	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
Силиціевая вода	—	—	—	—	—	10	—	15	—	20	—	25	—	35	—	60
Симфитумъ тинкт.	—	—	—	—	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
Спиртъ Лори	—	флаконъ					—	50	—	—	—	—	—	—	—	—
Спиртъ Штендера	—	—	—	—	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
Спонгія тинкт.	—	—	—	—	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
„ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Стафизагрія тинкт.	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
Стеллярія эссенц.	—	—	—	—	—	30	—	55	—	80	1	05	1	50	2	50
Сульфуръ (спиртъ)	—	—	—	—	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
Теукріумъ эссенц.	—	—	—	—	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
„ глицеринъ	—	—	—	—	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
Туя тинктура	—	—	—	—	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
„ глицеринъ	—	—	—	—	—	25	—	40	—	50	—	60	—	85	2	40
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
Туялинъ (жидкость отъ мозолей)	флаконъ				—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Уртика	—	—	—	—	—	25	—	45	—	65	—	85	1	25	2	—
„ мазь	—	—	—	—	—	35	—	50	—	60	—	70	—	90	1	50
Фитолакка эссенц.	—	—	—	—	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
„ глицеринъ	—	—	—	—	—	30	—	45	—	55	—	65	—	90	1	50
„ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
Эскулюсъ эссенц.	—	—	—	—	—	45	—	85	1	25	1	65	2	25	3	75
„ мазь	—	—	—	—	—	40	—	55	—	65	—	75	1	—	1	70
„ свѣчи	1 дюжина						—	75	—	—	—	—	—	—	—	—

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ

ПАРИЖЪ

1904 г.

Международная Гигіеническая Выставка.



ПРИСУЖДЕННЫЙ

С.-П.-Б. Благотворительному Обществу

ВРАЧЕЙ ГОМЕОПАТОВЪ

за высокое качество гомеопатическихъ препаратовъ, эссенцій, тинктуръ и пр. и за изящно и цѣлесообразно составленныя домашнія, дорожныя и походныя аптечки.



Внутренній видъ аптеки Спб. Благотворительнаго Общества Врачей Гомеопатовъ.
Невскій просп., д. № 82.

СПОСОБЪ УПОТРЕБЛЕНІЯ

наружныхъ средствъ.

Абротанумъ (Abrotanum). Смѣшивается пополамъ съ холодной водой для втиранія и примачиванія отъ ознобленій.

Аконитъ-мазь—отъ невралгіи, ишіазиса, боли сѣдалищнаго нерва и воспалительнаго ревматизма.

Аконитинъ-спиртъ. Употребляется какъ отъ сильныхъ простудныхъ ревматическихъ болей, такъ и какъ втираніе въ щеки при зубныхъ боляхъ послѣ простуды и при флюсѣ.

Алое-оподельдокъ. Втираніе при боляхъ въ груди и при кашлѣ.

Анемонъ. Противъ насморка. Растереть между ладонями 10—15 капель и нюхать, повторяя это нѣсколько разъ въ день. Можно съ этою цѣлью смочить кончикъ носового платка и нюхать отъ времени до времени.

Анемонъ-камфоратумъ. Примѣненіе, какъ Анемонъ.

Апись-мазь—отъ воспаленій и опухолей рожистаго свойства, а также при зубной боли, флюсѣ и др. воспалительныхъ опухоляхъ.

Апись-масло. Противъ рожи, водяночныхъ опухолей, опухшихъ железъ, а также для втиранія въ опухоли и болящія мѣста при дифтеритѣ.

Апись-помада. Для укрѣпленія волосъ: втирать въ кожу и мазать волосы не болѣе 2 разъ въ недѣлю.

Апись-спиртъ. Для укрѣпленія корней волосъ: втирать ежедневно, на ночь, въ головную кожу, посредствомъ твердой щеточки.

Арника (Arnica). 1 часть тинктуры на 5 частей слабаго спирта—*какъ втираніе* отъ ущемленій безъ поврежденія кожи; для втиранія въ мускулы, болящіе отъ чрезмѣрнаго напряженія и усталости. *Какъ примочка*—при ущемленіяхъ съ поврежденіемъ кожи. при пузыряхъ на ногахъ, при болящихъ мозоляхъ, растрескавшихся грудныхъ соскахъ и при пролежняхъ: одна часть тинктуры на 12 частей воды.

Арника вата. Употребляется для перевязки порѣзанныхъ ранъ при кровотеченіяхъ, а также при опухоли открытыхъ ранъ—для предохраненія отъ доступа воздуха и сохраненія ихъ въ теплѣ.

Арника глицеринъ. Растворъ одной части въ 10 частяхъ воды, употребляется при кровоизліяніяхъ подъ кожею и порѣзахъ, въ видѣ примочки. Имѣетъ то преимущество предъ тинктурою, что компрессы не высыхаютъ, а остаются всегда влажными.

Арника коллодій. Для соединенія краевъ небольшихъ порѣзовъ и скораго ихъ заживанія.

Арника мазь—отъ вывиховъ, пораненій и ушибовъ.

Арника масло. Какъ втираніе при разныхъ механическихъ поврежденіяхъ, особливо при ушибахъ съ подкожнымъ кровоизліяніемъ.

Арника масло. Для волосъ: размягчаетъ кожу и устраняетъ сѣченіе волосъ, что часто бываетъ причиною ихъ выпаденія. Смазываютъ волосы 2—3 раза въ недѣлю.

Арника мыло. Очень полезно противъ трещинъ на лицѣ, рукахъ и шероховатости кожи вообще.

Арника глицериновое мыло. Туалетное, *прозрачное*—приготовленное изъ чистаго кокосоваго масла и арника глицерина, почему обладаетъ освѣжающими свойствами и дѣлаетъ кожу мягкой и нѣжной.

Арника оподельдокъ. Употребляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ масло.

Арника пластырь. Для заклеиванія разрѣзанныхъ и разрывныхъ ранъ и всякихъ наружныхъ поврежденій кожи. Обладаетъ большими заживляющими свойствами.

Арника помада. Употребляется такъ же и съ тою же цѣлью, какъ и Арника-масло, для волосъ.

Арника спиртъ. Для сохраненія и укрѣпленія корней волосъ: втирать мягкой щеточкой въ кожу головы.

Белладонна мазь—отъ золотушныхъ и рожистыхъ страданій, а также противъ простуды и опухолей горла.

Белладонна масло. Употребляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ мазь.

Белладонна оподельдокъ. Втираніе при невралгіи.

Белладонна свѣчи. При воспаленіи заднепроходной кишки.

Беллисъ Перениисъ (Bellis-perennis). Отъ родимыхъ пятнышекъ: смачивать кисточкой 1—2 раза въ день. Употребляется для лѣченія ранъ и ушибовъ у лицъ, не переносящихъ Арники, и полезна при воспалительныхъ опухоляхъ и эксудатахъ послѣ ушибовъ и

поврежденій, особливо женскихъ грудей. Примочка: 1 часть тинктуры на 5—10 частей воды.

Бріонія (Bryonia). 1 : 10 отъ боли и колотья въ боку и рожистаго воспаленія суставовъ; противъ сочленовнаго ревматизма, какъ втираніе со спиртомъ (1 : 5) или въ видѣ оподельдока.

Бріонія вата. Для прикладыванія съ Бріонія мазью.

Бріонія мазь—отъ ревматическихъ страданій, болей и колотья въ боку.

Бріонія масло. Втираніе при ревматическихъ и другихъ боляхъ, облегчающихся въ покоѣ и ухудшающихся отъ движенія.

Бріонія оподельдокъ. Втираніе при ревматизмѣ и ломотѣ, при тугости суставовъ и опухоли колѣнъ, при боли въ груди.

Вазелинъ американскій. Бѣлый и желтый. Не имѣющій свойства горкнуть. Примѣняется, какъ смягчающее средство и для приготовленія мазей.

Вербаскумъ (Verbascum). Тинктура—для втиранія отъ лицевой боли.

Вербаскумъ мазь—отъ невралгическихъ лицевыхъ болей.

Гамамелисъ (Hamamelis). Одна часть тинктуры съ десятью частями тепловатой воды—какъ примочка для останавливанія геморроидальныхъ кровотеченій; отъ кровоточивости десенъ, растяженія венъ и кровотеченія изъ носа. Также дается внутрь во 2—3 разведеніи, отъ 3 до 5 капель черезъ 1—2 часа—при кровотеченіи изъ носа, при геморроидальныхъ и маточныхъ кровотеченіяхъ, а также при мочеиспусканіи съ кровью.

Гамамелисъ вата. Противъ кровотеченій изъ носа: вкладывать кусочки, въ видѣ тампона, въ ноздри.

Гамамелисъ кремъ-желе. Для нѣжности и бѣлизны кожи.

Гамамелисъ мазь—отъ геморроидальныхъ болей въ заднемъ проходѣ.

Гамамелисъ мыло. Придаетъ кожѣ нѣжность. Употребляется противъ красноты и прыщей, какъ ежедневное умываніе на ночь.

Гамамелисъ свѣчи. Противъ геморроидальныхъ шишекъ съ кровотеченіемъ. Вставлять утромъ и на ночь по одной.

Гамамелисъ экстрактъ (Extract. of Hamamelis). Разбавленный пополамъ съ водою, въ видѣ примочки при ожогахъ, ущемленіяхъ, вывихахъ, ужаленіи насѣкомыми, болящихъ грудныхъ соскахъ и и варикозныхъ ранахъ на ногахъ.

Гвако ополдельдокъ. При боляхъ въ крестцѣ.

Геліантусъ (Helianthus). Употребляется при боляхъ отъ ущемленія; одна часть тинктуры на пять частей воды.

Гельземинумъ мазь—отъ лицевыхъ болей и воспалительныхъ чирьевъ.

Гидрастисъ (Hydrastis cannad.). Одна часть тинктуры на шесть частей воды—отъ раковидныхъ язвъ, какъ примочка. Одна часть на 50 частей отварной воды—для вспрыскиванія отъ перелоя.

Гидрастисъ-глицеринъ. При оспѣ смазывать сыпь на лицѣ, рукахъ и шеѣ, какъ предохранительное противъ образованія рябинъ.

Гидрастисъ-мазь—отъ опухолей и ранъ скиррознаго (раковаго) свойства.

Гидрастисъ-свѣчи. Противъ запоровъ. Вставлять утромъ и на ночь по одной.

Гиперикумъ (Hypericum). Одна часть тинктуры на пять частей тепловатой воды: для примочки на колотыя и разрывныя раны.

Графитъ-мазь—отъ болящихъ сосковъ и лишаевъ.

Губная помада. Для смягченія губъ.

Евфразія (Euphrasia). 3—5 капель на столовую ложку тепловатой воды, для примочки отъ напряженія и утомленія глазъ, а также отъ заслизненія ихъ.

Зубная вата. Отрѣзать кусочекъ и положить въ дупло гнилого болящаго зуба.

Зубныя капли Геника. Употребленіе, какъ синія зубныя капли.

Зубныя капли синія. Смочить кусочекъ ваты и положить на больной зубъ и въ ухо съ болящей стороны; можно давать и внутрь—5 капель на рюмочку воды,—принимать черезъ 5—10 минутъ по чайной ложечкѣ.

Зубныя капли Плантаго (Plantago). Смочить кусочекъ ваты и положить на болящій зубъ. Кромѣ того, взять 5—10 капель на рюмку и выпивать глотками въ продолженіе $^1/_2$ часа.

Зубная паста—„Стафизагрія“. Трубочку легко нажать и положить небольшое количество на зубную влажную щетку.

Зубное полосканіе „Лактицинъ“. Одну чайную ложку на $^1/_2$ стакана воды.

Зубное полосканіе „Хинолинъ“. Чайную ложку на стаканъ тепловатой воды.

Зубные порошки. Составлены изъ индифферентныхъ веществъ, не противодѣйствуютъ гомеопатическимъ лѣкарствамъ, прекрасно чистятъ зубы и укрѣпляютъ десны.

Зубной эликсиръ „Календула". Какъ укрѣпляющее средство, при ослабленіи десенъ и дезинфецирующее полость рта. 1/2 чайной ложки на стаканъ воды.

Зубной эликсиръ „Стафизагрія". 10—15 капель на стаканъ воды—для полосканія рта. Очень пріятенъ и освѣжаетъ полость рта.

Ирисъ мазь—отъ паршей на головѣ.

Какао мазь. Весьма полезна для перевязки ранъ, для смазыванія тѣла при скарлатинѣ, кори и оспѣ, когда кожа шелушится. Освѣжаетъ кожу и уменьшаетъ зудъ.

Календула. (Calendula). Одна часть на 10 частей тепловатой воды—для компрессовъ на глубокія гноящіяся раны, въ особенности огнестрѣльныя. Во многихъ случаяхъ замѣняетъ Арнику, если послѣдняя окажется недостаточно заживляющею.

Календула вата. Для прикладыванія при порѣзахъ и при накладываніи съ мазью на раны.

Календула глицеринъ. Смягчающій кожу и употребляется также при невысыхающихъ компрессахъ.

Календула коллодій. Для смазыванія порѣзовъ, предварительно обмывъ, осушивъ и сблизивъ края ихъ.

Календула мазь—при открытыхъ, разрывныхъ и застарѣлыхъ ранахъ, а также противъ ожоговъ.

Календула масло. Въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и мазь.

Календула мыло. Какъ имѣющее хорошее вліяніе на кожу и придающее мягкость.

Календула-пластырь. Примѣняется въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ и Арника пластырь.

Календула свѣчи. Вставляются при зудѣ и трещинахъ въ заднепроходной кишкѣ.

Камфора (Camphora). Спиртъ для втиранія при судорогахъ въ икрахъ. Полезно также нюхать отъ насморка. Рекомендуется при холерѣ, для втиранія въ животъ и конечности.

Кантарисъ коллодій. Для смазыванія поверхностныхъ ожоговъ кожи.

Кантарисъ мазь—отъ ознобленій, ожоговъ и пузырьчатыхъ нарывовъ всякаго рода.

Капсицинъ (Capsicin). Для втиранія при коликахъ, рѣзи въ животѣ и судорогахъ въ ногахъ.

Каустикумъ (Causticum). Брать чайную ложку на чайную чашку воды—для компрессовъ при ожогахъ съ образованіемъ пузырей.

Квиляйя.—Жидкость противъ перхоти. Смачивать волосяную кожу ежедневно на ночь и мыть голову два раза въ недѣлю.

Кольдъ кремъ. Для смягченія и бѣлизны кожи.

Кондуранго (Condurango). Въ видѣ примочки и мази для перевязки раковидныхъ язвъ; передъ примачиваніемъ рану слѣдуетъ хорошо обмывать комнатной водой.

Коніумъ мазь—для прикладыванія на раковидныя язвы и втиранія въ опухшія железы груди.

Ледумъ (Ledum). Чайную ложку тинктуры на $^1/_2$ чашки тепловатой воды или простого вина: какъ втираніе въ опухшіе вслѣдствіе ревматизма суставы.

Ледумъ мазь—отъ укусовъ и ужаленій насѣкомыми и костоѣда.

Ледумъ оподельдокъ. Втираніе при подагрическихъ и ревматическихъ боляхъ въ малыхъ суставахъ рукъ и ногъ.

Ледумъ пластырь. Налѣплять на укушенныя насѣкомыми мѣста, для предохраненія отъ образованія пузырей и опухолей.

Ликоподіумъ мазь—отъ застарѣлыхъ, не болящихъ ранъ.

Мазь отъ мозолей. Уничтожаетъ довольно быстро мозоли (подробное описаніе при каждой коробкѣ).

Мазь отъ насморка. Смазывать внутри носа нѣсколько разъ въ день (можно употреблять въ видѣ тампоновъ).

Мыло отъ веснушекъ, загара и желтизны лица. Умывать лицо утромъ и на ночь. На ночь—оставляя на лицѣ мыльную пѣну.

Мыло отъ перхоти. Мыть голову на ночь, 1—2 раза въ недѣлю.

Мыло отъ угрей и прыщей. Слѣдуетъ на ночь мыться тепловатой водой.

Озоногенъ. Прекрасная жидкость для очищенія воздуха. Способъ употребленія на каждой стклянкѣ.

Пинусъ (Pinus). Одну часть тинктуры смѣшиваютъ съ тремя частями воды и употребляютъ для втиранія въ искривленныя вслѣдствіе англійской болѣзни конечности, утромъ и вечеромъ.

Порошокъ отъ носового полипа. Втягивать въ носъ 3—4 раза въ день по щепоткѣ, если носъ не заложенъ; въ противномъ

случаѣ дѣлать вдуванія изъ гусинаго пера или посредствомъ носового пульверизатора.

Русъ (Rhus). Одна часть тинктуры на пять частей вина или воды; для втиранія или примачиванія въ видѣ компрессовъ на суставы послѣ вправленія вывиховъ. Какъ примочку (1 часть тинктуры на 6 частей воды), отъ зуда кожи.

Русъ мазь—отъ ревматизма, пузырьчатыхъ нарывовъ и застарѣлыхъ ознобленій.

Русъ масло. Втираніе при растяженіи связокъ и при ревматическихъ и другихъ боляхъ, ухудшающихся въ покоѣ и облегчающихся отъ движенія.

Русъ ополъдокъ. Употребляется, какъ втираніе, при острыхъ ревматическихъ боляхъ въ мышцахъ и связкахъ, особливо послѣ промоченія или лежанія на сырой землѣ.

Рута (Ruta). 20 капель тинктуры на чайную ложку воды—для смачиванія холщевыхъ подушекъ, которыя подкладываются къ пролежнямъ; 5 капель тинктуры на рюмку воды—для глазныхъ ваннъ, при воспаленіи глазъ отъ напряженія.

Силиціевая вода (Aq. Silicata). Употребляется для промыванія гноевидныхъ ранъ; для полосканія рта при опухоли десенъ; для промыванія носа при страданіи полипомъ: смѣшивать пополамъ съ водою.

Симфитумъ (Symphitum). Употребляется въ видѣ примочки и какъ втираніе при переломахъ костей; одна часть тинктуры на пять частей воды или спирта—для компрессовъ или для втиранія.

Спиртъ Лори. Втираніе при ревматизмѣ и невралгіи.

Спиртъ Штендера. Втираніе при боляхъ въ поясницѣ и ломотѣ во всемъ тѣлѣ.

Спонгіа (Spongia). Втирать въ опухоли зоба (1 часть тинктуры на 5 частей спирта).

Спонгіа мазь—отъ зоба и опухолей шейныхъ железъ.

Стафизагріа (Staphysagria). 10 капель тинктуры на рюмку воды и дѣлать компрессы на глубокія раны отъ порѣза стекломъ или ножемъ, и отъ подкожныхъ кровоизліяній отъ ущемленія или удара о тупыя орудія. Такъ же, какъ полосканіе для зубовъ—20 капель на ½ стакана воды.

Стеллярія эссенція. Какъ втираніе при ревматическихъ болѣхъ, опухоляхъ и малоподвижности суставовъ. При гноящихся ранахъ, въ видѣ примочки 60 капель на небольшой стаканъ воды.

Сульфуръ спиртъ. Противъ лишаевъ, хронической эритемы кожи. Употребляется, какъ примочка.

Теукріумъ. Отъ хроническаго катарра зѣва и глотки—какъ полосканіе: брать 10 капель на 1/2 стакана воды. Отъ полипа въ носу—смазывать чистою тинктурою посредствомъ кисточки. Отъ аскаридовъ у дѣтей: растворомъ 1 чайной ложки тинктуры въ 1/2 стаканѣ воды обмывать пораженную аскаридами часть (задній проходъ) и кромѣ того дѣлать клистиры изъ этого же раствора.

Теукріумъ глицеринъ—употребляется съ этою же цѣлью и его берутъ для полосканія—столовую ложку на стаканъ воды, а снаружи употребл. въ неразведенномъ видѣ.

Туя (Thuia). Отъ бородавокъ на пальцахъ и отъ подсѣда у лошадей. Бородавки смачивать тинктурой 2—3 раза въ день. Для подсѣда тинктуру смѣшать пополамъ съ виномъ или водой и примачивать.

Туя глицеринъ. Для смазыванія кисточкою лица и рукъ при оспѣ, во избѣжаніе образованія рябинъ.

Туя мазь—отъ застарѣлыхъ болячекъ, рака и сухихъ лишаевъ.

Туялинъ. Жидкость отъ мозолей. При каждой коробкѣ описаніе.

Уртика (Urtica). Употребляется неразведенная тинктура при ожогахъ безъ пузырей: смачивать холщевыя ветоши и прикладывать на обожженныя мѣста.

Уртика мазь—отъ крапивной сыпи, ожоговъ и ошпареній, когда сойдетъ кожа.

Фитолакка (Phytolacca.)—при воспаленіяхъ горла, для полосканія 20—40 капель на 1/2 стакана воды.

Фитолакка глицеринъ. Для смазыванія горла кисточкой при горловыхъ болѣзняхъ.

Фитолакка мазь—отъ накожныхъ сыпей, поясовидной рожи и чесотки.

Эскулюсъ (Aesculus hip). 1 ч. на 10 частей комнатной воды для обтиранія смоченною этимъ растворомъ губкою сильно воспаленныхъ, со жгучими болями геморроидальныхъ шишекъ.

Эскулюсъ мазь—отъ сильно дергающихъ геморроидальныхъ болей въ заднемъ проходѣ.

Эскулюсъ свѣчи. При геморроѣ и трещинахъ задняго прохода съ сильнымъ жженіемъ.

Перевязочные матеріалы и предметы для ухода за больными.

Батистъ Мазетига двухсторонній, хорошо сохраняется и моется, примѣняется для согрѣвающихъ компрессовъ: *1 арш.—1 р. 50 к.*. *1/2 арш.—75 к.*, *1/4 арш.—40 к.*

Бинты „Идеалъ“, сильно растягивающіеся только въ длину, изъ особенно приготовленной ткани; прекрасно ложатся, не дѣлая складокъ, употребляются для всякихъ повязокъ и при растяженіи венъ. Куски по 4 1/2 арш. при наложеніи повязки растягиваются до 7 аршинъ.

Ширина	4	— 6	— 8	—10	—12	— 16 сант.
	30 к.	—45 к.	—60 к.	—75 к.	—90 к.	—1 р. 20 к.

Бинты марлевые мягкіе по 10 арш. длины, каждый бинтъ находится въ коробкѣ.

Ширина	1	— 1 1/2	— 2	— 3	— 4	вершк.
	10 к.	—15 к.	—20 к.	—25 к.	—35 к.	

Бумага для компрессовъ . . . . . *пакетъ 5 к.*

Булавки американскія, безопасныя, бѣлыя и черныя.

Дюжина: мал.—20 к., средн.—25 к., больш.—30 к.

Вата Гигроскопическая „Суперіоръ“

въ бинтахъ:

1/4 фун.—25 к., *1/2 фун.—50 к.*, *1 фун.—1 р.*

въ коробкахъ:

5 к.,—10 к.,—15 к.,—20 к.

Глазныя ванны изъ толстаго хрустальнаго стекла . *Штука 35 к.*

Глазные зонтики, зеленые и синіе, для страдающихъ глазами:

бумажные . . . . . *штука 45 к.*

шелковые . . . . . „ *60 к.*

Грѣлки японскія, очень удобны и примѣнимы, гдѣ необходимо продолжительное и равномѣрное согрѣваніе, нагрѣваются въ продолженіе 3—4 часовъ съ помощью патрона изъ японской

тлѣющей массы, не издающей ни копоти, ни запаха, вполнѣ безопасны.

Грѣлки съ 20 патронами . . . . . 1 р. 50 к.
10 шт. патроновъ . . . . . — 45 к.

Зубныя гигіеническія щетки отличаются своей прочностью. Величина щетокъ обозначена буквами: *А=большой размѣръ, В=средній размѣръ, С=меньшій размѣръ, Д=дѣтская.*

Степень твердости обозначена нулями:

О самая жесткая, ОО средняя, ООО мягкая, А=75 к., В и С со свѣтлой ручкой 60 к., В и С съ черной ручкой 70 к., Д=50 к., съ аллюминіевой ручкой 1 р. 10 к.

Капельницы глазныя (пипетки)
въ коробкѣ . . . . . *штука 10 к.*

Кисточки волосяныя . . . . . *штука 5—10 к.*

Кисточки горловыя (на посеребренной проволокѣ) *штука 15 и 20 к.*

Клеенка для компресса (см. Батистъ Мозетига).

Компрессы согрѣвательные готовые:

а) *Горловые* . . . . . 60 к.
б) *Брюшные для дѣтей* . . . . . 2 р. —
в) „ *для взрослыхъ* . . . . . 2 р. 75 к.

Кружка Эсмарха, стеклянная для клистировъ и маточныхъ вспрыскиваній безъ приборовъ

емкостью *въ 1/2 литра* . . . . . 35 к.
„ „ *1* „ . . . . . 40 к.
„ „ *1 1/2* „ . . . . . 50 к.
„ „ *2* „ . . . . . 80 к.

Полные приборы для кружекъ Эсмарха, состоящіе изъ гуттаперч. крана, двухъ наконечниковъ и двухъ арш. красной трубки. . . . . 1 р. 50 к.

Марля гигроскопическая въ пакетахъ отъ 1 арш., *1 арш. 10 к.*

Мозольныя кольца высшій сортъ круглыя и овальныя:

а) *миніатюрныя 1 дюж.* . . . . . *10 к.*
б) *малыя 1 „* . . . . . *15 к.*
в) *среднія 1/2 „* . . . . . *15 к.*
г) *большія 1/2 „* . . . . . *20 к.*

Молоко-отсосы изъ красной резины:

I сортъ съ резервуаромъ . . . . . *штука 90 к.*

безъ резервуара . . . . . „ *80 к.*

Накладки на женскіе грудные соски при трещинахъ *штука 15 к.*

Наконечники гуттаперчевые лучшіе *для клистировъ 10 к., маточные 25 к., кранъ 20 к.*

Носовые полоскатели *штука* . . . . . *25 к.*

Пластырь липкій, резиновый американскій:

въ катушкахъ по 13 арш. длины и шир. 1/4 вер. *1 р.*

„ „ „ „ „ „ 1/2 „ *1 р. 50 к.*

„ „ „ „ „ „ 3/4 „ *2 р. — к.*

„ „ „ „ „ „ 1 1/8 „ *2 р. 50 к.*

„ „ „ „ „ „ 1 1/2 „ *2 р. 85 к.*

Повязки на глазъ:

а) выпуклая твердая обтянутая шелкомъ съ резиновыми завязками *штука* . . . . . *30 к.*

б) изъ ластика на кашемировой подкладкѣ съ резиновыми завязками *штука* . . . . . *35 к.*

Повязка на щеку *штука* . . . . . *40 к.*

Пузыри для льда (мѣшки изъ клѣтчатой матеріи съ металлическимъ запоромъ):

длины	7 1/2 — 9 —	— 11 *дюймовъ*
	75 к. — 1 р. 00	— 1 р. 40 к.

Пульверизаторы для распыливанія лѣкарствъ и для очищенія воздуха, состоятъ изъ флакона, распылителя и съ двумя балонами, отъ 1 р. 40 к до 3 р.

Пульверизаторы паровые. (Ингаляторы) для вдыханія паровъ лѣкарства страдающими горловыми болѣзнями; на подставкѣ съ патентованнымъ клапаномъ и пульверизаторомъ угольникомъ и ручкой.

Изъ бѣлой жести . . . . . *2 р. — к.*

„ *желтой* „ . . . . . *2 р. 50 к.*

никкелированные . . . . . *3 р. — к.*

Респираторы съ резиновыми завязками, носить при страданіяхъ дыхательнаго горла: малые, средніе и большіе *отъ 40 к. до 80 к.*

съ серебряной рѣшеткой . . . . . *1 р. 25 к.*

Рожки стеклянные для вскармливанія дѣтей, плоскіе и круглые *штука . . . . . 10 к.*

Соски изъ черной толстой резины, мягкіе, для кормленія дѣтей, *мал. 5 к.—средн. 6 к.—больш. 8 к.*

Спринцовки резиновыя красныя *I сорта* съ костянымъ наконечникомъ:

въ 1/2	— 1	— 1 1/2	— 2	— 3	— 6	— 9	— 12 унц.
35 к.	45 к.	55 к.	70 к.	90 к.	1 р. 50 к.	2 р.	2 р. 50 к.

тоже съ мягкимъ наконечникомъ

въ 1/4	—1/2	—3/4	— 1	— 1 1/2	— 2
15 к.	20 к.	25 к.	35 к.	50 к.	60 к.

Спринцовки клистирныя и маточныя съ 2 рукавами больш. изъ красной резины *I сорта 1 р. 75 к.*

Спринцовки стеклянныя съ резиновыми наконечниками проф. Тарновскаго

штука 30 к. со стеклян. поршнемъ,
„ *60 к.* съ гуттаперч. оправой.

Суспензоріи *отъ 30 к. до 1 р. 75 к.* и дороже, смотря по отдѣлкѣ.

Термометры *максимальные и минутные отъ 75 к. до 2 р. 50 к.*

Употребленіе термометра. Для измѣренія температуры термометръ вставляется больному въ подмышечную ямку такъ, чтобы стеклянный шарикъ, содержащій ртуть, былъ плотно зажатъ рукою; продержавъ такимъ образомъ 10—15 минутъ, его вынимаютъ и записываютъ число градусовъ и десятыхъ долей по показанію столбика ртути. Передъ употребленіемъ термометра, его слѣдуетъ хорошенько встряхнуть (сильнымъ взмахомъ руки сверху внизъ) для того, чтобы вся ртуть опять понизилась до своего основанія.

Такіе же термометры **минутные**—держать 3—4 минуты. Очень удобны, въ особенности для измѣренія температуры у дѣтей.

Термометры ветеринарные для животн. штука 1 р. 50 к.

Фланель для согрѣвающихъ компрессовъ 1 арш. 1 р., 1/2 арш. 50 к., 1/4 арш. 25 к.

Неуказанные здѣсь въ спискѣ предметы для перевязки, а также разные медицинскіе инструменты пріобрѣтаются по заказу по умѣреннымъ цѣнамъ.

Бюстики д-ра С. Ганемана, бѣлый и бронзирован. . 1 р. — к.

Портретъ д-ра С. Ганемана . . . . . — р. 50 к.

Ц Ѣ Н Ы

разнымъ принадлежностямъ, служащимъ для приготовленія гомеопатическихъ лѣкарствъ и ихъ отпуска.

Алкоголь эфиловый, самый чистый, приготовленный для разведенія гомеопатическихъ лѣкарствъ (отпускается только по рецептамъ врачей):

за 1 унцъ . . . . . — „ 20 к.
„ 1 фунтъ . . . . . 1 р. 50 „

Пилюли и крупинки:

за 1 унцъ . . . . . — р. 20 к.
„ 1 фунтъ . . . . . 2 „ — „

Молочный сахаръ, самый чистый, въ порошкѣ:

за 1 унцъ . . . . . — р. 20 к.
„ 1 фунтъ . . . . . 2 „ — „

Капельникъ стеклянный для отсчитыванія капель
въ коробкѣ за 1 штуку . . . . . — „ 10 „
Тоже . . . . . за дюжину 1 „ — „

Ложки фарфоровыя чайныя . . . . . — „ 25 „
„ „ столовыя . . . . . — „ 55 „
„ хрустальныя чайныя по . . . . . — „ 75 „
„ „ столовыя по . . . . . 1 „ — „

Ложечки въ 1 и 2 грана для пріема лѣкарства
въ порошкѣ по . . . . . — „ 10 „
„ для пріема лѣкарства въ порошкѣ животнымъ . . . . . — „ 15 „
„ для крупинокъ по . . . . . — „ 10 „

Мѣрочка для алкоголя и воды.

Цѣна 60 к.



Цѣна 40 к.

Мѣрочки съ дѣленіемъ на чайныя, дессертныя и столовыя ложки.



Цѣна 45 к



Цѣна 60 к.

На 2 ст. ложки шлифован. 40 к

Мѣрочка въ видѣ бутылочки, изъ толстаго хрустальнаго стекла, съ дѣленіями на чайныя, дессертныя и столовыя ложки: служитъ для заготовленія лѣкарства съ водою на нѣсколько пріемовъ. Стеклянная пробка образуетъ рюмку для пріема лѣкарства чайными или столовыми ложками . . . . . 1 р. 50 к.

Пробки разной величины по рис. № 1—4:

за 100 штукъ № 1—2 . . . . . — р. 50 к.

„ 100 „ № 3—4 . . . . . — „ 60 „



№ 4. № 3. № 2. № 1.

Стклянки **„Капельницы“**, патентованныя съ притертыми пробками, за 1 штуку:

въ 2 драхмы—бѣлаго стекла . . . . . — 20 к.

въ 1/2 унца . . . . . — 25 „

въ 1 унцъ . . . . . — 30 „

оранжеваго стекла на пять коп. дороже.

Стклянки новыя, промытыя, съ пробками, для капель за 100 штукъ . . . . . 3 р. 50 к.

Тоже, бракованныя (неровныя и частью съ отбитыми кантиками), за 100 штукъ . . . . . 2 „ — „

Стклянки новыя, промытыя съ пробками для крупинокъ, цилиндрической формы за 100 штукъ . . . . . 2 „ 50 „

Тоже, двойныя за 100 штукъ . . . . . 3 „ — „

Ступочка фарфоровая, глазированная . . . . . — „ 70 „

Ярлычки (названія лѣкарствъ) книжками, въ которыхъ каждаго названія по нѣсколько экземпляровъ, съ русскими и латинскими названіями, за 1 книжку . . . . . — „ 50 „

Порожнія ящички-аптечки, картонныя и деревянныя различной отдѣлки, а также карманные футляры и коробки для отпуска лѣкарствъ и проч. можно получать изъ аптеки Общества по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Образцы стклянокъ въ нормальную ихъ величину.



Стклянка въ 1 унцъ.



Стклянка въ ½ унціи.



Стклянка въ 2 драхмы круглая.



Сткляночка въ 1½ драхмы.



Стклянка въ 2 драхмы четырехгранная.



Сткляночка въ 1½ драхмы четырехгранная.



Двойная стклянка для крупинокъ.



Обыкновенная сткляночка для крупинокъ.



Форма банки для мазей,
вмѣстимость 1 унцъ.

Образчикъ стклянки
гомеопатическихъ лепешекъ.



Образчикъ стклянки
для отпуска камфоры
и пилюль.

ИЗДАНІЯ

С.П.Б. Благотворительнаго Общества Врачей Гомеопатовъ.

Продаются въ Аптекахъ О-ва:

1) Невскій пр., д. 82, 2) Вас. Остр., Кадетская л., д. 13.

Для ознакомленія съ Гомеопатіей.

Бразоль, Л. Е. Д-ръ мед. Публичныя лекціи: 1) О гомеопатическомъ законѣ подобія. 2) О гомеопатической фармакологіи. 3) О гомеопатическихъ дозахъ. 4) О положеніи гомеопатіи среди опытныхъ наукъ. 5) Что такое гомеопатія. Цѣна 1 р., въ перепл. 1 р. 40 к.

Бразоль, Л. Е. Д-ръ мед. Самуилъ Ганеманъ. Очеркъ его жизни и дѣятельности. Съ портретомъ Ганемана и 7 рисунками. Цѣна 50 к.

Бразоль, Л. Е. Д-ръ мед. Историческій очеркъ сооруженія надгробнаго памятника Самуилу Ганеману, основателю Гомеопатіи. Цѣна 70 к.

Зеленковъ, А. П. Д-ръ мед. Объ основномъ принципѣ лѣкарственной терапіи. Цѣна 20 к.

Ганеманъ, С. Д-ръ мед. Опытъ новаго принципа для нахожденія цѣлительныхъ свойствъ лѣкарственныхъ веществъ. Переводъ и предисловіе д-ра мед. Л. Е. Бразоль. Цѣна 40 к.

Дитманъ, В. А. Д-ръ мед. Въ защиту гомеопатіи. Цѣна 30 к.

Для лѣченія Гомеопатическими средствами.

Бразоль, Л. Е. Д-ръ мед. Арсеналъ хирургической гомеопатіи. Краткое наставленіе для лѣченія наружныхъ поврежденій. Цѣна 30 к.

Бразоль, Л. Е. Д-ръ мед. Холера и ея гомеопатическое лѣченіе. Лекція, читанная 19 Мая 1905 г. въ СПБ. Городской Думѣ въ день 150 годовщины С. Ганемана. Цѣна 20 к.

Венерическія болѣзни и ихъ лѣченіе. Цѣна 40 к

Ветеринарный лѣчебникъ. Изданіе О-ва Врачей Гомеопатовъ. Подробное руководство для распознаванія и лѣченія болѣзней у

лошадей, овецъ, свиней, собакъ, домашнихъ птицъ и рогатаго скота. Съ 84 рис. въ текстѣ. Цѣна 3 р., въ перепл. 3 р. 50 к.

Габриловичъ, Е. О. Д-ръ. Холера, ея происхожденіе, причины и лѣченіе. Цѣна 25 к.

Геморрой и его лѣченіе. Цѣна 40 к.

Домашній лѣчебникъ. Популярное руководство для распознаванія и лѣченія болѣзней. 2-ое изданіе, исправленное и дополненное, съ описаніемъ главнѣйшихъ лѣкарственныхъ средствъ съ характеристикою ихъ физіологическаго дѣйствія. Цѣна 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Дифтеритъ и его лѣченіе. Цѣна 20 к.

Коклюшъ и его лѣченіе. Цѣна 20 к.

Корь и ея лѣченіе. Цѣна 20 к.

Краткое руководство безплатно. Цѣна въ переплетѣ 25 к. (безъ пересылки).

Оспа, предупрежденіе и ея лѣченіе. Цѣна 20 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. Гомеопатія и аллопатія въ дѣлѣ лѣченія паралича. Цѣна 10 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. Гомеопатія въ дѣлѣ борьбы съ чумой. Цѣна 20 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. Календула — гомеопатическій Іодоформъ. Цѣна 20 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. Нѣкоторые случаи изъ моей десятилѣтней гомеопатической практики. Цѣна 60 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. О прививочныхъ манипуляціяхъ. Цѣна 5 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. Туберкулезъ костей и суставовъ и лѣченіе его гомеопатическими средствами. Цѣна 50 к.

Рогачевскій, А. Н. Д-ръ. Клѣточный (гомеопатическій) принципъ—законъ природы". Цѣна 10 к.

Скарлатина и ея лѣченіе. Цѣна 20 к.

Тифъ и его лѣченіе. Цѣна 25 к.

Чума и ея лѣченіе. Цѣна 20 к.

Юзъ Ричардъ. Д-ръ мед. Руководство къ лѣченію болѣзней гомеопатическими средствами. Переводъ д-ра мед. В. А. Дитмана, редакція д-ра мед. Л. Е. Бразоля. Цѣна 2 р., въ переплетѣ 2 р. 50 к.

Алфавитъ болѣзней.

	стр.		стр.
Азіатская холера	240	Бронхіальная астма	163
Альбуминурія	35	Брюшины воспаленіе	38
Ангина	80	Брюшной тифъ	39
Англійская болѣзнь	25	Бѣлая горячка	71
Апоплексическій ударъ	232	Бѣли	41
Аппетита недостатокъ	26	Бѣшенство собачье	43
Астма бронхіальная	163	Водобоязнь	43
Базедова болѣзнь	27	Водянка	44
Безпокойство	28	„ мозга	45
Безсонница	29	Волненія душевныя	79
Беременность	30	Волосъ выпаденіе	46
Біеніе сердца	213	Волчанка	47
Блѣдная немочь	33	Воспаленіе брюшины	38
Болѣзни глазныя	58	„ горла	69
„ печени	176	„ гортани	70
„ почекъ	188	„ грудной железы	72
„ селезенки	211	„ грудныхъ сосковъ	73
„ сердца	212	„ дыхательныхъ трубокъ	36
„ ушныя	234	„ желудка	83
Болѣзнь англійская	25	„ „ у дѣтей	85
„ Базедова	27	„ заднепроходной кишки	89
„ Брайтова	35	„ кишекъ	113
„ морская	147	„ клѣтчатки	48
„ падучая	171	„ колѣннаго сустава	118
Боли въ желудкѣ	87	„ конъюнктивы	58
Боль головная	65	„ „ катар.	59
„ „ половинчатая	141	„ „ зернистое	59
Боль живота	88	„ „ золотуш.	60
„ зубная	95	„ „ лимфатич.	60
Бородавки	34	„ кости	121
Брайтова болѣзнь	35	„ легкихъ	48
Бронхитъ острый	36		
„ хроническій	36		

	стр.
Воспаленіе миндалевидныхъ железъ	80
„ мозга	143
„ мозговыхъ оболочекъ	143
„ мочевого пузыря	148
„ мышцъ	154
„ надкостницы	50
„ надкост. зубн. корня	51
„ оболочекъ мозга	143
„ „ „ эпидемическое	145
„ околоушной железы	236
„ почекъ	188
„ пищевода	179
„ подреберной плевы	179
„ печени острое	176
„ селезенки	211
„ сердечной сумки	213
„ сердца	213
„ слезнаго мѣшка	221
„ слизист. обол. рта	208
„ тазобедр. сустава	228
„ уха	237
„ языка	254
„ яичекъ	254
Вторичный сифилисъ	216
Выкидышъ	51
Выпаденіе волосъ	46
Выпаденіе матки	52
Выпаденіе прямой кишки	53
Вѣтреная оспа	170
Вѣтры	54
Галлюцинаціи	55
Гангрена	55
Гастритъ	134
Геморрой	56
Глазныя болѣзни	58
Глисты	62
Головная боль	65
Головного мозга сотрясеніе	146
Головокруженіе	67
Голодъ нестерпимый	159
Голоса потеря	68
Голосовой щели судорога	68
Горла воспаленіе	69
Гортани воспаленіе	70
Горячка бѣлая	71
Горячка родильная	202
Гриппъ	103
Грудная жаба	214
Грудной железы воспаленіе	72
Грудныхъ сосковъ воспаленіе	73
Грыжа	74
„ пупочная у дѣтей	75
Дизентерія	75
Диферитъ	77
Діабетъ	209
Дневная слѣпота	221
Душевныя волненія	79
Дыхательныхъ трубокъ воспаленіе	36
Дѣвичья немочь	33
Дѣтская холера	243
Жаба см. ангина	80
„ грудная	214
„ острая	80
„ хроническая	81
„ ушная	236
Железы грудной воспаленіе	72
Железъ опухоли	79
Железъ миндалевидн. воспаленіе	80
Желтуха катарральная	81

	стр.
Желудка воспаленіе	83
„ „ у дѣтей .	85
„ несвареніе . . .	86
„ острый катарръ .	83
„ хроническій катарръ.	84
„ круглая язва . .	87
„ ракъ	192
„ судороги	87
Желчная колика	82
Желчные камни	82
Живота боль	88
Жилки кровяныя на лицѣ .	124
Заболѣванія органа слуха .	234
Заднепроходной кишки воспаленіе	89
Задушеніе зловредными газами	258
„ испареніями . .	258
„ парами	258
„ чадомъ	258
Замерзшихъ мнимая смерть.	259
Запахъ изо рта	90
Запоздалая, трудная ходьба дѣтей	230
Запой	90
Запоръ	91
Застойная печень.	177
Затрудненія мочеиспусканія.	153
Заушница	236
Змѣй укушеніе.	233
Зобъ	93
Золотуха	93
Зубная боль.	95
Зубной свищъ	99
Зубовъ прорѣзываніе у дѣтей.	98 и 135
Зубы и ихъ сохраненіе . .	95
Зудъ и жженіе въ заднемъ проходѣ.	99
Зудъ кожи	100
Зѣва катарръ	108
Изжога	101
Изъязвленіе языка	253
Икота	102
Инфлюэнца	103
Испугъ	104
Истеченіе сѣмени	105
Исхуданіе	105
Ишіасъ	106
Камни желчные	82
Карбункулъ	250
Катаракта	110
Катарръ гортани	70
„ дыхательныхъ трубокъ	36
„ желудка острый .	83
„ „ хроническій	84
„ зѣва	108
„ кишекъ острый .	113
„ „ хроническій	91 и 115
Кашель	111
„ лающій при крупѣ .	132
Кишекъ воспаленіе	113
„ катарръ	113
Кишки заднепроходн. воспаленіе	89
„ прямой выпаденіе .	53
Клѣтчатки воспаленіе . . .	48
Кожи зудъ	100
„ трещины	229
Коклюшъ	116
Кокситъ	228

	стр.
Колики желчныя	82
Колотье въ области селезенки	211
Колѣннаго сустава воспаленіе	118
Конъюнктивитъ зернистый	59
„ золотушный	60
„ катарральный	59
„ лимфатическій	60
„ трахоматозный	59
Корь	119
Кости наросты	155
„ опухоли	155
„ переломы	175
Костоѣда	121
Кошмаръ	122
Крапивная лихорадка	123
Кровавая рвота	131
Кровавое мочеиспусканіе	130
Кровавый поносъ	75
Кровоизліяніе мозга	232
Кровотеченіе геморроидальное	58
„ изъ задняго прохода	126
„ кишечное	127
„ маточное	127
„ носовое	125
„ пупочное	128
„ изъ ранъ	258
Кровохарканіе	128
Кровяная опухоль головы	131
Кровянистое мочеиспусканіе	130
Круглая язва желудка	87
Круглыя глисты	62
Крупъ	132
Куриная слѣпота	222
Ларингитъ	70
Лающій кашель	132
Легкихъ воспаленіе крупозное	48
„ расширеніе	256
„ эмфизема	256
Легочная плева, воспаленіе ея	179
Легочная чахотка	246
Лихорадка крапивная	123
„ гастрическая	134
„ перемежающаяся	135
„ при прорѣзываніи зубовъ у дѣтей	135
„ простудная	137
„ родильная	202
Лицевая боль	137
Лишай	138
Ложный крупъ	134
Малокровіе	33
Малярія	135
Матки выпаденіе	52
Матки опухоли	141
Маточное кровотеченіе	127
Менструаціи, разстройство ихъ	199
Механическія поврежденія спинного хребта	223
Мигрень	141
Миндалевидныя железы, воспаленіе ихъ	80
Мнимая смерть замершихъ	259
„ „ новорожденныхъ	259

	стр.
Мнимая смерть повѣшенныхъ	261
„ „ утопленниковъ	260
Мозга водянка	45
„ воспаленіе	143
„ сотрясеніе	146
„ оболочекъ воспаленіе	143
„ спинного сухотка	226
Мозговой ударъ	232
Мозоли	146
Молока обиліе	147
Молочница	208
Молочный струпъ	224
Морская болѣзнь	147
Моча, недержаніе ея	152
Мочевого пузыря воспаленіе	148
„ „ параличъ	150
„ „ судороги	151
Мочеизнуреніе сахарное	209
Мочеиспусканіе кровавое	130
Мочеиспусканія затрудненія	153
Мѣшка слезнаго воспаленіе	221
Надкостницы воспаленіе	50
„ зубн. корня воспаленіе	51
Надсада	155
Наростъ костный	155
Нарывы	155
Насморкъ острый	157
„ хроническій	158
Насѣкомыхъ ужаленіе	233
Неврастенія	158
Недержаніе ночной мочи	152
Недостатокъ аппетита	26
Немочь блѣдная	33
„ дѣвичья	33
Нервное сердцебіеніе	213
Нервовъ слабость (неврастенія)	158
Несвареніе желудка	86
Ногти, болѣзни ихъ	159
Ногтоѣда	160
Ножной потъ	161
Носовой полипъ	183
Ночная слѣпота	222
Ночное недержаніе мочи	152
Ночное удушье	122
Обморокъ	162
Оболочекъ мозга воспаленіе	143
Оболочки слиз. пол. рта воспаленіе	208
Обопрѣлость	163
Огневикъ	250
Одышка	163
Ожирѣніе печени	177
Ожоги	165
Онобленіе	166
Околоушной железы воспаленіе	236
Омертвѣніе	55
Онанизмъ	167
Операціи	168
Опухоли железъ	79
„ матки	141
Опухоль бѣлая кол. сустава	119
Опухоль кровяная головы	131
„ печени	177
„ селезенки	211
Опущеніе матки	52
Органа слуха заболѣваніе	234
Орхитъ	254
Оспа	168
„ вѣтреная	170
Оспопрививаніе	170

	стр.
Острая жаба (ангина)	80
Острый катарръ желудка	83
Отрыжка	170
Падучая болѣзнь	171
Папулы	216
Параличъ	173
„ мочев. пузыря	150
Паротитъ (заушница)	236
Парши	174
Первичный сифилисъ	216
Переломы	175
Перелой	229
Перемежающаяся лихорадка	135
Печени болѣзни	176
„ воспаленіе	176
„ ожирѣніе	177
„ опухоль	177
Печеночныя пятна	178
Печень застойная	177
Пищеваренія слабость	178
Пищевода воспаленіе	179
Плева легочная, воспаленіе ея	179
Плевритъ	179
Пляска св. Витта	180
Пневмонія крупозная	48
Подагра	181
Подергиванія у мал. дѣтей	183
Подреберной плевы воспаленіе	179
Полипы	183
„ носа	183
Поллюціи	105
Поносы	184
Поносъ кровавый	75
Пороки сердца	212
Постороннія тѣла въ полости дыхательн. горла. носа и уха	261
Пострѣлъ	187
Потливость	187
Потница	191
Потъ ножной	161
Почекъ болѣзни	188
„ воспаленіе острое	188
Почечные камни	189
Преждевременные роды	51
Приливъ крови къ головѣ	189
Пролежни	190
Прорѣзываніе зубовъ у дѣтей	98 и 135
Просовидная потница	191
Простудная лихорадка	137
Прямой кишки выпаденіе	53
Пузыря мочевого воспаленіе	148
„ „ параличъ	150
„ „ судороги	151
Пупочная грыжа у дѣтей	75
Пьянство	90
Пятна печеночныя	178
Разстройство регулъ	199
Ракъ	193
„ грудной железы	194
„ на губахъ	194
„ желудка	192
„ кишекъ	194
„ матки	194
„ печени	194
„ языка	194
Раны	191
Расширеніе легкихъ	256
Рвота	194
„ кровавая	131
Ревматизмъ острый	196
„ сочленовный	197
„ хроническій	198

	стр.
Регулъ разстройство	199
Родильная горячка	202
Родимчикъ	204
Роды	205
„ преждевременные	51
Рожа	207
Рта слиз. об. воспаленіе	208
Рукоблудіе	167
Рукъ трясеніе	231
Сахарное мочеизнуреніе	209
Свинка	236
Свищъ зубной	99
Св. Витта пляска	180
Селезенки болѣзни	211
„ воспаленіе	211
„ опухоль	211
Сердечной сумки воспаленіе	213
Сердца болѣзни	212
„ воспаленіе	213
„ пороки	212
„ судорожная боль	214
Сердцебіеніе нервное	213
Сифилисъ вторичный	216
„ лѣченіе его	216
„ наслѣдственный	215
„ первичный	216
„ третичный	216
Сифилитическая язва твердая	216
Скарлатина	217
Скорбутъ	245
Слабость нервовъ	158
„ пищеваренія	178
Слезнаго мѣшка воспаленіе	221
Слезная фистула	221
Слизистой оболочки желудка катарръ	83
Слизистой оболочки рта воспаленіе	208
Слѣпота дневная	221
„ ночная (куриная)	222
Собачье бѣшенство	43
Солнечный ударъ	222
Сосковъ грудн. воспаленіе	73
„ „ трещины	73
Сотрясеніе мозга	146
Сочленовный ревматизмъ	197
Сочленовный ревматизмъ хроническій	198
Спинного мозга сухотка	226
Спин. мозга оболочекъ воспаленіе	222
Спин. хребта поврежденія	223
Струпья на головѣ у грудныхъ дѣтей	224
Струпъ молочный	224
Судороги	225
„ желудка	87
„ мочевого пузыря	151
Судорога голосовой щели	68
Судорожн. боли сердца	214
Сустава колѣн. воспаленіе	118
„ тазобедр. „	228
Сухотка спинного мозга	226
Сыпи	227
Сѣдалищная боль	106
Сѣмяистеченіе	105
Сѣра ушная	235
Тазобедрен. сустава воспаленіе	228
Течь изъ мочевого канала	229
„ ушная	237
Тифъ брюшной	39
Трахома	59

	стр.
Третичный сифилисъ	216
Трещины грудныхъ сосковъ	73
„ кожи	229
Трипперъ	229
„ влагалища женщ	229
Трипперъ острый у мужч.	229
„ хроническій у мужч.	230
Трубокъ дыхат. воспаленіе	36
Трудная запозд. ходьба дѣтей	230
Трясеніе рукъ	231
Туберкулезъ легкихъ	246
Угри	231
Ударъ апоплексическій	232
„ мозговой	232
„ солнечный	222
Удушье	163
„ ночное	122
Ужаленіе насѣкомыми	233
Укушеніе змѣями	233
Уха воспаленіе	237
Ушибы	239
Ушная боль	238
Ушная жаба (околоушная)	236
„ сыпь	235
„ сѣра	235
„ течь	237
Ушныя болѣзни	234
Фистула слезная	221
„ челюсти	99
Флюсъ	240
Хлорозъ	33
Ходьба трудн. запозд. дѣтей.	230
Холера азіатская	240
„ дѣтская	243
Холерина	243
Хребта спин. поврежденія	223
Хребта спин. сухотка	226
Хрипота	244
Хроническій бронхитъ	36
„ катарръ гортани	70
„ катарръ желудка	84
„ катарръ кишекъ	91
Цынга	245
Чахотка легочная	246
Челюсти фистула	99
Чесотка	249
Чирей	250
Чума бубонная	252
„ легочная	252
Шишки геморроидальныя	56
Щели голосовой судороги	68
Эклампсія роженицъ	256
Эмфизема легкихъ	256
Эпидемическое воспаленіе мозг. оболочекъ	145
Эпилепсія	171
Яды и лѣченіе отравленій	263
Язва желудка круглая	87
Язвы на деснахъ	253
Язвы языка	253
Языка воспаленіе	254
„ изъязвленіе	253
„ язвы	253
Яичекъ воспаленіе	254
Ячмень на глазу	255

UNIV. OF MICHIGAN,

FEB 5 1913

Опечатки.

					Напечатано:	Слѣдуетъ:
На	10	стр.	1	строчка	средства мѣры	мѣры
„	25	„	36	„	изъ ванны	изъ ванны,
„	26	„	8	„	всякіе	всякія
„	33	„	9	„	помѣщеніямъ	помѣщеніяхъ
„	41	„	10	„	Кокколюсъ 3	Коккулюсъ 3
„	45	„	4	„	Апоцинумъ каннабик. 3	Апоцинумъ каннабин. 3
„	50	„	1	„	Гіосціамъ 3 и Хамомилла 3	Гіосціамусъ 3 и Камомилла 3
„	55	„	17	„	глины	глины,
„	66	„	29	„	Хіонантесъ виргиника×3	Хіонантусъ виргиника×3
„	68	„	25	„	дышетъ	дышитъ
„	67	„	13	„	Феландріумъ 3	Фелландріумъ 3
„	81	„	23	„	Камомила 3	Камомилла 3
„	92	„	33	„	по 2 капли	по костяной ложечкѣ
„	126	„	22	„	Натрумъ натрикумъ 3	Натрумъ нитрикумъ 3
„	126	„	32	„	Ацидумъ натрикумъ 3	Ацидумъ нитрикумъ 3
„	131	„	12	„	Теребентина 3	Теребинтина 3
„	149	„	25	„	Кокоцинтисъ 3	Колоцинтисъ 3
„	149	„	28	„	мочеваго пузыря	мочевого пузыря
„	149	„	36	„	Теребентина 6	Теребинтина 6
„	150	„	6	„	Теребентина 3	Теребинтина 3
„	151	„	14	„	мочеваго пузыря	мочевого пузыря

		Напечатано:	Слѣдуетъ:
На 178 стр.	1 строчка	Подофиллюмъ	Подофиллумъ
„ 182 „	30 „	по 5 капель	по костяной ложечкѣ
„ 186 „	27 „	Подофилумъ	Подофиллумъ
„ 208 „	12 „	сквозника	сквозняка
„ 208 „	16 „	рожистые	рожистыя
„ 216 „	3 „	этммъ	этимъ
„ 220 „	34 „	Аурумъ трифиллюмъ 3	Арумъ трифиллумъ 3
„ 225 „	17 „	Найя трипудіансъ 6	Ная трипудіансъ 6
„ 251 „	10 „	Лѣченіе:	Внутрь:
„ 401 „	12 „	Туйя	Туя
„ 417 „	послѣдн. стр. 2-го столбца	Бурза пасторисъ 1	Бурса пасторисъ 1
„ 420 „	19 строчка 1-го столбца	Сицигіумъ іамболанумъ 1	Зицигіумъ іамболанумъ 1
„ 420 „	31 строчка 2-го столбца	Хіонантусъ виргиникусъ × 3	Хіонантусъ виргиника × 3
„ 421 „	3 строчка 1-го столбца	Этіопсъ минералисъ 3	Этіопсъ антимоніалисъ 3

Типографія «Родникъ», Спб., Невскій, № 88.

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 00660 6696